

COMMENTARII
DE REBUS
IN
SCIENTIA NATVRALI
ET
MEDICINA
GESTIS.




VOLVMINIS XII. PARS I.

LIPSIAE MDCCLXIV.

APVD IOH. FRIDERICVM GLEDITSCH.

Venduntur etiam

Amstelodami apud I. Schreuder, Parisiis apud Briasson, Patavii apud I. Manfrè,
Holmiae apud L. Saluium.








I.

Histoire de l' Academie Royale des Sciences.
Année MDCCLVII. Avec les Mémoires de
Mathématique et de Physique pour la même
année etc. à Paris, 1762. 4. Hist. 1. Alph.
5 pl. Comment. 3 Alph. 2 pl. 18 tab. aen.

h. e.

Historia et Commentarii Academiae regiae
Scientiarum Parisinae, ad annum MDCCLVII.



Ad *Physicam generalem* spectantes obser-
uationes duae duntaxat in huius anni
Historia occurrunt. Prima est de me- p. 25.
teoro igneo, quod figuram stellae cau-
datae habuit, et per aera semicirculum intra minu-
tum primum horae percurrere visum est: ac prope
horizontem ingenti cum fragore disparuit. Altera
est de vapore, qui ex orificio cloacae obstructae p. 26.
resecto ascendens a flamma candelae ignem conce-
pit, et in forma columnae, plus quam octodecim pe-
des altae, totus per dimidiam horam arsit, fortem
sulphuris odorem late spargens.

- p. 28. In *Obferuationibus anatomicis* narratur, 1) puerum octennem ab epilepfia, qua laborauerat, liberatum effe, dum fractura occipitis, quam a cafu paffus fuerat, fanaretur; item iuuenem, qui ab infantia ftupidi ingenii fuerat, quum fractura, quam in latere capitis grauis lapsus ipfi effecerat, feliciter curata effet, ad dextrum mentis vsum perueniffe: 2)
- p. 31. in vefica viri, qui, poft vsum remediorum *Stephaniae* contra calculum, per plus quam duodecim annos vix vllos in vefica dolores fenferat, adeo vt, poftquam minores aliquot calculos eiecerat, femet omnino a calculis liberatum crederet, tamen poft mortem inuentum effe magnum calculum, fed crufta mucilaginofa obduftum: 3) in infante trium annorum febrem tertianam duplicatam, quae aliis medicamentis non cefferat, folo laudani liquidi vfu, cuius XV guttae hora vna ante horrorem, qui paroxyfimum femper antecedebat, exhibitae sunt, prorfus victam effe; 4) iuuenem, qui ex aquis, fub quibus per femihoram merfus delituerat, pro mortuo extractus erat, in vitam reuocatum effe, magna fumi *Nicotianae* copia in anum, nares, et os immiffa, venis quater feftis, totoque corpore pellibus ouium, recens mactatarum, obuoluto.
- p. 40. Sequitur *obferuatio chymica*. Cl. HELLOTUS in aqua regia ftanni triplum fere pondus foluerat. Quaeolutio dum ficcefcebat, aeris in fundo lagenae residui particulae perrumpiebant maffam, pellucidam factam, et in ea formabant meatus vacuos, ita difpofitos, vt vegetationis genus referrent.

Inter *commentarios* leguntur

1) BOUGUERI *meditationes de modis lumen mentiendi, eorumque ad praxin accommodatione.*

2) Cl.

2) Cl. LASSONII *Commentatio de combinatione*

*acidi salis marini cum antimonio, et hinc oriundo sale, qui sali sedatiuo similis est, nec non de alia substantia salina, quae beraci similis est, et ope antimonii paratur *)*.

Haec commentatio in tres partes diuisa est. In prima parte Cl. Auctor enarrat ea, quae obseruauit, butyrum antimonii per saepe repetita deliquia et destillationes tractans. Vidit illud posse sublimari in p. 26.

crystallos leni igne, quae non solum fortiori igni fundantur, sed etiam a contactu aeris consumantur et auolent, adeo vt non nisi certa aquae copia superfusa totalis earum euaporatio impediri queat. Existimat, spiritum salis, dum phlogiston ex parti- p. 30.

bus regulinis extricet, cum eo se combinare, et repudiata primae suae missionis aqua concentrari; et sic ipsum, volatiliorem redditum, partes regulinas, quibus iunctus sit, etiam volatiles reddere. In secunda parte agit de sale, quem spiritus vitrioli philosophici destillatione nactus est ea ratione, vt, quum p. 33.

post phlegma et spiritum sulphureum destillare acidum coepit, statim ignis minueretur. Sublimatus tunc in superiori parte retortae haesit sal, in forma subtilissimarum acuum et lamellarum, argenti et talci splendore conspicuarum. Hic sal, quem *salem antimonii* appellat, linguae impositus saporem praebet primum acerbum, qui deinde in subdulcem, saporis sachari Saturni similem, mutatur; non liquefcit in aere, et ne quidem in aqua soluitur frigida, sed in spiritu vini, cui viridem flammam conciliat; ferro candenti impositus vitrificatur; et haec vitrificata massa, in aqua ebulliente soluta, iterum crystallos praebet, quarum tamen sapor non tam fortis est, quam antea. Sali sedatiuo admodum similem hunc salem Auctor deprehendit, eo quod vterque e basi vitrescibili et

A 3

phlo-

*) Lecta d. 13 Iun. 1757.

phlogisto valde concentrato, et per acidi actionem extricato constare videtur: in hoc tamen alter horum salium ab altero differt, quod sal sedatius in aere non mutatur, sal autem antimonii, aeri expositus post septem vel octo menses in farinam insipidam et terream abit. In tertia huius commentationis parte V. Cl. propria experientia illustrat et confirmat, quod alicubi STAHLIUS (in *Specim. Becheriano*) dixerat, ex croco antimonii per alcalia parato veram boracem sibi obtigisse.

P. 41. 3) Cl. LEGENTIL *observatio duarum iridum singularium*. In prima, Parisiis d. 27 Iunii 1756 visa, hoc erat singulare, quod in extremitate arcus, ad orientem aestivum posita, sub colore violaceo apparebat color viridis, interiecto inter hunc et violaceum spatio tantae latitudinis, quantam colores viridis et coeruleus in ipso arcu simul occupabant. Altera iris, quae d. 18 Nouembris hora decima antemeridiana ibidem conspiciebatur, ex arcubus quatuor constabat. Nempe sub arcu, qui in iride duplici interior esse solet, positi erant duo alii arcus, quorum superior tangebatur cavitatem arcus primarii, alter autem ab illo disiunctus erat spatio, tertiae circiter parti latitudinis arcus primarii aequali. Color utrique horum intimorum arcuum coeruleus erat.

4) Cl. DE CHABERT *commentatio, in qua ostenditur, quam necessarium et utile futurum sit iter, a Cl. PINGREO in partem occidentalem et meridionalem Africae, transitus Veneris per solem d. 6 Iunii 1761 observandi gratia auctoritate Academiae suscipiendum, et quatenus res quibusque mediis in hoc itinere gerendae sint.*

5) *Eius-*

5) *Eiusdem commentatio de quarundam insularum maris australis valde commoda positione ad introitum Veneris in discum Solis d. 6 Iunii 1761 observandum.*

6) Cl. GUETTARDI *de fodinis ardesiae tegularis circa Andegauum* *). In hoc commentario V. Cl. primum describit ipfas has fodinas, modumque, quo lapidem in illis excidunt fossiores. Deinde commemorat quaedam discrimina, quibus varia ardesiae genera differunt; nam color non idem prorsus est omnibus; et quarundam ardesiarum superficies magis continua et polita apparet, aliarum minus; quaedam curvae sunt, quanquam pleraeque planae inveniuntur; nonnullae acidis mineralibus, ex parte saltem, solvuntur, ceteris ab acido non laesis. Quod autem nonnullae species ardesiae acidi actione mutantur, eius rei rationem hanc esse coniicit, quod illae particulas spataceas sibi innatas habere videntur, quum in nonnullis fodinis adeo reperiatur ardesia, in aliquot strata diuisa per interiecta strata, quae ex spato albo constant. Pergit deinde Auctor ad quaestionem, vtrum ardesia lapis sit calcarius, an vitrescibilis; et examinatis CRAMERI, WALLERII, LINNAEI, POTTII de hac quaestione sententiis, prioribus accedit, qui ardesiam inter lapides vitrescibiles retulerunt. Addit autem hunc characterem, quod ardesiae partes figuram quandam determinatam, et quidem plerumque parallelogrammi affectent. Hunc characterem praecipue in summis stratis observabilem esse ait. Tandem de figuris exponit, quae ardesiis circa Andegauum impressae cernuntur. Referunt illae partim fucos marinos, partim animalia crustacea ex classe cancerorum. Quanquam color ferrugineus, quem fucorum figurae

p. 52.
p. 58.
p. 61.
p. 66.
p. 68.
A 4 osten-

*) Lecta d. 8 Iun. 1757.

- ostendunt, persuadere alicui posset, has figuras casu
ortas esse ex liquore aliquo ferrugineo, inter lami-
p. 70. nas ardesiae forte diffuso: tamen ex maculis rotun-
dis et fulcis leuiter impressis lapidi iudicat Auctor,
eas veras esse plantarum impressiones, siue hae plan-
tae primitus ferruginea quadam aqua fuerint imbu-
tae, siue post factam iamiam impressionem liquor
eiusmodi sese inter laminas lapidis insinuauerit.
Quod ad animalium crustaceorum impressiones atti-
net, species adhuc incognitas eae ostendunt; non-
p. 81. nullae ad pulicis marini similitudinem proxime acce-
dere videntur.

7) *De variationibus apparentibus in obseruata in-
clinatione orbitae quinti satellitis Saturni, de limitibus
atmosphaerarum solis ac planetarum, et de peculiaribus
vsiibus telescopiorum et catalogi generalis fixarum in Zo-
diaco.* Auctore Cl. LEMONNIER.

8) Cl. PINGREI *commentarius de cometa, qui
anno 1757 apparuit.*

9) LACALLII *Commentatio de theoria solis.*

10) Cl. D'ALEMBERT *Responsio ad articulum
quendam commentationis LACALLII de theoria solis.*

11) *Exempla, quae ostendunt, posse incendia spon-
te oriri, enarrata a Cl. DU HAMEL.* Duobus po-
p. 150. tissimum exemplis rem declarat Auctor. Videlicet
anno 1741 Brestiae ingens cumulus carbonum fossi-
lium, quo repletus erat locus, assibus clausus et tectus,
ignem occultum concepit, qui omne inflammabile in
carbonibus, medio in cumulo positus, consumpsit, et su-
mo multo sese prodidit. Et Rupeforti aestate anni
1757, quum magna copia telarum, bolo rubra
cum

cum oleo trita coloratarum, ex sole, in quo sicca-
bantur, subito conuolutae in locum clausum, velis
asseruandis destinatum, delatae essent, calor sponte
in mediis telis natus est, qui fila in carbones re-
degit.

12) Cl. VAUCANSONI *Descriptio nouae ma-
chinae, cuius ope lamellae argenti aurati, quibus fila
serica in quibusdam textilibus obducta sunt, attenuan-
tur et explanantur.*

13. 14) *Eclipsis lunae d. 30 Iul. 1757 observa-
tiones a V. Cl. THURIO, MARALDO, et PIN-
GREGO habitae.*

15) Cl. LALANDII *Observationes astronomicae
mensibus Octobri, Nouembri, et Decembri anni 1757
habitae Lutetiae Parisiorum.*

16) Cl. LEGENTIL *Inuestigatio obliquitatis
eclipticae, et annotationes in systema Cl. LOUVELLE.*

17) *Observationes geographicae et physicae, qui-
bus nituntur coniecturae de positione terrarum circa po-
lum antarcticum, et maris glacialis, inter illas compre-
hensi: nec non monita de globo quodam artificiali terre-
stri, qui montes et physice consideratam superficiem ter-
rae exhibet. Auctore Cl. BUACHE.*

18) Cl. DU HAMEL *Observationes botanico-
meteorologicae ad annum 1756.*

19) Cl. LALANDII *commentarius de transitu
Veneris per discum solis annis 1761, et 1769 observando.*

20) Cl. LEGENTIL *Inuestigatio positionis pun-
ctorum principalium in theoria planetarum superiorum.
Commentarius primus : de inclinatione vera orbitae Mar-
tis ad planum eclipticae.*

21) Cl. TILLET *Observationes ad agriculturam
spectantes **). Harum observationum pleraeque
mere oeconomicae sunt, quarum ergo enarratio-
nem a nobis non expectabunt lectores. Est tamen
p.304. sub finem commentarii proposita haec observatio, in
plantis eiusdem speciei, quamvis inaequaliter ma-
gnis, semina tamen semper paris esse magnitudinis,
in cuius rei rationem physice inquirere promittit
Cl. Auctor. Verum enim vero, quemadmodum ve-
hementer dubitamus, hanc observationem esse ge-
neralem, ita nec videtur nobis Auctor eam expli-
casse, sed potius, mutata quaestione, rationem red-
dere conatus esse, cur in plantis cerealibus eiusdem
speciei, quae ex seminibus aequae bonis et magnis
prouenerunt, saepe aliae aliis et qua culmos, et qua
spicas, sint minores et debiliores.

22) Cl. DE THURY *Monita de coniunctione Ve-
neris cum sole d. 6 Iunii anni 1761 observanda.*

23) Cl. DE LA CONDAMINE *Excerpta e Dia-
rio itineris sui per Italiam ***). Ex his nonnulla no-
bis enotanda sunt, quae ab instituto nostro haud
p.341. sunt aliena. Vas illud, quod Genuenses pro mi-
raculo magna cum veneratione ostendunt, et ex sma-
ragdo elaboratum praedicant, Cl. Auctori vitreum
p.375. esse videtur. Romae plateas observauit materia
stratas esse prorsus simili illi, quam Vesuvius
mons

*) L. d. 25 Apr. 1759.

**) L. d. 20 Apr. 1757.

mons candentem euomit, et quae frigesacta ad instar lapidis indurescit: qua etiam vrbis Neapolis plateae stratae sunt. Eodem lapidis genere, Italia *Laua* dicto, totam viam Appiam stratam esse animaduertit, idemque in viis, quae Roma Neapolin, Viterbum, et Lauretum ducunt, vbique deprehendit. Coniicit inde, per magnam Italiae partem antiquissimis temporibus fuisse montes ardentes; et huic coniecturae, ait, non solum montium Apen- p.377.
ninorum faciem fauere, sed etiam hoc, quod in monte eo, in quo Tusculum fuit, in collibus, qui inde ad lacum vsque Albanum pertingunt, in magna parte montis, cui Tibur impositum fuit, nec non in iis, qui Viterbo et Caprarolae adiacent, diuersa strata lapidum calcinatorum, cinerum, scoria-
rum, et lapidis *laua* dicti deprehensa sunt. Neapoli p.382.
vidit Cl. Auctor fila ex Apocyno parata, et ex iis textas telas, quae holosericis admodum similes erant. Methodum variolas inferendi et Romae, p.385.
et in multis aliis Italiae vrbibus introductam, et ab ipsis Theologis probatam esse memorat.

24) Cl. DE LALANDE *Commentarius de acquisitionibus secularibus, et motibus mediis solis, Lunae, Saturni, Iouis, ac Martis; cum observationibus Martis, a TYCHONE anno 1593 habitis, et ex MSto eiusdem erutis.*

25) Cl. PINGREI *observationes astronomicae habitae anno 1757.*

26) Cl. DE LALANDE *Problema gnomonicum.*

27) *Nova theoria eclipsium, in quibus parallaxis ratio habenda est, ad eclipsin Solis d. 25 Iul. an. 1748 applicata, Auctore Cl. DE L'ISLE.*

28) *Exa-*

28) *Examinatio errorum, qui in metiendo altitudines meridianas, vel respondentes, stellarum committi possunt; cum tabulis eorum correctioni inseruiantibus.*
Auctore Cl. DE LALANDE.

29) Cl. CLAIRAUTI *commentatio altera de modis perficiendi tubos opticos ope lentium obiectionum, e vitris lucem diuersimode refringentibus compositarum.*

30) Cl. NOLLETI *noua experimenta circa radios solis, et per reflexionem, et per refractionem collectos.* Haec experimenta docent, spiritum vini, et liquorem illum, qui *aetheris* nomine venit, a radiis solaribus in foco lentis vel speculi vstorii collectis incendi non posse, etiamsi illi liquores antea fuerint calefacti. Quod iam ab Academicis *del Cimento* obseruatum fuisse, Cl. Auctor, quum haec experimenta caperet, ignorabat. Etiam olea et resinae in hoc foco nullum conceperunt ignem, sed post fusionem in fumum dissipata sunt. Omnes autem hae materiae inflammatae sunt, quum prope eas in foco lentis vel speculi corpus quoddam solidum inflammabile, veluti lignum, positum et accensum fuit. Colligit hinc V. Cl. ignem electricum non esse purum ignem, qualis est solaris, sed cum materia quadam alia coniunctum.

31) *Commentatio de sale lixiuioso tamarisci, in qua demonstratur, illud esse sal mirabile Glauberi, ac cineris tamarisci usus ad nitrum conficiendum exponitur; nec non de sale thymelaeae.* Auctore Cl. MONTET,
P. 555. *Acad. Sc. in Monte Pessulano Sodali.* Hoc sal, e lixiuo cineris tamarisci, vel tamaricis, natum eadem habet notas externas, quas sal GLAUBERI. Aeri enim expositum non liquefit, sed in puluerem redigitur, et eodem sapore grato, ac sal GLAUBERI,

BERI, se commendat, et in aqua facillime soluitur. Sed insuper plura experimenta, a Cl. Auctore cum eo capta, ostenderunt etiam, illud cum nullo acido efferuescere. Acidi potius vitriolici praesentia in hoc sale intelligitur ex eo, quod mercurii per acidum nitrosum solutio, mixta cum solutione salis huius in aqua destillata, praecipitatum exhibet, quod verum turbith minerale ex colore agnoscitur. Magnam autem vtilitatem hoc suum inuentum in Medicina habere monet Auctor, propterea quod sal hoc tamarisci, cuius plantae largus est in Gallia Narbonensi prouentus, longe viliori pretio parari possit, quam sal mirabile GLAUBERI, cui tamen omni ex parte aequipolleat. Quod attinet ad vsum cineris tamarisci, in Occitania inferiore ad purificandum lixiuium nitri adhiberi soliti: Auctor hic refellit eo-
 rum sententiam, qui lixiuium nitri, cineri superfusum, basin suam alcalinam a cinere accipere arbitrantur, eosque monet, quum nullum alcali fixum in tamarisci cinere insit, vsum eius, ad hoc negotium, in eo tantum consistere, vt particulas pingues, quibus ista lixiuiā abundant, ab ipsis auferat, et in se retineat; cui rei hunc cinerem aptiorem esse, aliarum arborum vel fruticum cineribus, operariis persuasum est. Tandem de thymelaea refert, ex eius cinere bonum tartarum vitriolatum sibi natum
 esse; itemque faecem oliuarum, ex quibus oleum est expressum, combustam multum tartari vitriolati, et parum alcali fixi, praebere confirmat. p. 562. p. 566.

32) Cl. ALEMBERTI monitum, commentario suo, in hoc volumine pag. 145 edito, adiciendum.

II.

Histoire d'un insecte, qui devore les grains de l'Angoumois, avec les moyens, que l'on peut employer pour le detruire. Par M. M. DU HAMEL DU MONCEAU et TILLET, de l'Academie Royale des Sciences. A Paris chez H. L. Guerin et L. F. Delatour, rue S. Jacques, a S. Thomas d'Aquin. 1762. 8uo. avec priuilege du Roi. oct. p. 314. tab. aen. 3.

i. e.

Descriptio insecti cuiusdam, quod frumenti grana in agris Inculimensibus corrumpit, vna cum remediis de frumento seruando.

Est genus quoddam insectorum in agris Inculimensibus (*Angoumois*) copiose se propagantium, quod maximo incolarum damno frumenta corrumpit, et, quod saepe factum est, grauem annonam efficit. Hac perniciofa re agrorum possessores afflicti, academiae regiae, quae Lutetiae Parisiorum floret, huius mali mentionem fecerunt, vt, si fieri posset, quosdam eiusmodi rerum peritos delegarent, qui, re disquisita, consilia contra ingens hoc malum docerent. Annuit laudata academia, misitque celeberrimos viros, nominatim DU HAMEL DU MONCEAU, cuius exquisitam rerum rusticarum cognitionem optimus quisque valde admiratur, atque alterum Cl. TILLET. Hi necessariis adminiculis instructi iter instituunt, in vniuersum omnia, quae experientia incolas docuerat, mira sedulitate colligunt, atque ex aliis audiunt, hoc malum tam late esse extensum, vt iam 200 parochiae fuerint infectae. Quae cum ita essent, in animum induxerunt,

runt, de ipso insecto accuratam tradere descriptionem delineationemque, secundo in causam propagationis inquirere, denique remedia, quibus possit frumentum contra insecta defendi, detegere.

Est autem insectum, nisi fallimur, phalaena tineae granella LINNAEI, oblonga, angusta, alis cinereis subfuscis, ad solem micantibus, margine tenuiore ciliatis, antennis articulatis, duabus inter antennas prominentiis barbae assimulantibus. Ca- uendum tamen est, ne hanc tineam, cum alia, quae vestimenta corrodit et consumit, ut optime iam celeb. REAUMUR obseruauit, confundamus. P. 20.

Sola cura animalculorum, dum phalaenarum speciem induunt, ea est, ut suum genus omni nisu propagent. Nocte fit coitus simili modo, quem in bombycibus mori conspiciamus; adhaerente vna ad alteram per aliquot horas. Feminae 60, 80, ad 90 usque pariunt oua; 3, 4, 6 vno iactu. Ouula P. 29.

haec intermixta sunt materie aliqua viscosa, ut commode aliis rebus affigi possint. Est ouorum affinitas cum iis, quae a formicis ponuntur, longe tamen minora sunt, superficie striata, colore ferme roseo; oculis armatis pusilla larua in quibusdam ouulis conspici potest, altera extremitate apertum est ouum, ibi egreditur larua tunc quartam vel quintam lineae partem longa. A phalaena affiguntur ouula spicis inter glumas plerumque, ubi granum basi adhaeret. Exclusa larua conatur in granum ingredi ibique farina vesci. Saepe ouula in ipsa granima deprehenduntur affixa, folliculo filis tenuissimis constante inclusa. Femella plura ouula ad glumas granorum ponit, mirandum itaque est, cur vna potius larua, et non plures in grano reperiantur. An forsitan vna alteram ita persequitur, ut vna demum modo superfit, quae est Celeb. REAUMUR opinio. Tamdiu larua in grano persistit, quamdiu farina ad- est.

P. 34.

- est. Praeter farinam sua excrementa saepe comedit. Eiusmodi larua consuetam magnitudinem ad-
 p. 50. epta prope duas lineas longa est. Corpus aequale; caput ore, duobus oculis, et genere quodam cornuum ornatum; colore magis fusco, quam reliquum corpus, pedes 16, quorum 8 intermedii tam parui, ut non nisi microscopii ope conspiciantur. Con-
 p. 57. sumpta farina larua se filis implicat, post dies aliquot Chrysalis apparet diuersae magnitudinis, semper tamen larua minor. Tandem in conspectum prodit phalaena, saepe iucundo spectaculo, palea ex
 p. 64. parte obtecta. Non eadem est phalaenarum vitae duratio, plerumque vitam 15 dierum, aut 3 hebdomadam attingunt. Calor promouet chrysalidum explicationes, frigor autumnalis impedit, quo minus se propagent. Explicatio phalaenarum duplex est, altera, quae statim post messem contingit, duratque ad mensem Septembrem vsque, altera fit mense Iunio, ubi egrediuntur ea, quae per hiemem ut larua in granis latuerant. Experientia docuit, phalaenas nocte, nulla alia ratione tanta copia granaria petere, quam ut ibi oua magno numero pariant; porro, laruas, granis inclusas, per hiemem sine ullo periculo in terra, cui grana commissa sunt, perdurare valent.
- p. 140. Quanta sit horum insectorum progenies, ex eo, quod Clar. de TAPONNAT expertus est, optime intelligitur. In lagenam mense Iulio d. 21 an. 1761 immisit 7 grana laruis his viuis infecta. Die 17 Aug. egrediebantur phalaenae, statimque moriebantur; supra vnum granum reperiiebantur 15 oua. Fingamus iam in eorum numero fuisse 3 femellas, quarum quaelibet 60 oua posuisset, summa erit 180 laruae, quae prorepere potuissent; his mutatis ante mensem Septembrem in phalaenas, earum 90 sumantur femellae. Quodsi quaelibet 60 oua posuisset, statua-

statuamus, summa granorum ab infectis destructorum erit 5400. Modius, genus quoddam frumenti mensurae in Gallia, distribuitur in 16 partes, quarum quaeque 33600 grana continet. Ergo granorum numerus pro modio erit 537600. Ponamus, inde 33600 phalaenas oriri, supererunt 504000 grana ab infectis non tacta. Iam largiendum quidem est, multas perire phalaenas, verum hoc non obstante commode 126000 infectorum paria possunt assumi. Quibus positis et vna simul cuilibet pari 60 ouis attributis, summa granorum ex altera generatione infectorum erit 7560000. Haec de prima parte sufficiant, sequitur altera de ortu et progressu horum infectorum.

Non eadem omnium incolarum opinio. Sunt, qui p.147. existiment, e putredine materiei granorum farinosae, a certa quadam aeris temperie pendente, haec infecta capere originem. Verum nullo modo haec opinio potest admitti. Calorem ouorum exclusionem promouere, humoremque laruarum ingressum, facile intelligitur. Sunt alii, qui sibi persuadeant, haec infecta eo tempore, quo incolae Inculimenses, illud frumenti genus, quod mais dicitur, coeperunt colere, esse introducta. Neque haec opinio vlla est digna fide, quo- p.168. niam in iis etiam terris, vbi nulla colitur mais, infecta haec saepe inveniuntur v. c. in Germania, Suecia etc. Ad hoc accedit, quod femellae sua ouula solummodo ad tritici, hordei, secalis, nunquam in mais, auenae, pisorum, fabarum etc. grana ponere soleant. Atque, permultis institutis experimentis, nunquam larua tineae granellae in mais grano est reperta. Longe verisimilior est eorum opinio, qui perhibent, eo tempore, quo acri annona incolae laborarent, atque aliunde frumenta adduci curarent, corrupta grana esse introducta. Frumentorum genera, qui p.175. bus damnum infectum infert, in primis haec sunt:

- hordeum, triticum, secale; horum priora magis, tertium parcius corrumpuntur. Auenam infectum raro
p.184. vel nunquam laedit. Denique infectorum minuen-
 dorum remedia atque alia, quibus contra ea frumen-
 tum possit defendi, traduntur. Solent incolae qui-
 dem variis vti adminiculis, sed infelici saepe successu.
 Sunt enim ea aut inutilia, aut insufficientia, aut
 periculosa, aut permagni pretii. Quidam frumen-
 tum ventilant; alii frumenta tantis aceruis, quan-
 tum fieri potest, congerunt. Sunt, qui grana in
 locis temperatis et subfrigeratis collocant. Alii
 aceruum cum sale communi commiscent eumque cum
 vini aceto adspargunt. Palam alii, qua grana ven-
 tilantur, oleo aspidis aut essentia terebinthini super-
 liniunt. Solent quidam frumentum in instanti in
 aquam bullientem infundere. Alii fumum sulphu-
 ris commendant; alii parietes granarii atque solum
 calce viva, aut allio, aut oleo iuglandis, aut vrina
 vaccarum foetida inducunt. Sunt denique, qui
 grana in furnum, pane cocto et extracto immittunt.
p.211. Nullum tamen, opinamur, remedium magis com-
 mendandum, quam id, quod illi supra laudati cum
 aliis communicant. Mergites statim post messem tri-
 turentur, frumenta que sementitia afferuentur. Trita
 grana in furnum calefactum possunt quidem immitti,
 sed, propter definiendi caloris gradum, admodum
p.215. periculosum adminiculum. Cl. DE TAPONNAT
 permultis institutis experimentis tandem inuenit, fru-
 mentum 150 librarum in furnum immissum requi-
 rere 50° thermometri Reaumuriani, grana 600 li-
 brarum 60° caloris, 900 librarum 70°. Sed missis
 his videamus nunc aptius remedium, quod DU HAMEL
 experientia doctus tradidit. Eadem die, quo
 frumentum metitur, tantum terendum et purgandum,
 quantum ad frumentum sementitium nec sarium esse
 putatur. Tum lixiuium quoddam ex cinere tali
 modo

modo, quali ad purganda lintea requiritur, praeparandum est. Quo effecto, calx viua apta ratione in id iniiciatur. Finita praecipitatione, separetur lixiuium cum calce saturatum infundaturque frumentum in labrum; spatula continuo misceatur granaque supra natantia tanquam cassa sedato hauriantur. Quibus rite factis siccantur grana, quae siccata in granario congerantur, atque strato cineris et alio ex calce obtegantur. Experientia docuit, quod 20 granorum ab insectis laesorum 18 instaurata sint. Conseruando frumento, quod venale futurum est, vel ex quo panis coquendus, haec conseruandi ratio conuenit: Fiat, vt supra commemorauimus, statim post messem vel ipso messis die, quod longe melius, frumenti tritura; sic multa a phalaenis ad glumas posita oua destruuntur. Cribrentur grana, separentur solida a fatuis; iniiciantur in furnum, vt arescant; quo facto adseruentur in faccis frumentariis supra fulcrum, cuius pedes ex ferro polito parati sunt, positis: sic impeditur, quo minus a gliribus et muribus corrodantur. Praetermittamus experimenta eo consilio excogitata, vt debitus in arescendis granis caloris gradus obtineatur; porro furni cuiusdam, quem DU HAMEL inuenit, descriptionem. Vltimo loco de diminuendis, penitusque destruendis insectis exponitur. Quae praescribuntur adminicula, his regulis continentur: vna eademque omnium incolarum coniuncta sedulitate in extirpandis insectis opus est: secundo, prima lex esto, vt, qui rerum summam gerant, rigore quodam imperent, vt omni studio praeccepta minuendorum insectorum remedia applicentur; tertio grana fatua a solidis et incorruptis separentur; denique lex fancienda, ne ex alienis regionibus infecta grana introducantur.

p.222.

p.294.

III.

Historia medica biennalis morborum ruralium, qui a verno tempore anni 1759 vsque ad finem hyemis anni 1761 Laxenburgi et in vicinis vndique oppidis pagisque dominati sunt; complectens memorabilem rarioremque febrium intermittentium et de earum genere remittentium epidemiam, authore FRANC. IOSEPHO LAUTTER, Med. Doctore et Caes. Reg. Laxenburgensi Physico. Vindobonae typis I. Th. Trattner. 1761. 8 mai. pl. 14.

Febrium acutarum miliarium petechialiumque vim, vt late anno 1757 et 1758 in quam plurimis Europae prouinciis vagatam fuisse constat, sic quoque eadem Laxenburgum eiusque viciniam est depopulata. Perniciosis his febribus postea ibidem succedebant vere 1759 aliae, intermittentes, varii generis ab initio facilis, accedente vero aestate paullo difficilioris, curationis, quibus se adiungebant diarrhoeae atque dysenteriae frequentes, ortae ob torrentis solis aestum, cui mellores, in propinquis impuris aquis refrigerationem refectioremque potuquaerentes, expositi erant. Hos morbos demum excipiebant febres deterioris imo pessimae indolis, remittentes potius quam intermittentes appellandae, quae tamen ob typum, qui obseruari in iis solebat, ab illarum tribu non poterant separari, sed ad genus tertianarum vel simplicium vel duplicatarum eas pertinere, multis luculenter docebant phaenomena; atque cum hae febres in vicinis locis insignem adorirentur hominum copiam, epidemicam suam et periculosam indolem ostendebant exploratam. Non eadem fae-

uitio

uitie hi morbi continuo procedebant, sed pro anni tempestate indolem suam saepius mutare, imo per maximam hiemalis temporis partem, ea plane exuta et aliis morbis locum occupantibus, quiescere videbantur. Nulla aetas, nullus sexus, nullum hominum genus ab iis immune erat, omnes inuadebant cum pandiculatione, horripilatione exigua breui, rarissime verum accedebat frigus, sequebatur mox ingens calor et aestus vrens mordaxque, dolor, capitis ingens, artuum lancinans osteocopus, sitis insatiabilis, anxietas et inquietudo corporis summa, lingua sicca squalida, nausea et vomitus difficilis, torminosae et crebrae ventris deiectiones; diu paroxysmus durabat et per maximam nychthemeri partem protrahebatur et, licet postea febris imminueretur, non tamen plenaria oriebatur apyrexia, sed tantummodo remittebat terminoque solito citius reuertebatur: inde aegri post paucos paroxysmos viribus quasi exhausti videbantur. Haec erat facies priorum febris huius insultuum, quae longe periculosior truculentiorque in tertio sequentibusque apparebat paroxysmis, cui quippe longe grauiora se adiungebant symptomata atque in variis varia. Accedebant enim sensuum stupor, affectus comatosus, fere apoplecticus, deliria phrenitica, tremores artuum vehementes, vomitus frequens inanis, alui profluuium ingens dysentericum, artuum rheumata ingenti cum dolore, acutus dolor lateris, mox cum, mox sine tussi, inani, in utroque vero casu cum pulsu duro, sanguine inflammatorio, ut itaque haec febris modo veram pleuritidem, modo apoplexiam plenariam, lethalem, modo epilepsiam, modo choleram, dysenteriam, tum febrem continuam acutam referret. Utut grauissimus morbus, facillimae tamen erat curationis, modo ei ob paroxysmos longius protractos commodus inueniri poterat locus.

etenim curationem, qualemcunque hic morbus indueret formam, absoluebat cortex peruuianus, larga manu et illico praeendus, ac aegrotus epidemico hoc morbo laborare intelligeretur, nec ullus fuit eorum, qui cum hoc morbo conflictati fuerunt, quin hoc remedio fuerit seruatus, praeter vnicum, qui, quod corticem respueret, altero iam paroxysmo apoplecticus obibat. Bina hinc momenta in hoc morbo maxima cum difficultate erant coniuncta: alterum, hunc morbum cognoscere et ab aliis, quorum indolem simulabat, discernere; alterum, efficere, ut aegrotus, nunc in periculosissimo hoc morbi paroxysmo constitutus, tanto ex vitae periculo, salua vita, tutus possit euadere. Vtrumque vero erudite et satis luculenter docet Auctor in primo atque quarto capite huius libelli, quem in genere in quinque dispescuit capita, in quorum *primo* historiam generalem omnium morborum, qui successiue in binis his annis dominati sunt in ea regionis parte, cuius salubritatis inuigilandae ab Imperatrice ipsi erat demandata prouincia; in *secundo*, quod nostro iudicio, praecipua et maxime aestimanda libelli pars, 24 casibus morbi huius epidemici, eiusque variae atque diuersae faciei generatim in priori descriptam historiam specialius recenset; quo inde in *tertio* corollaria quaedam coniicit, quae ad clariorem huius morbi cognitionem, comparisonemque cum similibus morbis, ab aliis auctoribus annotatis, quamplurimum conferunt; in *quarto* postea, ut iam monuimus, signa diagnostica colligere atque discernere docet, ex quibus truculenti huius morbi cognosci poterit praesentia; et in *quinto* tandem causarum huius epidemicae constitutionis suscipit scrutinium, cui denique nonnulla in laudem corticis peruuiani contra eius detrectatores addit. Nulli dubitamus, fore, ut non solum rara et curatu difficilis morbi huius

indo-

indoles plures ad libellum hunc peruoluendum all-
ciat, sed etiam vt lectorum neminem peruoluisse illum
poeniteat; merito igitur luget praematurum Auctoris
obitum*) optimus quisque medicorum.

IV.

Nobilissimo Illustrissimo ALB. V. HALLERO,
Societ. Regiae Sc. Gotting. Praesidi etc. de
variolis, apoplexia et hydrope S. A. D. TIS-
SOT. M. D. Soc. Regiae scient. Londin et
Acad. Physic. Medic. Basiliensis Socius. Lau-
fannae, ex typographia Ant. Chapuis, 1761.
12 mai. plag. 10 $\frac{1}{2}$.

A deo inter eruditos TISSOTI inclaruit nomen,
vt quicquid, eo insignitum, prodire in publi-
cum solet, nulla egere videatur commendatione
summoque applausu ab erudito orbe accipiatur.
Nec ipsum eo indignum esse, praeter alia scripta,
haec quoque, quam non sine animi voluptate per-
uoluimus, epistola docet, in qua ea argumenta,
quae hypothese suae robur addant, et solide et eru-
dite proponit; licet non negemus, nos, quoad re-
rum capita cum ipso consentientes, in quibusdam
et in primis in eo, quod de somno spontaneo et p. 20.
naturali, quem in omnibus febribus inflammatoriis
et acutis damnat, repetit argumentis, ab eo dissen-
tire. Candide interim primaria afferamus. Iam in-
scriptio epistolae momenta exhibet, de quibus in
ea agitur.

Sine dubio in Heluetia propinquisque prouin-
ciis ille mos, qui nostris in terris maxima ex parte

B 4

iam

*) Comment. hor. Vol. XI. P. I. p. 171.

iam dudum obsoleuit, huc vsque valet, vt opium, eique similia medicamenta in febribus acutis, et vel maxime in variolis, copiose et frequenter medici exhibeant. Hanc consuetudinem, ab aliis iam refutatam, nouis Cl. Auctor debellare suscipit argumentis, nec paucos fore lectores credimus, quin iis persuadeantur.

- Affirmat itaque, opium nulli variolarum et malignarum et benignarum generi conuenire. Id comprobat sequentibus rationibus: quod opium sit calidissimum, acerrimum et corrosiuum medicamentum: quod ad alcalinam vergat indolem, hinc putredinem augeat gangraenamque adferat; quod cohibeat salinae profluuium sanguinemque expandat; quod
- p. 13. somnum inferat artificialem, eo peiorem, cum naturalis saepe minus prodesse soleat, qui semper nocere dicitur, vbi febris viget; quod opium refragatur crisis afferatque symptomata graua, lethifera, anxietatem, delirium, phrenitidem, orthopnoeam; quod agat vt vinum; quod opium humores, sudore dissipandos, ad cutim quidem rapiat: in inflammatorio autem variolarum stadio ea sit cutis dispositio, vt sudor succedere nequeat; quod hinc pruritus augeat; quod optimus quisque medicorum non sine ratione illud dissuadeat in omnibus acutis febribus: secunda vero variolarum febris omnium sit acutissima; quod, etsi peritissimorum quidam eius vsum commendarint, id rarissime tamen adhibuissent, alias certo certius noxias intellexissent, et suspicatur Auctor, iis
- p. 33. forte, qui id tantopere laudant, syrupum diacodii frequenter in vfu fuisse, cuius vis salutaris non ex opio, sed ex acidula indole sacchari admixti sit deriuanda. Nec tamen opium prorsus ex variolarum cura reiiciendum, sed omnino adhibendum suadet Auctor in aegris, debilibus, quorum vires sunt erigendae; in iis, per quorum corpus peruerso motu
- mate-

materia variolosa oberrat et vagatur, praeterquam quod illa ad superficiem corporis inueniat viam; in miti morbi decursu, vbi aegroti lectis contineri delectant, quippe quod opium refrigerium impediat; in nimia diarrhoea, quae vel per se, vel post commissos errores orta, pustulas exinanit ita, vt collapsas vesiculas ostendant, cutis palleat, artus frigeant, syncope, delirium sequatur. Quo in statu opium et vesicatoria ceu vnica supersint auxilia; et praestet illud his, quod citius vim exferat. Interdum ambo vna adhibuit Auctor remedia. Vtrumque vires cordis erigit, fluxum humorum repellit ad cutim, diarrhoeam compescit. Abstineas vero, ait Auctor, ab opio, si decubitus ad pulmones deprehendatur, substituas cantharides, quorum interim vim tantopere in variolis extollendam esse negat et contra FREINDIUM eos in vehementi suppuratoria febre nocere afferit. Suadet etiam in fine suppurationis post purgantia lene narcoticum.

Cum itaque vsum opiatorum in variolis valdopere restringit, alia substituit his medicamina. Mirum quantum itaque laudat acida mineralia, vt medicamen omnibus symptomatibus et cuilibet morbi p. 50. variolarum tempori conuenientissimum, quae, quod graua symptomata, delirium, phrenesin et alios ex pure resorpto decubitus, vt Cl. Auctor vidit, arceat, etiam ipsi cortici Peruuiano anteposit, cuius vires febre secundariae tollendae, vel maxime si ea post morbum vere inflammatorium grauior deprehenditur, non sufficerent. Magis corticem conuenire credit iis malignis variolis, quas laxitas solidorum, sanguinis nimia resolutio et gangraenae metus comitari solent. Mala quoque variolis superstitia, febrim lentam et tabem, abigere hic valet. Camphoram pluribus opii virtutibus pollere et plerisque vitiis carere, hinc saepe opio hoc in morbo substituen-

- dam esse ostendit, eam quoque coniungit cum acidis. Venaesectionem in miti morbo inutilem, in mitissimo aut maligno nociuam, in graui repetendam censet. **p. 60.** Dissuadet, continuo aegrotos, grauiter variolis affectos lecto contineri: foeminam grauidam confluentissimis obseffam variolis per septuaginta horas medio in cubiculo, aere vndiquaque perflato, sedentem detinuit. Hypocaustorum latera aqua conspergi iubet. Indusiorum mutationem commendat. Pediluua, balnea vniuersalia, quae quondam **BOUVARDO**, nunc **III. SENAC** in vsu sunt, balnea vaporosa et particularia fomenta, quod cuncta summam habeant vtilitatem, laudat. Recentes fructus acidiusculos, fraga, rubos, cerasa, et dulcia et acida, copiose aestate, vuas parce autumnò concedere aegrotis non dubitat. Pauperes in Heluetia serum lactis huic morbo opponunt, cuius probata sane virtus in grauiori morbi decursu, adiecto aceto potest augeri. Occlusas nares, iniecto oxymelle aqua tepida diluto, aperit. **p. 66.** Vt pustulae frequenter incendantur, magni esse perhibet momenti ad plurima mala praecauenda, inprimis febrim secundariam (si modo huic operationi non tot obstarent obstacula). Anginam in variolis a pustulis, in faucibus efflorescentibus, esse posse negat, arbitratus, variolas rarissime cutis terminos transilire; adscribit eam phlogistico pharyngis infarctui. Vlcusculam linguae quidem, non veras vidit variolas. Quatuor disseccuit cadauera copiosissimis conspersa variolis, nec vlla interior pars quoddam variolae vestigium ostendit. **p. 72.** Cito in variolis benignis, dummodo in facie flaescere incipiunt pustulae, in confluentibus vero statim ab initio suppuratoriae febris, mannam, cassiam, tamarindos et his similia exhibet: infantibus, pharmaca respuentibus, in quorum aluo si saburra latet, ab initio morbi tartari emetici, clam in potu ordinario

nario soluti eam praebet copiam, vt alius, non vomitus inde moueatur.

Alter morbus, quem Cl. TISSOT contem- p. 86.
platur, est apoplexia, quam, praemissis causis
et signis *feriationem sensuum motuumque voluntati* sub-
ditorum nuncupat. Primo loco eam expendit, quae
ex abundantia sanguinis oritur, in cuius curatione ve-
naesectio, clyisma et succus citri copiose ingestus
primaria sunt remedia. Praeterea aegrum iubet
erecto trunco, decliuibus cruribus, nudo capite,
parum tecto reliquo corpore poni et supra genu li-
gatura constringi venas. Damnat valdopere omnem
concussionem, volutationem, frictionem, potum ac fo-
tum calefacientem, spirituosum, et omnes res, quae vilo
modo excitant. Aegris per aliquot dies omnem de-
trahit victum et tenuissimo potu vitam tantum modo
conseruat. In hac morbi specie nunquam, nec post p. 99.
largam quidem venaesectionem, adhibuit canthari-
des, quod eae ipsi videntur apoplexiam magis alli-
cere quam fugare; suris tamen, reuulsionis ergo,
sinapismos applicare amat. Facilius vero apoplexia
praecauetur, quam curatur, hinc prophylaxin Cl. Au-
ctor studiosius perquirat, quae in eo consistit, vt impe-
diatur, quo minus plethora in corpore colligatur, et
vt stimuli euitentur, qui sanguinis nimiam copiam in
motum agere et ad encephalon trudere possent.
Ad primum itaque scopum pertinet victus vegetabi-
lis et parcus somnus; hinc iterum iterumque suadet
Auctor, vt e coena desint animalia alimenta, ne ex du-
plici fonte, victu et somno nimia proueniat sanguinis
copia. Eadem ex causa interdicitur somnus pomeri-
dianus. Quibus regulis licet non nulli aegroti stricte
obediant, plethoram tamen arcere et sequelas inde
oriundas suppressere, nequiuertunt. Foeminam vi-
dit Auctor, quae vnico anno 412 libras sanguinis
effudit et tamen vixit. Causas tantae sanguificatio- p. 107.
nis

nis se ignorare ingenue fatetur; forte minorem transpirationem huc aliquid conferre suspicatur. Venaesectione interim nec optima nec vnica est prophylaxis, quam modo concedit, vbi spontaneae deficiunt euacuationes sanguineae, quas, vbi per se contingunt, venaesectione non turbandas censet, sed spontaneam hanc prophylaxin naturae committendam. Res, quae stimulo quasi sanguinem commouent, non ignorantur, eas itaque leuissime tangit; ad eas vero, quae sanguinem ad caput terminant, refert frigus pedum, insolationem, magnos nisus, qui longam inspirationem desiderant, narcotica, spirituosae, cephalica, iram et profusum gaudium, aluum obstructam, vel maxime vero hypocaustra calefacta, in quibus lege physica iste aer longe calidior est, qui caput, quam qui pedes ambit. Hinc nocet profunda meditatio, vel imprimis in calefacto hypocaustris, eruditio, ad hunc morbum procliuius, quos Auctor capite leuiter tecto incedere, tenui victu vti, abstemiosque viuere iubet. Delineat quoque non nullos morbos apoplexiae affines, adeoque eadem methodo tractandos: nauseam et vomitum cum summa debilitate pulsuque inaequali coniunctum; alternantem soporem et cephalalgiam; nimiam in somnum procliuitem etc.

p.127. Prohibita in sanguinea apoplexia medicamina cuncta ferrosae conducunt. Fonticulos interim adeo praedicatos, Auctor temnit, nisi apoplexia successerit fluxui alicui suppresso; quo in casu tantum adiuumentum, quantum alias detrimentum ab iis allatum iri affirmat. Postea apoplexiam ex obesitate contemplatur, quae soluentissimis medicamentis, sapone, oxymelle squillito et victu tenui praecauenda. Huic tandem addit eam, quae ex defectu spirituum oritur, et quae in longis morbis subito aegros interficere, senilem marasimum sequi et eos aggredi solet,

let, qui *continua medela mortem arcessunt*, quem *effu-
gere* conantur. Longe diuersa hic medicatio. Ro-
borantia atque nutrientia eam et arcent et curant.
Hysterici quoque insultus interdum apoplexiae ae- p.136.
quant, quae vt plurimum sine discrimine transit, non-
nunquam tamen lethifera esse potest, quod binis
exemplis, quae attente legi merentur, Cl. Auctor p.141.
comprobat. Mortis causam esse suspicatur paralyfin
cordis. Vsum herbae nicotianae, quae tum pulue-
ris forma naribus, cum fumi specie ore attrahi solet,
et apoplexiae prophylaxis praedicatur, iustis i. e.
arctis restringit limitibus. Paralyseos, quae est p.147.
apoplexiae vel nuncia, vel comes, vel pedissequa,
caussa non semper in encephalo, sed quolibet in
neruoso ramo latere potest, qui a turgentibus par-
tibus proximis comprimifolent. Eae partes vero sunt
vel arteriae vel venae, vel tela cellulosa; obstructionis
vero adeoque inflammationis veram sedem raro in ar-
teriis, frequentius in venis et tela cellulosa esse, ana-
tome edoctus Auctor affirmat. Hinc vt plurimum
ab his causis paralyseos origo, adeoque in atte- p.158.
nuante incidenteque sine stimulo diaeta praecipuum
quaeri oportet auxilium. Thermarum vsus, si ipsi
locus, cum prudentia instituitur. Iuscula viperina,
quod circulationem augeant, humores ad caput tru- p.162.
dant, sanguinem alcalina indole rarefaciant, expro-
banda et tunc modo concedenda, vbi vel defectus
humorum vel sanguis, appidus acescens deprehendi-
tur. Electricitas iis modo conuenit, in quibus nec a
febre, nec a spasmo, nec a plethora mali quid metuen-
dum, hinc ea in paralyfi deauratorum atque in ea,
quae colicam saturninam excipit, tentanda.

Hydropis nunc causas et concise et plane expli- p.172.
cat, quibus superstruit varias medelae species. Le-
uiter non nullas tangamus. Spirituosa fasciatio non
nocet, vbi ex sola laxitate partis externae oedema
oritur. Stagnantes aquae euacuandae quidem sunt,
non

non tamen iis remediis, quae febrim excitant, ne graues obstructions magis compingantur humoresque acrem induant indolem. Hoc optime fit resorptione, quae succedit tenui diaetae: alimenta itaque eligenda nec laxantis nec septicæ indolis, quibus addenda sunt acida oxysaccharata; quorsum et-

p.185. iam pertinet vsus cremoris tartari, a MENGHINO *) laudati, quem tribus includit conditionibus 1) sub initio, si fibra nondum laxa, humores non acidi deprehenduntur; 2) in subiectis atrabiliariis; 3) dum lotii deficit secretio et plenitudinis accedunt symptomata. Vbi sitis et calor, prosunt spiritus nitri aut

p.197. sulphuris. Purgantia nunquam conducunt, nisi in ea specie, quae ex visceribus obstructis oritur, quem

p.207. in finem commendat rheum. Scilla, etsi in hoc morbo potens remedium, attamen tunc nocet, si vetus scirrhus cum febricula coniunctus est; cum praeterea ventriculi imminuit vires, sanguinem soluit et dolores exitat, hoc praecaueri potest, si pro rei ratione vel cum camphora, vel cortice Peruuiano,

p.212. vel aromate quodam combinatur. Abiicienda medicamenta nasturtina, si hydropem iam comitatur calor, febris, sitis, putredo, vbi quoque abstinendum a marte, qui vnice a summa solidorum laxitate indicatur. Asciticum abdomen manu, oleo oliuarum madida, fricare copiosum saepe prolicuit vrinæ profluuium. Modum, quo salutaris hic effectus possit oriri, sic animo sibi Auctor concipit: frictione frequenti tenacia et concreta conteruntur absorptionique idonea, praeparantur; illitu vero tollitur nimis copiosa inspiratio cutanea, non vltima profecto hydropis causa, qua sublata, cutis ad expirationem, quae prius deerat, disponitur. Cui hoc paradoxon vide-

*) vid. De Bononiensi sc. et art. instit. atque acad. commentariorum. T. IV, p. 260. et nostror. Comment. Vol. VII, P. III. p. 398.

deatur, ille adeat ipsum libellum. Hinc frictio p.198.
oleosa in hoc morbo medela non inepta, qua tamen
caute utaris, ne viscera tabe iam laesa, ruda fri-
ctione magis laedas. Seri per cutim turgidam edu-
ctio fit vel per cantharides, vel per scarificationes, vel
reiterata applicatione radicis bryoniae. Priores
modos! semper infelici successu, aliquoties feli- p.220.
ciori ultimum adhiberi vidit. Haec sunt praecipua
praecepta atque opiniones, quas de his morbis Cl.
Auctor profert, quibus, ut eas firmaret, ubique
copiosas immiscuit observationes scite, ut omnia,
scriptas et dignas, quae diligenter legantur.

In appendice, quam epistolae adiecit, tres ob- p.227.
servationes, de colica saturnina cum artuum paralyfi,
recudi curavit, quas inseruerat iam *Excerpto totius
Italicae nec non Helueticae litteraturae* *). Ortum
duxerant hi morbi ex usu medicamentorum saturni-
norum externo.

V.

MAXIMILIANI LOCHER, Medici Viennensis
in nosocomio ad S. Marcum et in orphano-
trophio Physici observationes practicae circa
luem veneream, epilepsiam et maniam, tria
morborum genera in praedicto nosocomio
prae aliis maxime obuia. His accedunt casus
varii, qui vltiorem cicutae usum internum
et externum in morbis curatu difficillimis
confirmant. Viennae Austriae, typis Io.
Th. Tratner 1762. 8. pl. 7.

Medicamenta noua, vel eorum nouae compositio-
nes, etsi cum rectae rationis usu excogitantur,
ab

*) Ann. 1759. Tom. IV. p. 142. seqq.

ab experientia demum maximam adipiscuntur fidem. Eiusmodi igitur de medicamentis vt experimenta instituantur, et institutorum obseruationes bona fide cum orbe erudito communicentur, labor est, ingenuum decens medicum: quo sane nomine libellus hic meretur, qui euoluatur.

- Cum amplo praeest Cl. LOCHER nosocomio, in quo frequens accessus venereorum, ab anno 1754, sublata saluationis methodo, recepit normam, ab Ill. VAN SWIETEN propalatam, mercurium sublimatum in spirituofo vehiculo exhibendi. Quales itaque inde oriri effectus, quos morbos eo curari, Cl. Auctor vidit, et quae cautelae in eius vsu obseruandae sint, hoc in libello aphoristice proponit. Quorum plurima cum iam ex aliis scriptoribus sint cognita, silentio praetereamus, et pauca, quae ipsi propria sunt cogitata, vel in quibus ab aliis recedit, tantum attingamus. Post quamlibet assumptam dosin aegrum in hypocausto calido sudorem expere-
- p. 16. stare oportet. Citissime ii a malo liberantur, in quibus alius inde frequenter mouetur. Viri citius a malo liberantur, quam foeminae; vtplurimum intra sex vel septem hebdomadam spatio cura absoluitur, raro tres pluresque protrahitur menses. Non impar est remedium, non solum qualibuscunque morbis ex venerea labe ortis, sed etiam in multis aliis et inprimis variis oculorum vitiis, albugine, panno,
- p. 34. cataracta etc. Intra octennium 4880, in nosocomium receptos, huic methodo subiecit Auctor, ex quibus paucissimi eam ob idiosyncrasiam ferre, et pauci ea curari non potuerunt.
- p. 36. Alterum caput obseruata continet de epilepsia. In eodem nosocomio Viennensi ad S. Marcum aedificium ad epilepticos recipiendos et sanandos exstructum est, cuius curam habet Auctor. In hoc varia tentauit medicamina. Puluerem radicis valerianae

rianæ syluestris omni mane a drachma dimidia ad binas per semestrium exhibuit; ab initio quidem aegroti eo alleuari videbantur, sed postea id medicamen omni carebat effectû. Simile phaenomenon et ab aliis obseruauit rebus, quas in auxilium vocauit, nimirum, vt a nouo quocunque adhibito remedio aegroti mirum quantum acciperent auxilii, quod vero sub continuato vsu iterum euanesceret. Spiritus supra memoratus antiuenerereus et malum venereum et epilepsiam sustulit in viro aliquo, cuius cranio insignis insidebat tophus, quo quippe persanato disparebat epilepsia. In alio viro epilepsiae insultum praegrediebatur dolor in cubito dextro; applicato vesicatorio et vlcere inde orto, diu aperto seruato, simulque interne sumto cortice Peruuiano cum camphora, malum hoc plane fuit profligatum. Omnium p. 42. optime in hoc malo profuit medicina, composita ex camphoræ dimidia, sacchari vero mucilaginisque gummi arabici integra drachma, quibus inuicem in mortario vitreo tritis, aceti calidi vncia dimidia, syrupi florum papaueris rhoead. integra, et aquae florum sambuci sex affusae erant; interdum quoque pro rei necessitate triginta guttulas laudani liquidi SYDENHAMI huic miscelae adiecit Auctor. Suasu Ill. V. SWIETEN tentauit etiam folia aurantiorum, mox p. 47. in infuso, mox in puluere propinata, quae in sex aegris plane nihil, in nouem aliis vero multum attulerunt auxilii; licet dici non possit, omnem epilepsiam inde cessasse, sufficit, hoc remedium effecisse id, vt insultus ipsi aliquo modo refraenati fuerint, atque vltra consuetum terminum siluerint.

In tertio capite facta cum maniacis narrat Auctor experimenta. In multis methodo vsitata, cau- p. 57. sis cognitis opposita, malum abstulit omne. Se- p. 62. nis maniacis moschi optimi grana quindecim, vel scrupulum in boli forma quotidie exhibuit et tres men-

- p. 64. ses continuauit, magnam inde quidem vidit mutationem, non tamen plenariam curam: excipi verum ex his debet vnicus, qui perfecte resipuit. Felicius tentamen instituit cum mixtura superius descripta ex camphora et aceto, vtpote quae non paucos quotannis integram restituit in sanitatem. Aliis dedit siccam camphoram, pineis subactam, ad dimidium drachmae per binos menses, sed sine vlllo fere, quod mirum, salutari effectu; vix vero in iisdem adhibuit mixturam, cum post paucas septimanas maniaci resipiscentiae suae ostenderent signa. Quod tentamen saepius repetiit, semperque eundem habuit effectum; quoinde sequitur, acceptum auxilium alii ingredienti, non camphorae, esse tribuendum, quod et noua experimenta docuerunt. Nam cum in mixtura, praeter acetum, nihil esset, a quo quadam ratione tantus expectari posset effectus, illud merum in auxilium vocauit et laetus id maniacis admodum prodesse didicit, atque octo aegrotis, vel in bimestri certe trimestri spatio, sanum reddidit rationis usum. In tribus aliis nihil praestitit, quod forte nimis diu huic malo succubuerint. Ad omnia corporis colatoria humores disponit, maxime sudore fundit, in foeminis catamenia prolicit antea vel suppressa, vel parce fluentia. Nonnulli mane ieiuno ventriculo illud ferre nequeunt, his praebet Auctor decoctum saturatum hyperici, inter antimaniaca remedia a veteribus et inprimis ab ANGELO SALA relati, post meridiem vero acetum. Solum infusum herbae hyperici saturatum, neglecto aceti usu, plane nihil valuit. Sectionem venae iugularis ceu vtile remedium in hoc morbo Auctor expertus praedicat.
- p. 71.
- p. 75. Vltimo in capite virtutes cicutae multis exemplis confirmat. Summae vtilitatis fuisse ea dicitur in vlceribus inueteratis, cacoethicis, venereis, cancrois, in scabie, serpigine, herpete, in con-

contractura membrorum ex arthritide, nec nocuisse infantibus, sed in iis celerius attulisse malorum lenimen, interdum quidem frustra eius usus fuisse, at tamen in iis aegrotis, in quibus nec alia remedia plus valuerunt.

VI.

Elemens de Pharmacie theorique et pratique: contenant toutes les operations fondamentales de cet art, avec leur definition, et une explication de ces operations, par les principes de la chymie; la maniere de bien choisir, de preparer, et de meler les medicamens, avec des remarques et des reflexions sur chaque procédé; les moyens de reconnoitre les medicamens falsifiés ou altérés; les recettes de medicamens nouvellement mis en usage; les principes fondamentaux de plusieurs arts dependans de la pharmacie: tels que l'art du confiseur, et ceux de la preparation des eaux de senteur et des liqueurs de table. Avec une table des vertus et doses de medicamens. Par M. BAUME, maitre apothicaire de Paris, et demonstreur en chymie. A Paris, chez la Veuve Damonville et Mufieur fils, P. F. Didot jeune, De Hanfy, 1762. 8 mai. Alph. 2. pl. 9. tabb. aen. 2.

h. e.

Elementa Pharmaciae theoreticae et practicae: quae omnes huius artis operationes, solido
C 2 fun-

fundamento nitentes, vna cum definitione et explicatione earundem, chemiae principiis eruta; modum eligendi, praeparandi et miscendi medicamenta, cum annotationibus et meditationibus super quouis processu; media cognoscendi medicamenta adulterata et immutata; formulas medicamentorum nostro aevo vsurpatorum; prima principia multarum artium a pharmacia dependentium; artis v. g. condiendi, et aquas odoratas nec non potulenta praeparandi continent; vna cum tabula virtutum dosiumque medicamentorum. Auctore Cl. BAUME etc.

Hic liber, vti amplissima eiusdem inscriptio iam indicat, ex quatuor partibus compositus est: prima de cognitione, secunda de electione, tertia de praeparatione et quarta de mixtione medicamentorum agit. Vltimam Noster in duas rursus partes diuisit, inque priore medicamenta interna, in posteriore autem externa exposuit, ita tamen, vt ea, quae de vtriusque natura participant, illis in primis adiungeret, quibuscum plurimas proprietates communes habent. His plurium remediorum notitiam subnexuit, quae quidem in vsu sunt, minus tamen cognita, tum quia formulae nondum publici iuris factae sunt, tum etiam, quia in operibus minus diuulgatis continentur. Caeterum regulae etiam a Cl. Auctore traduntur, quae remedia, magistralia dicta, seu quae a medicis praescripta illico a pharmacopoeo conficienda sunt, praeparare docent, quorum quidem nullum a Nostro exhibetur exemplum, principia tamen traduntur, secundum quae accurate procedere discunt pharmacopoei.

Haec

Haec in genere de hocce libro annotare licuit; quod ad praeparationes remediorum spectat, certe non paucae hic occurrunt, quae vero quantum nosmet cognouimus, nisi omnes, plurimae tamen in aliis pharmaceuticis et chemicis libris reperiuntur. Plerisque Noster suas adiecit annotationes, in quibus vel procedendi modum vel mutationes corporum et alia exposuit, ita tamen, ut ea tantum, quae ad artem pharmaceuticam pertinent, traderet, quae vero ad medicinam spectant, neutiquam tangeret. Licet vero non negandum sit, complures hic deprehendi remediorum, in primis compositorum praeparationes, quae vel correctione opus habent, vel ex officinis pharmaceuticis proscribendae esse videntur, istum tamen librum iis, qui artem hanc addiscere cupiunt, utilitatem quandam allatarum esse, opinamur.

VII.

Nosologia methodica, sistens morborum classes, genera et species, iuxta SYDENHAMI mentem et Botanicorum ordinem; Auctore FRANCISCO BOISSIER DE SAUVAGES, Regis Consiliario ac Medico, in Monspeliensi Universitate Medicinae, olimque Botanices, Professore regio; Academiae Scientiarum Monspeliensis, Londinensis, Vpsaliensis, Bero-
linensis, Florentinae, Physico-Botanae, Suecicae, Naturae curiosorum, et Instituti Bononiensis Socio. Tom. I. complectens morborum classes X, cum prolegomenis. Amstelodami, 1763. Alph. I. pl. 9. tab. aen. I. Tom. II. Pars I, complectens ge-

nera et species morborum ad classes I. II et III. pertinentium, nempe vitia, febres et phlegmasias ib. eod. an. Alph. I. pl. 11. Tom. II. Pars II, complectens genera et species morborum ad classes IV. V et VI. pertinentium sc. spasmos, anhelationes et debilitates ib. eod. an. Alph. I. pl. 6¹. Tom. III. Pars I. complectens genera et species morborum ad classes VII et VIII. pertinentium sc. dolores et vesanias ib. eod. an. Alph. I. pl. 4. Tom. III. pars II. complectens genera et species morborum ad classes IX et X. pertinentium sc. fluxus et cachexias ib. eod. an. Alph. I. pl. 12¹. sumtibus Fratrum de Tournes 8 mai. Voll. 5.

Cuius physiologiae elementa *), et pathologiam methodicam **) alio tempore iam cum lectoribus Nostris communicauimus Cl. BOISSIER, ipsius nosologiam methodicam eo lubentius iisdem nunc tradimus, quo maiorem vtilitatem a lectione huius operis in quosuis solertes medicinae rationalis cultores redundaturam nobis persuademus, licet negare non possimus, valde nos etiam infirmul vereri, ne medicina, quam ab erroneis scholasticorum opinionibus purgare, prorsusque reformare laudabili consilio Cl. Auctor suscipit, et verborum et ipsorum morborum nimis, atque quidem saepius praeter necessitatem, aucto numero difficilior, variisque, subtiliter caeteroquin excogitatis, hypotheseibus, subinde inspersis obscurior, minusque certa euadat. Priusquam autem ad ipsius libri recensitionem propius nos accingamus, necesse videtur, vt, qualem

nor.

*) vid. Comment. nostr. Vol. VIII. P. IV. p. 663.

**) ib. p. 671.

normam sibi Cl. Auctor in scribendo sumpserit, paucis ostendamus. Secutus quippe methodum botanicorum est, sic, ut quascunque demum aegritudines in classes et ordines distribuerit, his genera et species subiunxerit, characteres essentialia in quovis morbo explanando addiderit, et his omnibus varias denominationes a diuersis auctoribus cuilibet impositas insimul praemiserit, quo lectores, huius illiusue descriptionem indagaturi, illico intelligant, qualem, et num vere eum morbum habeant, qui variis sub nominibus a diuersis auctoribus explanatur.

Diuiditur totum opus in tres tomos, quorum vterque posteriorum duas partes habet. Tomus primus decem morborum classes et prolegomena complectitur; Tomus secundus genera et species morborum ad sex classes priores pertinentium, tertius autem eas aegritudines, quae reliquas classes constituunt, pariter in genera et species subdiuisas continet.

In *prolegomenis* exiguos adeo, quos fecit medicina progressus, a summa artis difficultate, maiorique artificum negligentia Cl. Auctor deducit, post *Nosologiae fundamenta historicae*, utpote *methodum* et *nomenclaturam* examinat. Illa quadruplex est *alphabetica*, *temporaria*, *anatomica* et *aetiologica*, quibus omnibus *symptomata* anteponenda, IONSTONI autem atque SENNERTI, ut confusa, fallax et incommoda reicienda est. *Nomina generica* a veteribus ob plures species incognitas apte satis definiri non potuerunt, opus itaque est, ut sic definiantur genera, ut omnes species adhuc obseruatas contineant. Nomina igitur ex physiologia, botanica aliisque scientiis desumpta, ut appetitus, fluxus, sudor etc. termini classium et ordinum v. c. morbus, lues; nomina composita e. g. vlcus pulmonum,

p. 6.

p. 22.

p. 52.

item barbara, deceptiua, generica aliarum artium reiicienda, quin etiam nomina causarum et principiorum, pro ipsis morbis designandis vsurpata, vel a regione petita non toleranda, sed vna cum specificis, tropicis, relatiuis et sesquipedalibus expungenda sunt. In *nosologiae philosophicae fundamenti* expositione vita, sanitas, causae, principia, phaenomena et symptomata definiuntur, errorumque in medicina obuiorum fons deriuatur ab eo, quod plerumque non causa vt causa consideretur, causaeque cum principiis saepius confundantur. *Prognosis*

p. 82. *cognitio causae est, et unius certitudo ab alterius certitudine pendet. Diagnos* a cognitione symptomatum dependet, cum vero morbi definitio sit horum enumeratio, sequitur etiam bonam diagnosin a bona

p. 103. definitione dependere. Sequuntur *vires animatae*, in quarum examine quicunque motus in corpore animae, eosdem pro arbitrio dirigenti, adscribuntur. Praeter has vires autem, vel aliae adhuc in corporibus nostris dantur facultates, illis similes, quae in vegetabilibus fossilibus et cadaueribus conspiciuntur, proindeque non ab anima proueniunt, et abhinc *vires inanimatae* dicendae sunt. Facultates illae sunt: grauitas, cohaesio, attractio, elasticitas, electricitas, putrefactio, fermentatio, calor, rarefactio, dissolutio et condensatio. Ab vtrisque his viribus, animatis quippe et inanimatis principia morborum omnium proueniunt. Succedunt *clauis classium, morbique detegendi methodus*, de quibus postquam varia Cl. Auctor protulit, ad ipsas *classes* transit, in quibus ordinandis ita versatur, vt prius nomina morbo describendo a variis auctoribus et gentibus imposita, etymologiam et characterem proponat, theoriam deinde ipsamque praxin solide pertractet, tandemque varia symptomata eleganter scienterque explicet, nec vnquam quid omittat, quod ad illustratio-

tionem huius illiusue rei difficilioris desiderari videatur.

Classis prima affectus superficiarios continet. Hi p.155. definiuntur per vitia in externis partibus conspicua, quibus magis qualitates, quam ipsarum functiones laeduntur. Diuiduntur ista vitia in 1) vulnera 2) ulcera 3) maculas 4) exanthemata 5) phymata 6) excrescentias 7) cystides et 8) procidentias. De prioribus in pathologia Cl. Auctor exposuit, easque species traumaticas nominat, de reliquis vero affectibus spontaneis dictis, quod theoriam ampliorem desiderant, prolixius agit, et in eorum fiendi modum naturamque altius inquirat.

Febrium, quas secunda classis habet, character in p.198. eo consistit, quod vires pulsus respectiue ad vires artuum adauctae sint, ut plurimum vero pulsus solito frequentior, cum virium voluntati subditarum imminutione inueniatur. Quare febris adest, 1) quoties viribus artuum iisdem manentibus vires vitales cordis, et artularum, maxime quoad frequentiam intenduntur; 2) viribus artuum imminutis, vires vitales eadem permanent, modo nec sopor, nec anaesthesia, seu insensibilitas artuum adsit etc. 3) viribus artuum adauctis, vires pulsus augentur in maiori ratione, ut in phrenitide 4) viribus artuum imminutis, vires vitales intensiores euadunt, aut eadem perstant ac in statu sano, vel demum in minori ratione decrescunt. Opus itaque est, ut quoties febris adest, toties etiam vires cordis, respectu ad eas artuum multum adaugeantur, siquidem fieri non potest, ut a resistentiis in vasis cordi oppositis pulsus maiores aut frequentiores fiant, nisi insinul maiores vires cordi applicentur, cum sine his, tardiores potius debilioresque sint euasuri. Quod si enim vis motrix, interuallis aequalibus alioquin embolo machinae hydraulicae applicari solita, eadem remaneat, et resistentiae adaugeantur, non

ex eo frequentior, sed rarior emboli itus reditusque euadet. Vires autem illae cordis adaugentur, quoniam natura a partibus easdem reuocat, et ad cor amandat, eo fine, ut quicquid in corpore noxium est, aucto suo motu subigat et eliminet, vel ita mutet, ut minus corpori noceat. Anima itaque sola est, quae ad morbosum corporis statum in melius mutandum, praeuertendamque machinae ruinam insurgit et febrim accendit. Quam opinionem ideo eo lubentius Cl. Auctori omnibusque suis, ut ipse vocat, animistis relinquimus, quo melius vel ab aucta cordis irritabilitate, vel a maiori contentorum vi

p.251. irritante explicari febris posse nobis videtur. *Frigus febrile per molestanti sensationem, ab imminuto ignearum partium impetu in corpore nostro dependentem definitur. Impetus illa imminutio refrigeratio dicitur, et est proportionalis 1) quantitati partium ignearum, quae auolant 2) duplicatae earum, quae remanent,*

p.261. *tarditati.* Calor moderatus febrium non nisi stragularum remotionem potumque frigidum exigit, nimius vero venae sectionem, ventilationem et potum frigidulum postulat.

Morborum inflammatoriorum seu phlegmasiarum

GALENI, quas *tertia classis* complectitur, *character febris est acuta, cum dolore, calore cuiusdam partis molesto, et sanguinis in patella extracti crusta coriacea.*

p.294. Calor, qui a particularum ignearum vi et impetu in fibras nerueas oritur, ceteris paribus est ut ignearum particularum quantitas in corpore, et ut earum duplicata velocitas. Quo circa duplici de causa crescit, aucta quippe ignearum particularum copia, aut motu earundem adaucto, aut intenditur ex eo, quod igneae particulae expeditius in se inuicem ruant. Ex secunda causa crescit calor, aut in ratione duplicatae velocitatis, aut in densitatum ratione. *Vbi itaque in corpore maior est celeritas, densitas, et humorum*

morum acrimonia, ibi maxumus calor; ubi densitas et humorum acrimonia sunt celeritatibus reciprocae, ibi aequalis forte calor. Lymphae in pleuriticorum corporibus ad gradum trigesium coagulationem peculiari potius miasmati, quam soli calori adscribendam Noster existimat, cum in experimentis eadem infra gradum quinquagesimum et quintum nunquam albuerit. *Rubedo* tumoris inflammatorii a sanguine maiori vi impellente vasaque distendente dependet, quodsi enim haec atonia dilatantur et laxitate, obscurius sanguis rubet, quin imo nigrescit, ut in varicibus, ecchimosi et aliis. *Dolor* eo acerbior est, quo magis fibrae ad ruptionem accedunt. Ad *tumorem* inflammatorium gignendum requiritur, ut vires contentorum in maiori ratione crescant, quam vires continentium, aut ut vires continentium decrescant in maiori ratione, quam illae contentorum. *Causa inflammationis maior sanguinis vasorumque est* p. 327. *collisio, a maiori sanguinis nisu et impetu oriunda.* Id quod probatur ex eo, quod in humano corpore huic collisioni calor, rubedo, tensio, pulsatio, dolor, omniaque reliqua phaenomena proportionem respondent. *Therapia* diuersa est. *Morbi* enim *inflammatorii puri* reiteratam venae sectionem, diaetam liquidam et refrigerantem, febrisque et vrgentium symptomatum moderamen exigunt, cum illi *impura febre comitati* longe aliam curationem desiderant, medicumque, qui in prioribus naturam sequi tenetur, saepius moneant, ut hanc ad vomitionem aliamue excretionem stimulet, languentem excitet, et per cardiaca et sudorifera excitet, ne morbo victa tandem succumbat.

Sequitur *classis quarta*, quae morbos *convulsivos* seu *convulsiones* complectitur. *Est vero convulsio inuita et violenta musculorum, motui locali inservientium, contractio.* Considerat Cl. Auctor quascunque *convulsio-*

uulſiones, vt conatus ſalubres, ad ſtatum machinae in melius mutandum, a natura ſuſceptos, idque adſertum, quoniam plerisque neotericorum paradoxon videtur, variis demonſtrationibus roborat, de-
nuoque in eosdem inuehitur, animiſtarumque ſectam acrius defendit, id, quod eo minus mirabuntur, qui propenſiorem Stahlianorum principiorum patro-
num, acutumque eorundem deſenſorem Noſtrum iam norint.

p.376. In *claffi quinta*, morbos *dyspnoeicos ſeu anhelationes* continente, varias difficultates circa reſpirationem naturalem, et praeternaturalem atque difficilem occurrentes ſoluit, et vtramque viginti et quatuor pro-
poſitionibus illuſtrat.

p.419. In *ſexta* vero morbos *paralytodaecos ſeu debilitates* pertractat. *Claffis huius character eſt partialis vel integra ſenſuum, appetituum, motuum tum liberorum, tum naturalium ſenſibus prius obuiorum debilitas.* Ad hanc inducendam requiritur, vt vel fluxus fluidi ner-
uei ab animae ſede ad organon, aut ab hoc ad illam intercipiatur. Id quod fieri ſolet, vel quia vis ani-
mae imminuitur, vel quoniam fluido tranſituro re-
ſiſtentia opponitur. Morbi ſoporofi paralytodaeci Noſtro illa genera morborum ſunt, quae in paro-
xyſmis ſoporem comitem habent, vt apoplexia.

p.444. *Morbi dolorifici ſeu dolores*, de quibus in *ſeptima claffi* ſermo ſit, *morbi ſunt, quorum praecipuum ſymptoma eſt ingrata et moleſta ſenſatio, aut imaginatio, qualis ex partium neruearum laceratione, roſione, uſtione, preſſione, aut diſtractione oritur.* Patet ex hoc cha-
ractere, duplicem eſſe dolorem, alterum, qui ab actione corporis cuiusque in neruos producitur, al-
terum, qui ſine hac, a ſola actione ſimili in medul-
lares cerebri fibras proficiſcitur. Ille *ſenſitiuus*, hic *imaginarius* Cl. Auctori dicitur. *Principia dolorum ſunt 1) instrumenta vel mechanice pungentia, vel pre-*

prementia, vel trahentia, vel vulnerantia aut contundentia; 2) *infarctus* vasorum a copioso vel spisso fluido, quo vasa infarcta aggrauantur et distenduntur, vnde dolor grauatiuus, vel etiam fortius distrahuntur, vnde dolor tensitiuus, vel pars inflammata in apice fere rumpitur, vnde punctorius, perterebrans, pulsansque dolor nascitur; 3) vitia solidorum maiori *erethismo* pollentium; 4) acrimonia humorum, illi parti magis inhaerens, cui grauitate specifica magis affinis est, vnde materia arthritica articulos, scabiosa cutim etc. aggreditur; 5) *conatus naturae* ad materiam quamcunque morbificam corrigendam aut inuertendam, qui quidem, vt Nostro videtur, frequentissimum dolorum principium constituunt. His etiam dolores ad partum Cl. Auctor adnumerat, eosque non a pondere fetus, vterum sollicitante, sed a sola natura, hospitem extrusura deriuat. In curatione doloris sensitiui eo enitendum est, vt fibrae nerueae distractae tensio relaxantibus minuatur, animae sensibilitas anodynus imminuatur, aut plane sufflaminetur, et principia superius enumerata remoueantur.

Morbi vesani seu vesaniae, octauam classem con- p.461.
stituentes, sunt illi, quorum praecipuum symptoma est animae error, alienatio, delirium, aut dementia, seu imaginationis, iudicii, aut cupiditatis, vel voluntatis deprauatio. Diuiduntur errores a Cl. Auctore in *theoreticos* et *practicos*, etenim aut falsum quid pro vero agnoscimus, sine eo, quod subsequatur animi pathema, et error ille *theoreticus* est, aut idem vitium cum subsequente animi pathemate committimus, et error *practicus* exurgit. Prior *hallucinatio* dicitur, alter vero, si pathema animi ipsi saltem aegro nocet, *delirium* vocatur, qui, vbi animi pathema vel et aliis infensum esse incipit, *furoris* nomen adipiscitur.

Morbi

Generalia in chronicis morbis indicata sunt 1) colatoria quaecunque aperientia 2) vitiosas digestionem corrigentia, 3) roborantia, 4) acrimoniam edulcorando viscidaque fluida resolvendo obstructa vasa visceraque referantia.

Absolutis nunc iis, quae in primo tomo comprehendebantur, ad reliquos duos totius operis tomos, ordines, genera et species morborum complectentes, descendimus, in quibus, quum fusiores esse, arcti nimis recensitionis limites non patiantur, tabulam saltem synopticam classium et ordinum, in fronte tomi secundi a Cl. Auctore exaratam, Lectoribus nostris tradimus, cui speciminis loco, specialiore classis cuiusdam synopsis, ordines cum generibus exponentem subiungimus, species dein alicuius generis enumeramus, et, ne negligentiores utique fuisse videamur, quae tandem in toto opere potiora nobis visa sunt, quam breuiter fieri potuit, cum delectu adducimus.

Synopsis classium et ordinum

Classis I. *Vitia*. Symptomata cutanea leuissima, vel mechanicis chirurgiae auxiliis curanda. Ordo 1) *maculae*, coloris natiui mutationes; 2) *efflorescentiae*, tumores humorales exigui gregales; 3) *phymata*, tumores humorales solitarii; 4) *excrecentiae*, tumores a solidis adauctis; 5) *cystides*, tumores capsulati fluido referti; 6) *ectopiae*, tumores a partibus a sua sede dimotis.

Classis II. *Febres*. Pulsus frequens, fortisque viribus artuum imminutis. Ordo 1) *continuae*, quarum pyrexia semel crescit semelque decrescit in decursu aegritudinis; 2) *remittentes*, quarum pyrexia pluries crescit et decrescit in decursu aegritudinis; 3) *intermittentes*, quarum pyrexia pluries accedit et omnino recedit in decursu aegritudinis.

Classis

Classis III. *Phlegmasiae*. Concurrit pyrexia continua vel remittens cum interna inflammatione, vel cum exanthematis. Ordo 1) *exanthematicae*, eruptiones cutaneae cum pyrexia saepius maligna; 2) *membranaceae*, viscera membranosa dolent; tumet cum pyrexia acuta; 3) *parenchymatosae*, adest dolor obtusus, calor et tumor in visceribus farctis, non saciformibus cum pyrexia acuta, suppurationis apparatu.

Classis IV. *Spasmi*. Contractio inuita constans vel interpolata musculorum organis loco motuiis, non vitalibus inferuentium. Ord. 1) *tonici partiales*, rigiditas et immobilitas artus vel organi determinati; 2) *tonici generales*, rigiditas totius fere corporis; 3) *tonici partiales*, agitatio coacta, non libera organi vel artus, eiusue motus vitiosus; 4) *tonici generales*, agitatio coacta totius fere corporis, sensibus saepe obscuratis.

Classis V. *Anhelationes*. Agitatio inuita, defatigans, musculorum pectoris, unde respiratio difficilis, frequens, sine febre acuta. Ord. 1) *spasmodicae*, insultus fugaces agitationum pectoris cum expiratione vel inspiratione sonora; 2) *oppressivae* constantes in ipsis paroxysmis pectoris agitationes, caeque frequentes ac laboriosae.

Classis VI. *Debilitates*. Vires solitas in agendo exercendi impotentia. Facultates virium dispensatrices sunt tres; facultas cognoscendi, appetendi et mouendi. Ord. 1) *dysaesthesiae*, debilitates sensuum, ut visus, tactus, auditus sine sopore; 2) *anepithymiae*, debilitas vel abolitio cupiditatum, ut famis, fitis, libidinis sine sopore; 3) *dyschinesiae*, debilitas motuum in organis locomotiuis, non in vitalibus; 4) *lypopsoychiae*, seu morbi syncoptici, debilitates motuum vitalium, adeoque totius corporis; 5) *comata*, seu morbi soporosi, debilitas, omnisque sensus nec non phantasiae obscuratio, motuumque liberiorum imminutio vel suppressio.

Classis

Classis VII. *Dolores*. Cuiusvis experientia cognoscendi, nulla definitione distincte explicabiles sunt. Ord. 1) *Dolores vagi*, qui nomen a sede fixa non habent; 2) *Dolores capitis*, ut oculi, oris, cranii, dentium; 3) *dolores*, thoracis, ut lateris, oesophagi, dorsi; 4) *dolores abdominis*, ut stomachi, intestini, hepatis, etc. 5) *dolores artuum*, ut ischias, gangraena, etc.

Classis VIII. *Vesaniae*. Character est imaginationis, iudicii, voluntatis, etc. deprauatio. Ord. 1) *hallucinationes*, errores imaginationis, saluo intellectu, ab organorum externorum vitio; 2) *Deliria*, errores iudicii ab imaginationis vitio, quod intellectus corrigere nequit; 3) *Morositates*, voluntatis et cupiditatis deprauatio in appetendo aut auerfando; 4) *anomaliae* morbi prioribus affines.

Classis IX. *Fluxus*. Character est eiectio fluidorum aut contentorum, quae quantitate, qualitate, defuetudine notabilis est. Ord. 1) *sanguifluxus*, eiectiones cruentae, vel sanguineae vndecunque procedant; 2) *aluifluxus*, deiectiones ex ano, vel reiectiones ex oesophago, eorum, quae in primis viis latebant; 3) *serifluxus*, eiectiones urinae, lymphae, muci, lactis, puris ex aliis locis quam e primis viis; 4) *aerifluxus*, flatuum, vaporum, etc. eiectiones.

Classis X. *Cachexiae*. Coloris, figurae, molis in corporis habitu deprauatio. Ord. 1) *macies*, corporis partium mollium extenuatio; 2) *tumores*, corporis generalis intumescencia, seu adauctum volumen; 3) *hydropes*, partium quarundam intumescencia a contentis adauctis, sapius fluidis collectis; 4) *tubera*, partium quarundam intumescenciae firmae; 5) *impetigines*, cutanei tumores pustulosi, crustacei, gregales; 6) *decolorationes*, coloris natiui deprauationes; 7) *anomaliae*, continent morbos prioribus affines.

Classis secundae synopsis

Febres. Charact. Syndromes frigoris, successiuique caloris cum artuum debilitate et pulsus vi adaucta, saepe quoad frequentiam.

Ordo I. *Continuae.* Pyrexia semel crescit, et semel decrescit in decursu aegritudinis. Genus 1) *ephemera*, decursus aegritudinis intra dimidiam septimanam absoluitur. Vigor morbi subito accedit; 2) *synocha*, decursus intra septimanam, incrementum successiuum; 3) *synochus*, decursus intra duas saltem septimanas, pyrexia maior; 4) *typhus*, decursus ad tres septimanas et ultra, pyrexia nulla, aut exigua, debilitas maxima; 5) *hectica*, decursus ultra mensem, pyrexia exigua, debilitas parua.

Ordo II. *Remittentes.* Pyrexia pluries in decursu morbi crescit et decrescit, non omnino recedit, typus saepe confusus. Genus 6) *amphimerina*, remissio quotidianae typum seruat, frigus in paroxysmis; 7) *tritaeophia*, remissionis typus tertianarius, frigus fere nullum; 8) *tetartophia*, remissio quartanae typum seruans.

Ordo III. *Intermittentes.* Pyrexia pluries in decursu aegritudinis deserit et recurrit cum interual-
lis lucidis. Genus 9) *quotidiana*, accessus similes quolibet die accidunt; 10) *tertiana*, accessus similes alternis diebus reuertuntur; 11) *quartana*, accessus similes, duobus interpositis diebus recedunt; 12) *erratica*, accessus similes distantes ab inuicem pluribus quam quatuor diebus, aut typi omnino incerti.

Possemus quidem commodè hic loci huius alteriusue generis febrium species nominare, sed ne in his toti esse videamur, e classe sexta eas cataraetae depromere placuit. Sunt autem illae: 1) cataraeta vera *Maitreian*; 2) cataraeta virgata *S. Yves*; 3) cataraeta purulenta *Antonii Maitreian*; 4) cataraeta argyrias *Wolhousii* et *Maucharti*; 5) cataraeta cla-

uata

uata *Wolhoufii*, albula et tophus *veterum*; 6) cataracta laxata; 7) cataracta a synchysi *Maucharti*; viua *Wolhoufii*; glaucoma *Heifteri*, 8) cataracta anti-glaucoma *Ant. Waitreian*; 9) cataracta glaucoma *Ant. Maitreian* 10) cataracta membranacea *Wolhoufii*, a tela *Hist. Acad. Paris.* cataracta vera *veterum*; cataracta membraneo-floccosa *Maucharti*; 11) cataracta secundaria *Hoin Acad. Chirurg.*

Sequuntur nunc pauca, hinc inde excerpta, T. II. digna prae aliis visa, quae Lectoribus tradantur. P. I.
Dolores, morsus apum insequentes, veneno acido corrosiuo, cum aculeo vulnere immisso Cl. Auctor tribuit, qui aculeos, vrticae vrenti infidentes, pariter succo venenato plenos esse adserit; syrones autem pro veris insectis intra manuum pedumque cutem se infinuantibus, eandemque in pustulas pruriginosas attollentibus, habet. In pernionibus acrimonia alcalina accusanda est, vnde optimum remedium spiritus salis est. p. 22.

Vidit Cl. Auctor aegrum vehementioribus capitis doloribus ac febre alternis diebus diuexatum, quem iteratus quotidie bellici tympani sonus ita subleuauit, vt vel huius aliorumque auxiliorum ope perfecte conualuerit. p. 249.

Malignus Nostro dicitur morbus, qui cum spontanea virium prostratione inuadit, et cuius symptomata nec stadiis morbi, nec signis externis v. c. calori respondent. In febre castrensi hungarica inter alia medicamenta, putredini humorumque dissolutioni resistentia, sequens commendatur iulapium: Rec. Fol. ruth. scord. an. Mij. cort. citr. vnc. ij. succ. citr. vnc. iij. aut acet. vin. vnc. semiss. aqu. com. lib. iv. liquori filtrato misc. rob. sambuc. vnc. iv. aqu. stillat. cinnam. vnc. j. bibat aeger vnc. j. quauis hora de die et noctu, nisi somnus impediuerit. In hectica scrophulosa vsus aquae marinae proficiuus iudicatur. p. 252.

In hemitritaei disquisitione bene monet Noster, quod ex sola pulsus frequentia non debeat iudicari, vtrum febris intermittens vel remittens adsit, et quod, vbi grauiora vrgeant post paroxysmum symptomata, aut vires depressae remaneant, ad praesentiam febris minime intermittentis concludendum sit, quantumuis pulsus non amplius frequens tangatur. Malignitatem in morbis admittit Cl. Auctor, eamque per summam nocendi facultatem a solis principiis, physicis, neutiquam mechanicis dependentem definit. Curatio intermittentium duplex, alia nempe palliativa, alia radicalis est. Illa raro, nisi radicalis praegressa fuerit, locum habet, interim tamen adhibenda est, vbi necessitas postulat, id quod narcoticis cortici peruiano adiectis obtinetur. Venae sectionem in aestu febrili instituere, cathartica immediate post aestum ingerere, corticem vero peruianum tempore intercalari propinare Noster praecipit, qui semina passinae ad drachmam sumta, testas autem ouorum calcinatas et in puluere bis vel ter per diem ad semidrachmam ingestas febres feliciter profligasse expertus est. Tertiana, venae sectione et cathartica praemissis, cortice peruiano propellitur, qui, quamdiu febris saeuit, extra paroxysmum quarta quauis hora diu noctuque ad drachmam vnam in substantia adsumendus, vbi vero febris iam cessauit, per septem dies bis in die, et tunc per alios septem adhuc dies, semel, aut alternis saltem diebus deglutiendus est. Huic in quartana, cum aeger senex et pituitosus, aut summum in accessu frigus est, guttae aliquot elixirii proprietatis, vel pauca grana salis ammoniaci, vel theriacae recentis admiscenda sunt.

P.37^r. Optumo iure Cl. Auctor optat, vt a mortis periculo, quod variolae inferunt, miseri infantes infitionis ope liberentur, meritoque miratur, quod vel hodiernum adhuc sint, qui de felici hoc euentu dubitent,

bitent, quum experientia compertum fit, vix e trecentis aut quingentis, quinimo millenis, infitionem admittentibus, vnum tolli, eorum vero, quibus spontaneae variolae superueniunt, ex Cl. IURINI calculo vix septimum feruari. Curationem discretarum malignarum et confluentium ita instituit Noster, vt ante eruptionem semel vel bis venam pertundat, post emeticum et, si eruptio non vrgeat, catharticum exhibeat. His praemissis ptisanam, in calidis temperamentis spiritu vitrioli impraegnandam, ordinat. Post eruptionem vero vespere syrupum papaueris albi propinat, quem in confluentibus vel et mane, et si phrenitis imminet, in magna dosi, in infantibus autem parcius ingerit. Ischuriam superuenientem obambulatione dissipat, viscidiorum vero saliuam gargarismate ex aqua hordei cum melle diluit. Soporem vesicatorio in nucha, aut allio plantis pedum applicato profligat.

In amphimerina secundaria, vndecima die ut plurimum superueniente, si mors imminere videatur, venae sectionem in pede instituit, in sequentibus diebus reiterandam, post catarticum, imo si vires patiantur, vomitorium exhibet, nec paregorica omittit. Vbi pustulae exarescunt, per biduum faciem pomata, quae oleum amygdalarum excepit, inungit, oculis autem iisdem conspurcatis, ipsisque palpebris insigniter tumentibus, infusione croci in aqua rosarum intra palpebras immissa prospicit. Balnea in cacochymicis, et vbi metus est, ne malignae variolae progerminent, dissuadet. In aphthis, quae vir- p.429.
tute antialcalina pollent, vt acida, vel edulcorantia sanguinemque depurantia commendat.

In phlegmasiarum membranarum examine Ill. HALLERO, membranis sensum deneganti, non modo contradicit, sed et inflammatas eas acerrime dolere adferit, et ad experimenta in viuis animalibus capta

pronocat, In pleuritide putrida, misso semel vel bis sanguine, praemissoque enemate, leue emeticum, cum guttis aliquot syrupi Glauberiani, duabusque mannae vnciis, optumo cum successu exhibet, eodemque remedio non minori cum fructu in peripneumonia putrida vtitur.

- T. II. Viro, qui ad sitim extinguendam baccas coriariae comedit, superueniunt post horae quadrantem,
P. II. P. 85. cardialgia, vertigo, conuulsiones, sensuum abolitio, facies liuida, et horum omnium sequax comes, mors. Aperto cadauere, exiguae in tunica villosa stomachi maculae rubrae, et vndecim baccae comparuerunt. Sanguis fluidissimus. Idem triste factum sex alii diuersae aetatis homines experti sunt. In baccis, nec gustu, nec ipsa chemica analysi, aliquid acris aut corrosiui deprehensum est. In tussi
p. 156. conuulsiva, Gallis *Coqueluche* dicta, specificelaudantur lichen pyxidatus in lacte coctus, saccharum saturni ad grana duo vel tria, cortex peruianus parua dosi propinatus, et succus pulegii. Vapores mephytidum, vini fermentescentis et cellarum diu clausarum, non tam orthopnoeam, ac illi sulphuris, vitrioli etc. quin potius asphyxiam excitant, qua homines fulmine quasi tacti subito extinguuntur.
p. 362. Testatur Cl. Auctor, se vidisse, qui electrifati sensum motumque recuperarint, a multis retro annis penitus subflaminatos. Hemiplegia ex epilepsia, vtut insanabilis, ita tamen perniciosa non est, atque illa, cui conuulsiones superueniunt, siquidem haec interitum non procul absentem praenuntiat. Hemiplegia arthritica adfectis primae electrificationes viscosum ex digitis adfectis sudorem eliciunt, febrem praesentem compescunt, somnum arcessunt, sensumque cuius digito atque manui flexibilitatem et sensibilitatem restitunt.

Vir, qui a multis annis ulcera venerea passus p.374.
 erat, gonorrhoea virulenta inconsulte repressa, ipsa-
 que saluatione frustra adhibita, in paraplegiam in-
 completam incidit, quae post semicupium, ex aqua
 liquore saturni dealbata vsurpatum, perfecta euasit.
 Tentauit Cl. Auctor in hoc aegro per duos men-
 ses vsum mercurii sublimati corrosiui a SWIETE-
 NIO collaudatum, sed frustra. Asphyxiam, quin
 ipsam etiam mortem eorum, qui in cupis, in quibus
 mustum fermentescit, enecantur, a fluidi neruei ele-
 ctricitate suspensa, adeoque omni actiuitate extincta
 Noster deducit, optimumque hoc in casu esse adse-
 rit, si extracti et aeri frigido expositi, frigida prius
 in facie conspergantur, atque spirituosus deinceps
 excitentur. Idem auxilii genus etiam praestandum
 foricariis est, qui quam primum crustam, stercore
 foetidissimo in foricis supernatare solitam, incautius
 rumpunt, illico tamquam mortui et asphyctici con-
 cidunt, cum apud Mutinenses non asphyxiam, quod
 mirum est, sed amaurosin contrahant. Inter alias
 catalepticorum historias lectu vtique dignas, praefer-
 tim legi meretur, quam de puella Cl. Auctor refert, cui
 post varia per aliquot annos frustra adhibita reme-
 dia, tandem catameniorum proruptio sanitatem at-
 tulit. Carus nyctagmus, a nemine adhuc descri-
 ptus, bis a Nostro obseruatus est. Ille nimirum is
 est, qui subito hominem corripit, omnem sensum
 motumque artuum sufflaminat, pulsu et respiratione
 pacatissimis, cum nictitatione veloci et continua
 ciliorum.

Doloris nomine non tantum viuendam illam sen- T. III.
 sationem, a neruearum fibrarum distractione oriun- P. I.
 dam, Cl. Auctor intelligit, sed omne id, quod mo- p. 5.
 leste animam adficit, angit, vexat, ex corporis dis-
 positione oriundum; frigus itaque, anxietatem etc.
 doloribus accenset. In odontalgia obseruat, quod,

si dens cariem admiserit, sequenti anno, caries dentis, in latere opposito ipsi respondentis, sit expectanda. In odontalgia scorbutica succum limonum vel aurantium ceteris anteposit, foliaque cochleariae, sylimbrii aquatici, et acetosae saepius masticanda commendat.

P. 165. Inter lithontriptica vltatiora laudantur: 1) aqua calcis ostreorum per menses et annos haurienda, quae vt Noster obseruauit, laudabiles effectus praestitit; 2) sapo albus, qui, si quotidie ad semiunciam deglutitur, dolorem saepius compescit, ipsumque calculum lente dissoluit; 3) infusum vuae vrsi, quod calculos friabiles, granulatos dissoluto glutine in fragmenta minora diffringit sed sine cautela adsumtum dysuriam excitat, et calculi tamen molem vix imminuit, licet maxumam lutulentae vrinae copiam vt infusum parietariae exturbet. Melancholia errabunda, rarissima melancholiae specie, mulier septuagenaria Monspeliensis epileptica, a tribus annis iam laborat, ex quo ad epilepsiam profigandam per triduum magna dosi hepatis lupini exsiccati vsa est.

T. III. Sputum sanguinis, eruptionem pustularum in variolis confluentibus praecedens, vt certum mortis in-
P. II. secuturae signum Cl. Auctor considerat, ipfique, quum a sanguinis dissolutione proficiscatur, potum adstringentem, spiritu vitrioli ad gratam aciditatem saturatum, opponit. In vulneribus thoracis suafor est, vt vulnus non semper apertum seruetur, ne aeger aut suffocetur, aut in grauiorem inflammationem incidat, illud tamen semper clausum tenere prohibet, via enim cruori effuso praeclusa hic in cauo thoracis accumulatus aut aegrum suffocat, aut putrescendo mortem maturat.

P. 115. Ad vomitum marinum arcendum suadet vt 1) aegri supra pontem degant 2) in loco a puppi et prora aequidistanti 3) laute manducent 4) decumbant

bant potius quam pedibus insistant. Diarrhoea variolis confluentibus superueniens saluberrima, ideoque minime reprimenda est. Si diarrhoea in variolis discretis ante eruptionem accedit, illa a saburra primarum viarum proficiscitur, et rhabarbarinis et absorbentibus promouenda est, at vero eruptionem si sequitur, ut insalubris summeque nociua diascordio, theriaca aliisque compescenda.

Flatulentiae hypochondriacae obnoxios, post cathartecorum adstringentium, ut rhei, usum, infanabiles euadere Cl. Auctor adserit, effectumque hunc infaustum alui constipationi, abhinc oriri solitae, adscribit. p.241.

Chirurgus, quem quartana diu male habuit, toto corpore, cum pallore intumuit. Tumor in quibusdam locis erat oedematosus, in facie vero, pectore, manibus atque suris emphysematosus simul et elasticus. Post varia remedia incassum tentata electrificatio quater instituta id effecit, ut vires, somnum, colorem, sanitatemque perfectam aeger recuperaret. p.295.

Anasarcam, quin ipsum etiam ascitem a scabie retropulsa oriundum, induta scabiosa tunica, abindeque scabie restituta, sanatum vidit Cl. Auctor, qui, si vnquam, in hoc casu forte profutura sudorifera existimat. Fluidum hydropicorum, paracenthesi educitum, ad ignem more albuminis ouorum concrelescere adserit, id vero non semper ita fieri, experti confitemur. Insignem illam in eradicando cancro cicutae potentiam, vel Monspeli non modo non tantam, ac Cl. STOECK celebrat, quia etiam nullam fuisse Cl. Auctor affirmat, qui ab atropa, belladonna foliisque phytolaccae plus sibi promittit. p.337.

VIII.

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar för
År 1761. Vol. XXII. Med Kongl. Acade-
miens Tilstånd Trickt i Stockholm hos Di-
rect. Lars Salvius på des egen Koftnad.
1761. 8 mai. plag. 20 $\frac{1}{2}$ tab. aen. 7.

h. e.

Acta Acad. Reg. Scient. Suecicae An. 1761.

Trimestre primum.

- I) 10. CAR. WILCKE *de figurarum niuis varietate*
agit. Vt illis similes arte produceret, usus est bul-
lis, ex aqua, saponibus admixtis viscida, quas ex
tubo, quo mediante inflatae erant, pendentes con-
gelari passus est. Ita vero vidit sub initium conge-
lationis superficiem bullae radiis, velut floribus gla-
cialibus, obduci. Post velut stellae quatuor singulae
radiatorum apparent, tandem vulgares, sex radiatorum,
angulos 60 gr. continentium. Ex radiis principali-
bus laterales emergunt, sicque paullatim contextus
oritur, in quo stellae figura oculo non satis attento
dispareat, aut in hexagonum regulare abeat. Mul-
tum vero ad rem facit conditio saponum aut salium,
quae in mixtura, vnde facta est bulla, continentur.
Primariam vero causam figurarum harum omnium
p. 12. eiusdem generis, nisi quod ob circumstantias acciden-
tales differant, statuit eam aquae proprietatem, qua
dum in glaciem abit, certis sub angulis particulae gla-
p. 13. ciales ad se mutuo inclinantur. Deinde memoratu
digniores figuras niuis naturalis, quas videt, descri-
bit, et in classes dispertitur.

2) PETR.

2) PETR. KALM. *Hyemis, quae annum 1760* p. 19.

finiuit, et 1761 inchoauit, effectus in plantas describit. Seuerior, vt notum est, fuit haec hyems, ipsamque anni 1709 superauit, nisi quod breuiori tempore regnauerit. Noster primo meteorologicas obseruationes, tum ad hanc hyemem, tum ad alios annos pertinentes exhibet, inter quas est calor ipsi obseruatus, d. 22 Iun. 1757 h. 3 p.m. graduum 32 therm. p. 22. Suecici, maximus, quem per octo annos his obseruationibus incumbens vidit. Plantarum tres classes facit, indigenarum Finniae, earum, quae adhuc in hortis coluntur, et earum, quas ex seminibus, quae ex America septentrionali secum tulerat, educauit. Ad primam classem pertinet fraxinus excelsior p. 29. omnium fere arborum Finnicarum frigoris maxime impatiens. Nam magnae arbores, altitudinis pedum 18, etiam quae tutamen habuerunt, a borea perierunt, paucis saltem superstitibus; quarum altitudo pedes sex non excessit, eae, quantum extra niuem prominuerant, interierunt, sed quae pars niue tecta fuerat, aestate sequente stolones protrudit. Similia fere reliquis arboribus acciderunt. Ceterum reliquis annis, nouem vero Noster ibi plantandis etiam fraxinis occupatus fuit, nunquam hanc arborem ab hyeme laesam vidit. Tota enumeratio iis vtilissima est, qui, quare plantae hyemes Finnicae tolerant, scire gestiunt. Moro albae non plane intolerabilem fuisse hanc hyemem docet Noster; ribes varii generis nil ab illa senserunt.

3) *Quomodo cesserit satio ope machinae cuiusdam per-* p. 41.

aeta, narrat CAR. IO. CRONSTAET. Machina est, quam CHATEAUVIEUX inuenit, et DU HAMEL in tr. *de la Culture des terres* Voll. III et IV descripsit. Etsi euentus ostenderit, ita messes valde augeri, de vtilitate tamen machinae, in primis noui illius modi agrum colendi, quem DU p. 48.

HAMEL

HAMEL proposuit, nihil statuit Noster, antequam experimenta plurium annorum ostenderint, num fructibus his incommoda ex mutato omnino agrum colendi modo nascitura pensentur.

- P. 50. 4) *Tentamina de Muscis (Mossars) exstirpandis*, Auctore LAUR. WOLF. ROTHOF. Fossis aquae abducendae dissecuit agrum, et varia terrea, ut arenam, calcem, argillam intulit, quorum singulorum qui effectus fuerit, enarrat. Cespes ex fossis extractus, ubi in humum dilapsus est, quasdam plantas, ex plurimis immixtis feliciter nutriuit, ut linum, fecale, pisa, fabas, cepas etc.

- P. 55. 5) *Insulam Ferdinando Noronho*, ut 1760 illam vidit, describit. CAR. GUST. EKEBERG. Brasiliae vicina est, lat. gr. 3 min. 47 long. 31 gr. 6 min. occidentalior Londino. Lusitani illam inprimis militibus praesidiariis tenent, quos saepius mutant.
- P. 60. Calor solis ventis temperatur; tum saltem cum sol bis quotannis vertici imminet, frequentiores sunt
- P. 64. imbres. Itaque saluberrimus est aer, et sesquianno non nisi duo incolarum ex sexcentis, sed solum maribus, feminis enim insula interdicta est, mortui sunt, qui sub dio dormiuerunt, et subito refrigerati, dysenteriam cruentam sibi concitarunt. Insula omnibus naturae donis abundans, optime coli posset, si perpetuis et agro colendo deditis incolis traderetur.

- 6) *Superfoetationis casus aliquot enarrat.* 10.
- P. 69. GUST WAHLBOM. Primus est feminae, secundo partu difficili labore filium viuum et perfectum enixae, secundinas vero sequutus est embryo mortuus 3 vel 4 mensium, membranis propriis inclusus, sed ita alterius membranis adnatis, ut in duplicatura amnii et chorii situs

fitus videretur. Funiculus umbilicalis venarum aliquot crassiorum speciem habebat, per chorion ad placenta adscendens. Num propria placenta gauisus sit, ab alterius placenta separabili examinare Noster non potuit. Putrefactionis signum nullum, sed caput compressum, ut monetae cuiusdam crassitiem, saltim haberet, corpus quoque intortum. Alia fe- p. 70.

mina post puellam perfectam, viuacem, foetum, qualis sex mensium esse solet, edidit, qui in quintum diem vixit, sed non nisi duas aut tres guttas lactis materni fugere potuit, quoties vberibus admoueretur. Matrem praegnantem maritus peregre profectus reliquit, post tres menses rediit, ubi secunda vice impraegnatam se femina credidit, quod aetate foetus tenerioris confirmatur. Dubio, gemellos p. 72.

fuisse, quorum vnus, ab altero oppressus, non satis creuerit, respondet: gemellorum singulus suo funiculo, suaque placenta nutriri, similique argumento suspicionem formari posse, vnicum embryonem matris debilioris, nouem suis mensibus non satis incrementi habiturum, cuius tamen exemplum nullum prostat. Eos, qui asserunt, mortuum infantem diu in vtero iacuisse, donec cum altero viuo protruderetur, concessa etiam rei possibilitate, secundo casum quos edidit, satis refutari existimat, ubi vterque infans viuus prodiit. Exempla vero foetuum perfectorum secundorum, plurimis septimanis post primos editorum, cum suis comparans, foetum secundo genitum, cum contigit, ut placenta eius senioris placenta accrescat, nimis cito cum eo propelli, hicque abortum fieri infert, cum alias diutius in vtero degens maturescere potuisset. Igitur obstetrices monet, ne, ubicunque duos foetus sentiunt, gemellos existiment, sicque arte sua, teneriorem, quem in vtero relinquere debebant, protrahentes, interimant. Euenit vero utroque casum, quos Noster enarrat, p. 74.

ut iu-

vt iunior foetus primo se obstetrici obtulerit, doloribus vero incrementibus loco pulsus a fratre seniore fuerit, eumque primo prodire permiserit.

p. 77. 7) *Suam methodum, qua ex cupro in fodina Aedelforns commode aurum elicit, describit: ANDR. SWAB.*

p. 79. 8) *Quomodo arbores iuniores hyeme a muribus defendendae sint, ramusculi insititii aestate a solis calore docet I. A. HELDENHIELM. Segmentum corticis betulae, aquae calidae ope curuatum, arbori prope radicem bis circumplicatur, quo efficitur, ut mures nunquam illam arrodant, cortex vero crescenti arbori cedit. Eodem cortice circumposito ramusculos insititios tuetur. Talpis fugandis lupinus sylvestris commendatur in CHOMELII lexico oeconomico. Noster multa olim in horto suo a talpis passus, tribus annis, quibus lupinum sylvestrem ibi coluit, nullam vidit.*

p. 81. 9) *Addit quaedam praecedentibus E. G. LIDBECK. Corticis velamento addi posse censet picem liquidam arbori illitam, qua formicae ne ascendant*

p. 82. *impediuntur. De talpis monet, recentiorum aliquos statuere, illas non vegetabilibus, sed animalibus subterraneis vesci. Lupinorum effectum aliis experimentis examinandum censet, cum quaedam illorum species inodoraе sint, lutea bene oleat, sicque non ingrata futura animanti videatur. Sed coriandrum, cuius dum viret, caulis, folia, et semina, foetorem cimum spargunt, talpis inimicum observavit, illo ad fugandas talpas feliciter usus est exper-*

p. 83. *tus. Dubitat vero, an talpa radices aut cortices arrodant, cum dentes ipsi non sint rodentes, neque ad glires Linnaeanas spectent; sed hoc rattis aquaticis*

ticis tribuit, qui etiam cumulos, talparum cumulis similes, eiiciunt post diem Bartholomaei, quos si forte destruxeris, statim restaurant, incertum, an quod diem timeant, an quod frigus. Eosdem vel plantando coriandrum expulit, vel pecuriari aliqua machina, in qua apii dulcis radix recondita erat, magna copia coepit.

10) *Ex diario Acad. R. Excerpta.* Praemia aurea Sparreana duo cum quotannis daturam se obstrinxerit Academia, tria hoc anno dispertita est. KLINGENSTIERNA, eminenti Mathematico, Cancellariae Consiliario, et Principis Regii Informatori, ob commentationem de lucis aberratione in superficiebus sphaericis, et lentibus. ROSENIO, Archiatro, et stellae polaris equiti, ob dissertationem de vermibus inprimis de taenia, quod in ea nouum et experimentis firmatum remedium edidit. SCHEFFERO, Directori, iam fatis functo, quod in dissertatione, qua fastitii metalli *Pinschbeck*. compositionem ostendit, varia vtilia ad cupri liquationem pertinentia docuerit. Praeterea vero duabus quaestionibus certis soluendis Academia quotannis iam bina praemia proponit, singula vni Sparreanorum aequalia. Hoc quidem anno, quaerit, 1) de causis muscorum in pratis, et modo illorum prouentui obuiam eundi; 2) Cur arthritidis recentius in Suecia frequentior sit, et quibus remediis praecaueri aut tolli possit.

Trimestre secundum.

1) WILKINS telam, quam trimestri superiori p. 87. exorsus erat, pertexturus, de varietate figurarum niuis naturalis agit. Causam illarum repetit a vaporibus aqueis, nota lege in radios angulis 60 gr. inclinatos congelantibus, quibus radiis forte alii vapores postea adhaerent, unde irregularitas si qua est figura- p. 82.

figurarum. Memoratu dignum est experimentum, quod Noster aerem ex aqua dum congelatur, ex-
 p. 96. primi monstrat. Notum est, aqua in vase quodam in glaciem abeunte, extremam superficiem primo indurescere, et restare in medio velut nucleum quendam aqueum, bullis aereis plenum, quae tandem coeuntes et expansae superficiem glaciei alicubi diffringunt. WILKINS igitur in vase cupreo aquam coctam congelari passus est, quae, cum multo minus aeris quam frigida hausta, contineret, cortice glaciali multo crassiore obducta est. Illum perforavit, donec ad nucleum quem diximus aqueum perueniret. Tunc vero, aperto foramine, subito aqua ex eo aliquot pedum altitudinem profluit, indicio, ab aere, in illum locum ex glacie velut expresso, proiici. Hinc consilium cepit, quam primum prima lamina glaciali aqua tegi inciperet, illam perforandi, et siphunculo aquam prorumpentem auferendi. Interdum integram lagenam aqua sic hausta repleuit, nullo in loco unde hausta erat vacuo conspicuo, quoniam scilicet aer ex glacie rursus in aquam eo loco contentam, intrauerat. Ita aeri ex glacie exituro via aperitur, efficiturque, ut glacies nascatur illis experimentis idonea, in quibus pura et sine bullis aereis desideratur. Nucleus vero ille aqueus vix in solidam et perspicuam glaciem abit, sed vel innumeris bullis aereis plenus indurescit, vel in plurimas laminas glaciales diuersi positus et variae magnitudinis abit, inter quas liquida aqua fluit, indicio, aquam, quae plus aeris, quam in naturali statu continere solet, recepit, plerumque in laminas congelari; vaporum vero aereorum in aere pendulorum idem fere status est, unde, cur figurae niuis non gibbae, sed lamelliformes sint, intelligitur. Varieta em vero figurarum niuis satis
 P. III. vero similiter ex lege illa congelationis, quam ante dixi-

diximus, additis iis, quae possunt nascenti niui aut cadenti accidere, explicat.

2) DE GEER *Voluocem globosum* LINN. Syst. Nat. p. 111. Ed. X. p. 820. no. 1. describit. Animal est quod ROESELIIUS *Inf. Bel. T. 3 p. 617 tab. 101 fig. 123. Kugelthier* appellauit. Noster vidit grauidas foetus ipsi grauidis. Id, ante eum, ROESELIIUS iam viderat, qui praeterea in his foetuum foetus alios rursus embryones, et in his rursus alios, quod quidem Nostro non contigit. Sed parere hic vidit matrem octo embryones, vnum post alterum per rimam in cute matris, incertam, quomodo orta sit, prodeuntes, statimque matrem relinquentes, quae, postquam omnes peperit, flauescit, motum amittit, in membranam rugosam abit, sicque cum nunc peregit id, cuius causa creata erat, moritur. p. 115.

3) *Experimenta cum aqua martiali fluii Rio Tinto Hispanici (Andalusiae)* instituta recenset PETR. IONAS BERGIUS. Aqua ab Hispanis multis in morbis salubris, inprimis hydropem pellens, praedicatur. Eius magnam satis copiam obtinuit Noster, et consuetis docimasiis, ferro copiosius, quauis alia re, impraegnata, cupro omnino vacuum, praeterea acido minerali fixo, et pauculo salis communis foetam, reperit. Sapor maxime nauseosus, ac si atramentum gustares. Est etiam aqua haec atramento conficiendo, quauis alia vitrioli solutione magis idonea. Iam igitur vidit, tuto praeberi posse hydropicis, etsi ingratisimum remedium futurum prospexit, inprimis ad vomitum pronis, sed meminit, quoque emetica aliquando prodesse in hydropo, et a ferro admixto roboratum iri partes iusto debiliores expectauit. Eius rei primum experimentum cepit in femina, aetatis inter 30 et 40 annos mediae, quae
Tom. XII. Pars I. E post

post febrem, remedio quodam domestico ut vocant
pulsam, hydropis initia sentiebat, aqua in abdomine,
cum premeretur, fluctuante, et urina impedita, re-
spiratione difficili. Haec, mensura, (*Kanna* cuius quan-
titas ex eo circiter aestimari potest, quod quarta eius
pars, pondus $20\frac{3}{4}$ semunciarum Suecicarum ha-
beat,) aquae dictae paullatim sumta, sanata est.
Idem contigit alii viro, aetat. 40 annor. et feminae
30 annorum, a mensibus obstructis tumentis. Urina
inde copiosius fluxit, mensesque redierunt. Sed
alius vir, cui tumor ex pedibus in ventrem inde ab
8 diebus adscenderat, diarrhoeam quidem, qua si-
mul vehementer laborabat, ab aqua sisti, expertus
est nullum vero contra tumorem auxilium inde cepit.
Ultimo adhibita est in viro, qui diu hydrope labo-
rauerat, variis remediis frustra tentatis, is, tribus
mensuris paullatim sumtis, omnino fere detumuit, ut
spes optima esset, sanitatem recuperaturum esse.
Sed congestum rursus in abdomine et artubus infe-
rioribus liquorem, frustra redeundo ad illum potum
expellere tentavit, nec aliis rebus seruari a morte
p.125. potuit. Erant autem in illo viscerum inde a longo
tempore obstructorum manifesta indicia, quod ma-
lum forte tolli aqua Hispanica non potuit. In reli-
quis casibus, cur res aliquando ex voto successerit,
aliquando non, Noster explicare non audet; exi-
gua copia, quam habebat, aquae, ad sat multa tenta-
mina non sufficiente. Quod ingratum erat in sapo-
re aquae, ipsa consuetudo paullatim vicerat. De ipsa
p.126. aqua ex manuscripto fide digno, Doct. DON BEN-
TURA YGNazio MATHAMOROS Y FIRADO
urbis Zalamea la Real et operarum metallicarum, quae
Aracenas et *Rio Tinto* vocantur, medici, huc re-
fert Noster. Prope montes, quos nominauimus
metalliferos, (quo vero metallo foeti sunt, non in-
dicatur) septem fonticuli prorumpunt aquam, ut cre-
ditur,

ditur, continentes, quae per venas metallicas ad radices montium illorum transferat. Hi fonticuli iuncti riuulum mediocrem efficiunt, cuius aquae sub initium vis, quam diximus, inest, scilicet hydropi, inprimis speciebus eius, quae tympanites et anasarca appellantur, dummodo non nimis altas radices morbus egerit. Vermes etiam occidit, et eicit e corpore humano, tum planos, tum teretes; idoneum quoque in morbis chronicis emeticum. Post accedit alius riuulus *Rio Hudiel*, aquam vehens obscure viridem acescentem, et saporis adeo ingrati, vt vix interne sumatur, sed exterius contra herpeten et varia exanthemata adhibeatur. Iuncti riuuli fluuium satis magnum efficiunt, qui ad urbem Palos mari atlantico commiscetur.

4) *Narrationem de frigoris intensi 1759, 1760 in p. 129. plantas effectu* continuat P. KALM. Orditur ab iis, quas ex seminibus Americae borealis educauerat. Egredie tolerauit frigus nux iuglans alba; eae solae damnum sed leue passae sunt, quibus, vt in altum magis crescerent, plurimos ramos vere praecedente demserat. Similiter plantae Americae borealis pleraeque frigus multo melius tolerarunt Suecicis indigenis. His generalia quaedam ex praecedentibus P. 141. deducta subiungit Noster, non tam frigus seuerum continuum obesse arboribus, quam temperiem hyemis mitiorem, seueriori intermixtam, et gelu Aprili mense, quo ver incipit in Suecia, rediens. Transplantatione, foliis ab insectis aestate praecedente deuoratis, ramorum amputatione, frigori tolerando arbores debiliores reddi. Maxime prodesse tutamen a ventis borealibus. Quorum semina esse teguntur, frigus minus posse ferre.

P. 143. 5) *Observationes transitus Veneris per Solem d. 6 Jun. 1761 in Suecia institutas recenset* WARGENTIN.

Trimestre tertium.

P. 167. 1) *De Veneris sub sole transitu agit*, P. WARGENTIN.

P. 180. 2) *Tornenses Veneris sub Sole observationes edit* ANDR. HELLANT.

P. 184. 3) *De piscibus in lacubus mediterraneis plantandis agit* CAR. FRID. LUND, Senator Lincöpenfis. Profundiores Sueciae lacus pisces continere narrat saporis melioris, cum illorum lacuum fundus plerumque sit petrosus et aqua limpida, sed parcius in illis pisces augeri, quia oua ob ripas profundiores a sole satis maturari non possint. Esse enim excludendo ex ouis embryoni piscis etiam necessarium calorem, inde colligit: quia pisces generi propagando operam duros, littora et aquas minus profundas quaerere, ipsa providentia creatoris iusserit. Hinc parum prodesse credit, etsi capi pisces, dum propagationi intenti sunt, prohibeantur, et hanc prohibitionem vix in effectum deduci posse. Suadet igitur, ut piscibus, quo propagationi operam dent, capiendis, receptacula ex asseribus praeparentur, superius clausa, ramis abietinis obducta. Illa ingrediuntur pisces, et oua semenque immittunt, capiuntur etiam, et eadem ex illis exprimuntur, et ramis abietinis imponuntur, deinceps receptaculorum parietes, quos volubiles esse oportet, aperiantur, ut rami latius explicentur. Ita captis foetibus suis ramis vesci licet, embryones vero tantum non omnes in lucem prodeunt, cum alias, si a capiendis piscibus absti-

abstineatur, ceterum illis ipsis propagationis negotium totum permittatur, embryones plurimi in fundo lacuum ob caloris defectum pereant, aut piscibus aliis auibusque in escam cedant, ut vix decima pars vitalis sit. Quot ouorum pisces contineant, in variis examinavit, granum medicum ouorum ponderando, et hinc computando, quot oua sint, cum omnium iunctorum pondus nosset. Simul pisces ipsos ponderavit, et aetatem illorum, methodo HEDERSTRÖMII in Act. Acad. 1759 indicata, ex vertebrarum annulis aestimavit. Ita in lucio, marcarum 34, aetatis annor. 16, semuncias ouorum 108 reperit, oua vero computavit 272160. Variat vero hic numerus in piscibus eiusdem generis et aetatis. Ceterum, in piscibus ita plantandis ob- p.196.
uiam ire credit illis, qui destruendos in lacubus mediterraneis ob voracitatem lucios existimant.

4) *Lapides aedificiis struendis commodi, ubi in Sue-* p.197.
cia reperiantur, indicat, simulque calcis in fornacibus,
ferri minerae liquendae destinatis, (Hohe Oefen) vstae
experimentum adfert A. I. CRONSTEDT. Inter p.202.
alia notat, frustra lapides quosdam naturales, quoniam humida aeris temperie madeant, lateribus fabricitiis postponi. Id enim inde esse, quod vapores externae superficiei lapidum illorum saltem adhaereant, laterum contra interiora penetrent. Cogitare vero etiam debebat, quosdam lapides salibus fetos ab humido aereo solui et dehiscere. Scoriae inprimis, quae dum ferrum eliquatur, effluunt, utiliter formis ac modulis immittuntur, ut in aedificiis struendis lapidum vice fungi possint. Calcis in fur- p.205.
no, qualem *altum* metallis liquandis occupati vocant, arendae, vnicum experimentum, imperfectius, quod imitari et excolere alii possint, recenset.

- p.209. 5) *Auſtarium* diſſertationi praecedenti addit
 ANT. V. SWAB. Experimentum parietum domus,
 Fahluni ex calce arenae et ſcoriis comminutis mixta
 exſtructorum, nullis columnis ligneis interiectis,
 qua re potiffimum haec aedificandi methodus a ſimili
 differt, quam in vrbibus Hercyniae metalliferae uſi-
 tatam noſter in ea imitatus eſt.
- p.221. 6) *Currum granis ex ariflis eiiciendis idoneum, ut
 machina trituratoria (Dreſchmaſchine) appellari poſſit,*
 deſcribit PETER SCHISLER. Machinae utilita-
 tem ipſa Acad. Regia teſtatur, inuentorem ferunt
 Lectorem Gymnaſii Regii Hernofandeniſis, M. MA-
 GNUM STRIDSBERG, oeconomicis laboribus ce-
 lebrem, alii quaedam emendarunt.
- p.225. 7) *De carniū et piſcium luce in tenebris* narrat
 ANTON R. MARTIN. Non penitus noua, ſed
 experimentorum ſummam concinne recenſet. Viui
 piſces nunquam lucent, equidem dum fugiunt et
 mare vehementer commouent, ſequitur illos lux in
 longum extenſa, ſed illa eſt a nereidibus noctilucis,
 quas LINNAEUS vocat. Marini mortui omnes lucent,
 fluuiatiliū nullam lucem Noſter vidit, ſed paucos
 examinauit. Coloris non magnus eſt effectus, prae-
 ſtat tamen albus, inprimis ſi ſquamae albae ſint.
 Nunquam lucet piſcis prima vesp̄ra, ſecunda oculi
 plerumque primi lucent, iidemque lucem diutiſſime
 ſeruant; non lucet piſcis niſi humidus, exſiccato
 p.228. lux perit, in angulis fortiffima eſt. Durioris carnis,
 ut gadus mortua, ſepia, loligo, vehementius lu-
 cent. Reſſectitur lux a digito, puncto lucenti vicino,
 demi etiam piſci poteſt, et alio transferri, digiti aut
 acus ope. In frigida non lucent, ſed exenti lucent,
 ubi aerem liberum tangunt, non ubi ſolido cuidam
 adiacent. Putreſacti in aqua cum eximerentur, non
 lucem

lucem recuperarunt. Cocti, falsi, putridi non lucent, sed sale asperso recentibus, visa est lux augeri. Pinguedo lucis causa esse non potest, nam hepar pinguißimum non luxit, nisi solis in rimis in quos exsiccatum dissiluerat. Squamae separatae, quam diu madidae sunt, lucent. Est vero humidum illud, quod p. 229. lucet, maxime volatile, nam leuissimo igne disiicitur, etsi supersit viscidum quidpiam, sed lumine orbum. Ab aqua calida affusa citius extinguitur, quam a frigida. De luce cadauerum putrescentium singularis eius est obseruatio, cum cadauer media aestate 14 diebus in loco concluso iaceret, lucere tectum et parietes vidit, et humidum griseum, vaporis ad modum, vbique se applicare, quod post difficulter abstergi potuit, cum pigmento, quo antea parietes tincti erant, adhaesisset. Huc pertinere arbitratur splendorem in sepulcris antiquorum visum, quem alii lampadibus aeternis tribuerunt.

8) *Obseruata in Hollandia australi* recenset 10. p. 230. FISCHERSTRÖM, quae ad terrarum genera, agriculturam cet. pertineant, et varia monendo, quae emendari mereantur, insignem rerum oeconomiarum peritiam testatur.

9) *De araneis capiendis et nutriendis*, agit CAR. p. 243. CLERCK, pyxidem describens, qua commodè capi queant, et receptaculum, quo seruentur. Muscam nimis magnam araneo, quem integrum seruare animus est, praeberi vetat, cum musca ab inimico in angustias redacta, summamque suam vim exerens pedes aranei auferre possit.

Trimestre quartum.

1) PETR. WARGENTIN *Obseruatorium Hol-* p. 247.
miense Parisino orientalius statuit 1. h. m. 2 50. f. tem-
E 4 poris,

poris, seu 15 gr. 42 m. 30 f. circuli medium sumendo, ex octo obseruationibus satis bonis satellitis infimi iouialis.

- 2) *De plantatione et negotiatione Coffeae in Yemen seu Arabia felici* refert CHRIST. HENR. BRAAD. Botanicam descriptionem, vt satis bene ab aliis traditam omittit, relaturus, quae ipse vidit. Humiditatis amantior est arbor reliquis Arabiae. Igitur plerumque plantatur in montibus, duo aut tria millia-ria a mari rubro sitis, in quibus fonticuli scaturiunt. Circa horum montium vertices in ductibus spiralibus plantatae arbores descendunt vsque in valles, et venis aqueis ad eas ductis rigantur; aperta vena ante solis ortum, vt aliquid per dimidiam circiter horam fluens aquae in singulas fossas, quibus singulae arbores circumdantur, deponat. Quibus haec aquae profluentis commoditas deest, vt in vallibus positis, iis maiori opera aqua adfertur. Fabas vt vocamus tales ferunt, quales nobis mittuntur, praeparato antea agro, et terra, fimoque tegunt beneque irrigant. Emergunt plantulae 6 aut 20 diebus. Sessquiennes aut biennes arbusculos semper irrigatas et contra nimium solis ardorem tectas transplantant in illa, quae ante diximus, loca, terra circiter ad profunditatem vlnae immittentes, distantia 6 cubito-
p.254. rum, seu 4 $\frac{3}{4}$. vlnae Suecicae, cuius plantulae tamen aduersus solem additur Musa (*Pisang*). Inter plantas etiam frumenti genus *Djuari* feritur. Magna vero cura opus habent arbores, fimo caprinus illis adiicitur, rami aegri auferuntur, interdum arbores ipsae tolli debent. Fructus ferunt tertio, postquam transplantatae sunt, anno, copiosiores, quo magis aetas illarum crescit. Viuunt vero 100 aut 110 annos. Fructum ob pulpam dulcem simiae et ceropitheri amant. Cum color pulpae ex rubro in obscuro

obscuriorem mutatur, aqua subtrahitur, vt citius fructus siccetur. Decembri et Ianuario leui succussu p.255. ex arbore delicitur, aut manu auellitur, nisi quod restent nondum satis maturi. Post dies 10 aut 12 foli in tectis aedium planis exponuntur, nocte media tegendi et lapidibus onerandi, vt liquor dulcis ex membrana, in quam pulpa abiit exprimatur. Deinde 12 aut pluribus horis madefiunt, et inter lapides duos molares comminuuntur, vt membrana a nucleis secedat, nuclei in umbra siccantur, nam in sole viridem colorem, qui in illis probatur, essent perdituri, cui succēssurus esset albus, qui signum coffeae deterioris habetur. Membranas Arabes coquant, et Coffeam appellant, quam absque saccharo bibunt, est vero potus saporis valde ingrati. Harum membranarum pars interior vel flaua vilior est, et libræ 60, piastris $\frac{3}{4}$ venduntur, pars fusca 1 $\frac{3}{4}$ aut 2 piastris. Est etiam illarum genus, cui duplum pretium fabarum ipsarum statuitur. Cuticulam tenuem, semina ipsa singula circumdantem, Europaei agitatione eiciunt, Turcae seruant, creduntque colori fabarum viridi conseruando aliquid facere, sed illum Turcarum fabae forte seruant, quoniam breuius illarum p.256. iter est. Iam non licet plantas, aut fructus membrana exteriori circumdatos auferre, quod serio prohibuerunt Arabes, damno suo edocti. Variat Coffeae bonitas, optima censetur venire a loco Houdena inter Moka et Betelfacki sito. In eum, quem vltimo nominauimus, locum fere omnis Coffea arabica adfertur. Europaeae naues, quae illam auferunt, iam pauciores sunt, cum olim quotannis 5 aut 6 ille onerandae Moken venerint. Ante 20 annos quotannis 30000 Bahar, quodlibet 870 librarum, in Turciam et Europam auhebantur, iam vix dimi- p.257. dium venditur. Hinc praemium imminutum est, et adhuc decrescit. Thermometrum Fahrenheitia-

num Noster vidit Mokae ultra punctum glaciei, gradus 90. 92 exeunte Maio 1756. 96 initio Iunii, et sub finem Iulii 95 Augusto in loco Betelfacki, milliaribus 100 anglicis borealiores. Maio exeunte graduum 101 $\frac{1}{2}$ vel 102 in aere libero tecti plani, sed alio tegmine obducti (*eine bedeckte terrasse*) Iunii initio 100 Surati in calidissimis mensibus non altius 90. 90 $\frac{1}{2}$ gr. neque in aliis Asiae locis altius, quam in Arabia. Pluvia prima trium annorum Augusto 1756 cecidit, neque vero penetrare per plures dies potuit in terram sale fetam, sed in fossis substitit, crusta salina velut glacie tecta. Quae partes montibus propiores fitae sunt, eae pluuiam habent, et amoenam spectantibus faciem praebent, cum tristis sit litoris.

3) *Observationes de Hallandia australi continuat*

- p.264. IOHANN FISCHERSTRÖM. Salmonum olim tanta copia in hac regione capta est, vt publicorum reddituum nomine ex captura hac salmones 300 numerati fuerint. Maior almo ouula 20000 continere potest, vt incredibilis futura sit illorum multiplicatio, nisi captis feminis, antequam oua eiecerunt, innumerabiles vitae vno ictu destruerentur. Murae-
- p.266. nas (*Neunaugen*) piscatores esculentas esse non credunt, igitur illas, cum maxima copia lapidibus ad-
- p.268. haereant, non capiunt. Prope villam Perstorp, lacus est fundo duplici instructus. Igitur pisces minima commotione in lacu excitata, ad habitaculum inferius se recipiunt, quo retia perstringere non possunt, sicque
- p.271. capi in hac lacu nequeunt. Genista pilosa, rarior in aliis Sueciae regionibus, hic inter ericam copiose
- p.276. crescit. Primo intuitu difficulter a loto corniculata distinguitur. Remedia domestica varia recensentur. Infestat incolas coluber chersea, eius morsui ferrum candens vulneri applicatum medetur. Anginae curandae

randae ergo album graecum cum cereuisia bibitur, aut hirundinis nidus collo circumligatur. Serpignes aqua falsa ex butyro expressa tolluntur, sed eam faepius nimium exsiccare monetur. Denti, qui dolet, p.277. gallae pars immittitur. Artuum vagis doloribus succus citri, ad carbones candentes illitus, medetur, sed in arthritide periculosum est remedium. Vulnera, ab vltione nata, sebi calidi pauxillo instillato sanantur. Tumores leuiores caseo, ex cereuisia lacti confusa nato, fugantur. Vehementem in extremis digitorum dolorem frequentem valde incolae morfui nodi gordii tribuunt, et viridi aeris imposito sanant. Noster diu vermes hos in vitro seruauit, nihil mali ab illis expertus, neque carnis particulas, quas prae buerat, admorsas vidit. Ergo BLANCARDO accedit, dolorem hunc humori acri et maligno tribuenti.

4) *Compendium obseruationum meteorologicarum* p.280. anni 1757 edunt B. FERNER, et FRID. MALLET.

5) *Obseruata varia ad historiam naturae pertinentia* enarrat I. C. WILKE. Ranas iuniores sub microscopio Cuffiano examinans, vt in caudis sanguinis motum spectaret, vidit in illis animalcula minuta, quae haemisphaeria caua, ex materia homogenea constantia, esse iudicat. Maxime in angulo corporis et caudae apparent. In ranis multis etiam, cum secundam metamorphosin subierunt, vidit, sed nulla in aqua, ex qua ranas desumerat, aut in plantis eius aquae. Optime conspiciebantur lente, obiectorum diametros 200 augente; et ita lineae magnitudine apparebant, vt veram magnitudinem $\frac{1}{200}$ lineae iudicaret. Artus nullos habent. Minuta animalia haurit ex aqua tubo vitreo vtrinque aperto, inferius ampliore, superius pollice obturato, aquae immittit prope

prope eum locum, vbi piscari quidpiam animus est. Irruens vehementer aqua, vbi pollex remouetur, omnia secum aduehit. Helices duas LINN. S. N. 614 Faun. Su. 1311 coeuntes vidit d. 29 Maii, et videre credidit vermem albido flauum, qui vtrique testae se inseruerat, supra ipsa animalia, quae fere exierant; illo coniuncta videbantur. Extra testas longitudine digiti circumuoluebatur, ipse tres lineas latus erat, et dimidiam crassus, annulis variis constans, et proxime ad taeniae figuram accedens. Separatis helicibus, totus intra illius domum se recepit, quae alteri adhaeserat. Extremum, quod ita ex altera eductum fuerat, in apicem coibat, foraminulo instructum; alterum extremum reliquae helice testae tegebatur, ipsaque helice in domum suam se recipiente, vermis simul inter testam et animal intrans disparuit. Aperuit Noster testam, sed nihil, vermi simile, reperit, nihil, quod adfuisse tale quidpiam testaretur, nisi quod in helice ipsa dissecta corpusculum albido flauum, oblongum et durum, tres lineas longum reperit, quod colore vermi, quem dixit, simile, pro pene animalis habet, qui in coitu in tantam magnitudinem, nullo alio in tota natura exemplo, extendatur. Nihil tale in altera vidit; igitur credit, feminam fuisse, haecque animalium testaceorum genera, contra opinionem, quae vulgo de reliquis habetur, hermaphroditos non esse.

p. 292. 6) *Singularem casum chirurgicum* refert IO. IUST. WAHLBOM. Rusticus, dum ex aceruo foeni super posterioribus gliscens, descenderet, iniecit in instrumentum prope aceruum positum, quo foenum colligere solent, vncino reflexu ferreo et manubrio longo ligneo instructum. Id intrauit in femur dextrum, inter caput secundum et tertium muscoli femoris tricipitis, occurrit musculis obturatoriiis, et foras

foramini ossium innominatorum ouali, per quod transiens marginem vel ramum inferiorem ossis pubis, cui obuersus erat vncinus, laesit, pertingit inter intestinum rectum et vesicam vsque ad peluim, vt apex ad ossis sacri basin consisteret. Cum manubrium quartam vlnae partem vltra pedes hominis protenderetur, concidit laesus in terram, domum deportatur, tertioque demum die in urbem ad Nostrum et chirurgos delatus est. Febrem nullam ex vulnere sensit, igitur sola venaesectio instituta est. p.294. Manubrium ferro candenti, quantum promineret, ablatum est, sed vncino extrahendo tentamina innumera frustranea fecerunt. Primis diebus excrementa viis ordinariis exierunt, sed cum suppuratio inciperet, exiit vrina per vulnus, indicio, vesicam laesam esse. Expectandum igitur censuerunt, donec suppuratione aliisque causis vncinus forte ita descenderet, vt extrahi posset. Laesus domum missus est. p.295. Mense elapso, chirurgus GRANBOM ipsum inuifens, ferrum magna ex parte descendisse deprehendit, et limarum ope, quod nimium promineret, auferri fecit, parte externa retinaculo quod cochlea clauditur (*Schraubestock*) immissa. Ita aeger moueri melius potuit. Octodecim, postquam vulneratus p.296. esset mensibus vncinus, multo magis descendit, et in altero perinaei latere velut exitum quaesiturus sentiretur, prope ramum inferiorem ossis pubis finistri. Miles veteranus, qui iuuenis chirurgo seruiuerat, insciis chirurgis, foramen exitui, quem diximus, ampliavit, vt magis adhuc vncinus descenderet, post forcipe minore vulnere immisso vncinum fregit: ita reliquum ferrum facile extraxit. Vulnus, cum optime caeterum valeret homo, sanatum est methodo eius, qui ferrum extraxerat, etiam omnibus operibus rusticis perficiendis idoneus est, ambulat, curru et equo vehitur cet.

p.797. 7) *Observationem de calculo vesicae* edit: ANDR. MAGN. WAHLIN. M. D. et M. Prov. Iönköpingensis. Puer sex annorum, a calculi vesicae doloribus 1756 remedio Stepheniano liberatus est, sed illi 1758 redierunt, insuperabiles huic remedio, et aliis acidulae Iönköpingses, effectu suo in calculi dolore leniendo celebres, paullulum auxilii prae-

p.298. buerunt, insigni copia mucii educta. Per urinae meatum exiit materia foetens, tenuis, coloris obscuri, sanguine et fibris innatantibus mixta, ac si ab ulceribus vesicae esset. Urinae sensit aeger aliquod impedimentum in ipso meatu obstare, cum alias facile exiret. Fartior effluxus supino, aut in latere dextro posito, quam stanti. Cathetere immisso, resistentia mollis percepta est, velut a quopiam polypo. Medio decembri febris consumtus obiit. Abdomine aperto vesica sphacelata reperta est et multum expansa, aqua coloris obscuri foetida. Illa dissecta et aqua ablata

p.299. apparuit calculus, quem depictum Noster sistit, membranae vel sacco inclusus; calculus ipse, oui gallinae magnitudine est, altero extremo inferiore et sacco incluso, satis glaber, superiore dimidio, quod extra saccum prominebat, superficiei inaequalis et asperae. Saccus versus vesicam glaber erat, membranofus, mollis; sed valde fragilis. In latere inferiore, inprimis versus superius extremum apertum, plenus crystallorum et velut petrefactus, sed in fundo, cui glabrum calculi extremum applicaretur, satis aequalis. Ex illo tres velut rami protendebantur. Ramorum et sacci loca quaedam putrida erant, unde foetens illa materia. Saccus nullibi adhaesit aut aliis partibus, aut calculo ipsi, qui velut ex receptaculo eximi potuit. In vesica, extra saccum, sabuli drachmae duae repertae sunt.

p.399. 8) *Animadversiones ad scriptum proxime praecedens* ROLANDI MARTINII. Nasci tales membranas

branas ex muco viscido, et non omnino infrequentes esse monet, idque observationibus aliorum confirmat et sua, scilicet in infantis arteria aspera et bronchiis substantiam membranofam prehenderat.

9) *Aliud auctarium eidem narrationi adiicit* p.301.

CLAUS ACREL, rariorem hunc casum esse monens, quam eos, ubi inuolucris a vesicae membranis oriundis calculi teguntur, ceterum exempla aliorum etiam citans.

10) *De utero duplici refert* O. ACREL. Femi. p.303.

na 36 annorum, quae ante 9 annos filium, ante 6 filiam, enixa esset, inde ab ultimo puerperio de dolore in partibus propagationi destinatis conquesta est: menstrua, quotidie copiosius, et maiori cum eius incommodo profluentia, in haemorrhagiam uteri abiire, unde ex rure, ubi degebat, ad nosocomium Holmiese ducta. Statim animaduersus est prolapsus uteri, et uterus scirrhusus. Superior pars colli uteri, orificii proxima, nec soluta, nec vulnerata, tamen minima pressione decidebat. In- p.304.
ferior pars orificii, digito tumens et scirrhusa sentiebatur, non tamen ex situ naturali mota. Ambo hi tumores, a se mutuo discedebant, et perpetuo velut sanguinem sudare videbantur, prior nisi retentus semper propendebat, multumque in hoc situ ab externis rebus patiebatur, undique sanguinem stilans. Femina supina et paullo altioribus partibus inferioribus positis, haec aliquo modo in loca sua reducta sunt, et venaesectione in brachio, temperantibus et anodynis, item leniter roborantibus aliquod ipsi auxilium adlatum, ut tandem vel e lectulo surgere posset, vinculo adhibito, quod prolapsum uteri cohiberet. Sed tertia die, postquam haec instituerat, febris inflammatoria correpta, sexta post febris

bris initium obiit. In cadauere praeter inflamma-
 p.306. tionis et putredinis in partibus quibusdam signa, in-
 primis duplex vterus notatu dignus fuit, ab eo, quem
 EISENMANN Argentorati 1752 edidit, imprimis
 simplici vagina vteri, et vteris a se mutuo disiun-
 ctis, quoniam scilicet peperat femina, diuersus. Re-
 liqua figurae adiectae explicant.

p.308. 11) *Methodum experimentis comprobata, dum
 carbones ex ligno fiunt, lateres simul praeparandi*, edit
 GERHARD WILLEMOT.

p.311. 12) *Animaduersiones in scriptum praecedens* ANT.
 V. SWAB. Lateres notata methodo, quae ibi ex-
 posita est, non maiores consuetis, ut suaserat inuen-
 tor, sed contra minores esse faciendos. Maiores
 enim vix totos ab igne penetrari posse, phlogiston
 vero, quod argillam, ne humidum insugat ab eoque
 dissoluatur, tueri debet, summa vitione argillae com-
 miscendum esse, alias paullatim secederet.

p.313. 13) *Murem album domestico similem* describit BE-
 NED. BERGIUS.

p.318. 14) *Excerptum ex epistola Beniamini Wilson. R.*
 S. S. edit THORBER BERGMANN. Pertinet ad ele-
 ctica, imprimis ad FRANKLINI sententiam: vitrum
 fluido electrico imperuium esse. Tabula magna
 vitrea utrinque polita super vno laterum verticaliter
 erecta firmatur, et distantia $\frac{2}{5}$ digiti ab eius medio,
 conductor eburneus, pedi ligneo innixus, statuitur;
 ex conductore dependent globuli duo lignei. Vi-
 trum aere circumiacente paulo magis calidum reddi-
 tur, et in parte, a conductore auersa, digito fricatur,
 quo facto, utrumque eius latus positivam electrici-
 tatem consequitur, item conductor a tabula vitrea
 seiun-

seiuñctus. Ergo fuit materia electrica ex digito in vitrum, et per illud in ebur. Idem confirmatur, si frictio fiat pauxillo argenti, laccae adhaerente; nam argentum negative electricum fit, vitrum, vtrunque positue. Igitur vitrum non semper, vt in experimento Leidenſi, materiae electricae est impenetrabile. Haec discrimina a medii, vitrum et vis electricae originem interiacentis, diuerſa reſiſtentia repetit.

15) *Eduntur excerpta ex Actis Academiae* 1) A. p.321.
F. CRONSTED, ſpecimen ſili miſit ex lini genere praeparati, quod caules meliloti flore albo, qui per hyemem vna cum radicibus in agro relictĩ fuerant, ſola ſeparatione fibrarum preſſione facta, praebuerunt.
2) TIBURTIUS anatum ferarum oua gallinis aut anatibus domeſticis ſuppoſuit, et ſic illas ex ſylvarum incolis vernas reddidit, pluraque de oeconomia illarum obſeruauit, vt: propagationis cauſa paria iungenda eſſe, cum vnica femina inter plures mares belli cauſa ſit; aestate calente a frigida arcendos eſſe pullos, etiam anatum domeſticarum et anſerum, cum inde conuulſionibus ſpaſticis correptae moriantur; ſaporem ferinum et carnis colorem adhuc in tertia generatione manſuefactarum durare.
3) Idem credit, aestatibus calidiſſimis auium ſylvarum pullos ſiti perire, et hinc proximo autumno deſiderari aues, cum vere praecedente plurimae aduiſſent; quod 1757 contigit. 4) De fractu- p.322.
ris, quae in glacie amnes et lacus obducente oriuntur, varia retulit P. A. GADD, inter alia, continentem in magna diſtantia ſaepeius, dum contingunt, ita concuſi, vt terrae motus videatur; 5) inſignem varietatem plantarum enumerat LIDBECK, in ruinis eccleſiae Landſcronenſis a ſe repertam, quarum ſemina vel a vento, vel ab auibus eo oportet eſſe delata.
Tom. XII. Pars I. F *lata.*

lata. Vltimum sine dubio baccis dulcamarae eo
maiori miraculo, quoniam ingratus est sapor eius
fructus, item sambuco, neque facile intelligitur,
quomodo pteris eo peruenerit, soncho oleraceo, ubi-
cunque in fornice creuerat, folia erant rubro vio-
p.327. lacea. 6) HEDERSTRÖM methodum edit, talpas
fugandi, ope machinae, quae a vento agitata sonum
et tremorem infra terram late diffundit, sicque effi-
cit, vt talpa, pigrum animal et somnum amans,
quietiorem habitationem quaerat.

IX.

IAC. REINBOLDI SPIELMANN, Phil. et Med.
D. Chemiae Botanic. reliquaeque Mater. Med.
P. P. O. Capit. Thomani Canonic. Acad.
Caesar. N. C. Regiae Berolin. Elect. Mogunt.
Sodalis, Colleg. Regii Med. Nanceian. Ho-
nor. Membri institutiones chemiae praele-
ctionibus accommodatae. Argentorati, apud
Iohannem Godofredum Baucrum, 1763. 8
Alph. I pl. I.

Praemissis prolegomenis, de ratiocinio chemico et
instrumentis agit Cl. Auctor; quibus conside-
ratis operationes statim exponit et 1) solutionem,
2) extractionem, 3) fusionem, 4) destillationem,
5) sublimationem, 6) calcinationem, 7) praecipitationem,
8) reductionem, 9) vitrificationem, 10) fermentationem explicat. Decem hae operationes,
a Nostro tanquam praecipuae consideratae, alias;
quae forte adhuc desiderari possent, sub se compre-
hendunt, ita, ut pluribus, ad hanc illamue dicta-
rum operationum pertinentibus, experimentis ex-
positis alia saepe, certe non pauca, simul explicen-
tur,

tur, quae quidem ad primariam operationem, vbi locus eis concessus fuit, vix ac ne vix quidem pertinent, a praecipuo tamen experimento, quod huc spectat, certo dependere Nostro visa fuerunt.

Scientiam mutationum, quas patiuntur corpora, dum eorum compositiones penetrantur, chemiam Noster vocat, substantias autem, in quas corpora resolvuntur, dum eorum compositio penetratur, principia seu partes constitutivas appellat, quas in principia proxima et remota distinguere cupit. Ad illa, proxima nimirum, chemico maxime attendendum esse, innuit: corporum enim naturam a natura principiorum proximorum, ex quibus componuntur, pendere, monet. Elementa Nostro dicuntur corpora naturalia, quorum principia sunt homogenea; ex his mixta, ex mixtis composita, ex compositis decomposita, et ex his supradecomposita oriri, cum BECCHERO Noster statuit: quae autem per resolutionem corporum prodeunt substantiae, in educta et producta, vti constat, distinguuntur. Illa Nostro sunt principia proxima, quae neutiquam mutata sub ea, qua in corporis compositione haeserunt forma, inde obtinentur; haec vero, producta nimirum, sunt substantiae, per corporum analysin obtentae, quae tales, quales post analysin apparent, in corpore non extiterunt. Inter substantias, quae elementorum nomen merentur, tres tantum, nimirum aquam, terram et principium inflammabile enumerat Noster; a prima omne fluiditatis principium, a secunda soliditatem et siccitatem corporum, ab ultimo corporum facultatem ignem concipiendi et alendi dependere, autumat. Nexum principiorum inter se corporis mixtionem, nexum vero minorum alicuius corporis partium, quo corporis magnitudo determinatur, aggregationem Cl. Auctor vocat; a mixtione corporum naturam, ab aggrega-

p. 1.

tione autem magnitudinem eorum pendere, hacque sublata, corpus minui, illa cessante, corpus destrui, notat. Vinculi, quo principia tam in mixtione quam in aggregatione retinentur, rationem vim ipsis internam esse, eius autem rationem nos latere, eandemque a physicis attractionem et a chemicis affinitatem appellari, monet. *Vim internam, per quam corpora in mutuos amplexus ruunt, ea lege a Creatore ordinatam esse, Noster dicit, ut singula corpora eandem ita determinatam habeant, ut cum certis corporibus non coeant, cum aliis fortius, cum aliis autem remissius uniantur et haec relinquunt, ut illis se iungere nequeant.* Inter plures tabulas, quae scalas affinitatum plurium substantiarum exhibent, eam Nostro adiicere placuit, quam Cl. GELLERT fundamentis suis chemiae metallurgicae inseruit.

p. 12. Ad instrumenta artis transit Cl. Auctor, quae solito more in actiua et passiva diuidit: *actiua* vocat, quae *rationem penetrandae corporum compositionis in se continent*; hinc omnia telluris corpora instrumentis actiuis annumerat. Instrumenta passiva Nostro dicuntur, *quorum ope efficitur, ut effectus, quos ab actiuis expectamus, possint obtineri.* Haec, quae vel examinanda corpora, vel instrumenta actiua continent, vasa appellantur. Furnis itaque variisque vasis variae figurae diuersaeque materiae descriptis, itidemque bilancibus et, quae in diuersis prouinciis in usu sunt, ponderibus notatis, et lutis demum, quorum ope vasa inter se inuicem iunguntur, explicatis, chemicas nunc operationes exponit, singulasque earum eo ordine pertractat, ut laborem primo indicet et quid de eo in genere monendum, notet, posthac autem experimentum aut plura subiungat, hisque rationem semper et plerumque vires aut usus addat.

A solutione initium capit, laboremque omnium p. 40.
 simplicissimum corporum comminutionem, quae a
 nonnullis quoque solutio continui dicitur, vocat,
 eamque experimento, cum vltamarini praepa-
 ratione factò, illustrat. Ad physicam postea so-
 lutionem progreditur Cl. Auctor, quam in superfi-
 cialem et radicalem diuidit, sed de priori tantum
 hic agit. Solutio ex Nostri sententia vnice aggre-
 gationem nequaquam mixtionem respicit. Ratio ei
 est, quia corpora soluta ex menstruo immutata ite-
 rum recedunt. Menstrui actio in soluendum per
 mechanicas rationes non explicatur. Nam, *nil ma-
 gis*, ait Noster, *ipsis mechanices principiis contrarium
 est, quam quod partes per instrumentum quoddam sepa-
 ratae, cum eodem post separationem artissime nexae
 maneant.* Itaque solutionis ratio in causa, quae ag-
 gregationem et menstrui et soluendi tollit, a No-
 stro quaeritur, cumque aggregationis vinculum in
 affinitate ponatur, hinc solutionis ratio dicitur affi-
 nitas maior minimarum partium menstrui cum par-
 tibus soluendi, quam ea est, quae inter has inter-
 cedit. Corpora igitur, in aliquo menstruo solubi-
 lia aliquid de eius natura possidere, sequitur. Mi-
 nime tamen corpus, quod in menstruo quodam non
 soluitur, ab eo diuersissimum putetur; nam princi-
 pium aliquod reliqua ita obducere poterit, vt nec
 cum amicissimo menstruo coire queant. Licet au-
 tem praecipuae encheireses, quae ad solutiones fa-
 ciunt, in affinitate consistant, tamen et aliae simul
 requiruntur. Sic per motum mechanicum, quo
 quippe corpora comminuuntur, hinc per tritum,
 agitationem et calorem iuuatur solutio. Sic, si
 longior mora requiritur, vt menstruum solutionem
 peragere possit, digestio et maceratio necessaria est.
 Dein quoque fluidorum in vapores resolutio eorun-
 dem vires soluentes auget, cum superficies guttae,

in vaporem mutatae, augentur, sicque plura soluendi puncta sollicitentur. Porro solutiones in vasis clausis melius succedunt, cum menstrui vapores conferuentur et aeris agitationes accedant. Tum quoque soluens interdum debilitandum est, quia etiam menstrui partium nexus tollendus est, si solvendum illum sufficienter imminuere nequit. Tandem substantiae, in aliquo menstruo non solubiles, cum corpore prius iungendae sunt, quod menstruo affine est; huius enim ope soluens subeunt. Generali hac solutionis doctrina praemissa ad menstrua accedit Noster, de quibus autem ea tantum recenset, quae vulgatiores sunt; cumque menstrua a chemicis in solida et fluida atque solutiones itidem in siccas et humiditas diuidantur, sicca autem per fusionem fiat, de solidis mensuris in capite de fusione agitur, hic vero fluida pertractantur, ad quae aqua, oleum, mercurius, liquores salini et spiritus inflammabiles referuntur: de tribus prioribus nunc, p. 48. de posterioribus alio loco agit. Aquam, ut menstruum, considerans salia primo recenset, quae pro diuersa natura diuersum aquae pondus requirunt; postea corpora enumerat, quae, aeri exposita, aquam ex eo attrahunt et liquefiunt, hinc solutiones per deliquium exponit et experimentis illustrat. Tum quoque ea corpora examinat, quae ope salium aquam subeunt, hinc emulsionum et saponum praeparationes hic occurrunt. Cum autem menstrui partibus, ex solutione ablatis, soluti elementa iterum coeant et ex solutione secedant, atque multa salium genera id proprii habeant, ut eorum elementa sese semper determinata ratione attrahant et in massas angulares pellucas, crystallos dictas, concrecant, crystallisatio quoque a Nostro hic explicatur, quae nitri depurati, salium essentialium vegetabilium, sacchari lactis et salis essentialis urinae exem-

exemplis illustrat. Ad olea progreditur Cl. Auctor, p. 73. quae fluida inflammabilia ob vitandum errorem, in quem ducere ea posse, autumat, non, vt vulgo solent in expressa et destillata, sed melius in odora et inodora, distingui, cupit. Olea igitur considerans de eliquatione pinguedinis animalis, expressione olei vnguinosi ex nucleis recentibus et exsiccatis, itemque ex ouis agit, horumque oleorum vires recenset, tandem praeparationem balsami sulphuris et solutionem plumbi in oleo vnguinoso addit. Ad amalgamationem, tanquam solutionis speciem nunc transit et metalla, quae facillime, alia, quae difficillime mercurium subeunt, enumerat, encheireses, quae ad coniunctionem faciunt, breuibus describit et phaenomena, quae inde resultant, tradit, vbi cupri in mercurio solutionem sub digestionem ramos emittere, Nostrum vidisse, notamus.

Cum extractio plurima cum solutione communia habeat, praeter id, quod menstruum non totum sed vnam alteramue eius partem soluat, solutioni illam statim subnexuit. Primo itaque extractum aquosum ex vegetabili quocunque parare, dein mucilagines ex vegetabilibus, tum gelatinas ex animalibus, porro sales, glebis metallicis vel terris immixtos, extrahere docet, tandem ad extractionem etiam ferri mutationem in chalibem refert, cuius operationem describit, insimulque varias compositiones pulueris, quo ad chalibis productionem vtuntur, communicat. Inter mixturas ab vna, quae ex quatuor partibus fuliginis, carbonum et cinerum, singulorum partibus duabus et salis communis parte vna conflata fuit, ab alia dein, quae sedecim partes sanguinis exsiccati, octo carbonum, sex cinerum et quatuor salis communis continuit; ab alia porro, quae ex cornuum bouinorum comminutorum partibus octo, cinerum partibus quinque et carbonum qua-

tuor composita fuit; ab alia tandem, quae tres partes fodae, quinque carbonum et octo rasurae cornuum habuit, non spernendos se vidisse effectus, Noster perhibet.

p. 99. Non incongrue solutioni humidae Noster adiungit fusionem, quippe quae, uti constat, solutio sicca quoque vocatur. Plures quidem, quae in humida solutione occurrunt encheireses, huc quoque spectant, sed praestant praeterea substantiae, quae nonnullis corporibus, difficulter fundendis additae, eorum fusionem iuvant et fluxus appellantur. Caeterum corporum quorundam mixtionem calore alterari, alia vero non mutari, recte monet, hisque breuiter indicatis granulationis encheireses tradit; posthac ea, quae circa siccam solutionem fossilium notanda sunt, recenset. Experimenta, quae illustrationis gratia inferere, Nostro placuit, orichalci praeparationem, eliquationem plumbi ex cupro, hepatis sulphuris praeparationem, sulphuris compositionem, antimonii solutionem in alcali, tandemque tincturae antimonii tartarificatae praeparationem sistunt. De hepate sulphuris notat, istud, cum ab aqua solvatur, fontium, qui sulphur vehunt, rationem illustrare, simul autem patere, *quod foetoris in fontibus absentia, nec sulphur in eis contineri, certissime doceat*. Praeterea alcali ex hac unione cum sulphure maiores vires soluentes acquirere, dictique salis unionem cum sulphure non ab acido, sed a principio inflammabili pendere, asserit.

p. 116. Destillationem Noster, ut solent, ratione vasorum in destillationem per adscensum, ad latus et per descensum, respectu subiectorum autem in humidam et siccam distinguit et abstractionem et rectificationem species eius esse, monet. Destillationem vitrioli primo loco exponit insimulque plures, quae cum eo instituuntur, operationes describit. Sic tartarum vitriolatum, acidi vitriolici cum oleo tere-

terebinthinae mixtionem, acidum vitriolicum dulce, vitriolum martis coeruleum et album, turpethum minerale, sal ammoniacum secretum GLAUBERI, solutionem lapidis calcarei in acido vitriolico et salem sedatium HOMBERGII describit, eaque praeparandi rationem, vires quidue doceant, tradit. De sale sedatio HOMBERGII notat, eum, quod sublimari possit, neququam volatilibus adscribendum esse, eundemque valde leuem, ratione mere mechanica ab aqua eleuari, siquidem per fusionem non in auras pellatur, sed in vitrum abeat; ceterum vires eiusdem medicas a viribus boracis nequaquam differre, Cl. Auctor vix dubitat. Ad destillationem acidi nitrosi progreditur Cl. Auctor, qua p. 144. exposita, nitrum regeneratum et nitrum flammans considerat, vbi huius occasione notat, alcali volatile ab edulcoratione naphthae nitri reliquum, si ad siccitatem destilletur, flammam, quae omnem vasorum apparatus illuminet, sine tamen detonatione, emittere. Posthac naphthae nitri, spiritus nitri dulcis, mercurii praecipitati rubri, crystallorum lunae, lapidis infernalis et phosphori BALDUINI praeparationem tradit, vltimoque acidum nitri, a solidis animalium partibus abstractum, non raro fulmen constituere, perhibet. His de nitri acido expositis, ad salis acidum se conuertit et de eius destillatione, insimulque de sale mirabili GLAUBERI, de acido salis saturato, nitro cubico, acido salis dulci, aqua regis et tandem de quartatione agit. His aceti destillationem, eiusque concentrationem, sacchari saturni, aceti dulcis et terrae foliatae tartari praeparationem adnectit, dein tartari destillationem explicat, tum vegetabilium longe plurimorum, insimulque formicarum et plantarum, flore tetrapetalo ad tetradynamiam LINN. pertinente instructarum, destillationem exponit, vbi notat, sal alcali volatile, ex dictis vegetabilibus obtinendum,

dum, ex iisdem non produci, sed vere educi, idque ex eo probare annititur, quod eiusdem effectus in planta integerrima, et acris horum vegetabilium sapor et evidens eorundem atque alcalinus quidem odor, et spiritus, leni etiam calore ex eis secedens, obseruentur. Porro partium animalium destillationem, alcali volatilil ex sale ammoniaco, et oleorum odororum ex vegetabilibus separationem et oleorum odororum docimasiam, aquarum destillatarum rationem, olei vnguinosi abstractionem a terris, olei animalis DIPPELII praeparationem, denique phosphori urinae destillationem communicat.

P. 197. A destillatione ad sublimationem Noster transit, cuius rationem in vi caloris quaerit, quae corpora dilatat et eas partes, quas siue ex aggregatione, siue ex mixtione soluere potest, secum in superiora, quo calor continuo tendit, rapit, et, hac ipsa vi immixta id, quod in altum duxit, ad solidum, quod offendit, adpellit et sublimatum format. Primo camphorae depurationem docet, quam acido copiosiori, quod recepit, a reliquis oleis aethereis siue odoratis differre putat. Huic benzoës et succini analysin iungit, cuius sal cum Cl. PORT ad vegetabile refert, tuncque notat, olea acidis arctius vnita, efficere, vt sub forma solida, destillationis ope, obtineantur. Postea sulphuris ex sua gleba separationem eiusdemque depurationem describit, cui vires roborantes tribuit, quas ex eo, quod sulphur extus admotum, materiem ad cutim haerentem, reprimat, probare putat. Ad arsenici ex sua gleba separationem, et mercurii sublimati praeparationem progreditur, dulcemque mercurium ad drachmam dimidiam per se purgandi scopo exhiberi posse, asserit, tuncque reuificationem mercurii ex amalgamate docet. Lunam corneam ex argenti comminuti partibus tribus et mercurii sublimati partibus quatuor, re-
tortae

tortae commissis, Noster parat, hocque experimento acidum salis maiorem cum argento, quam cum mercurio, habere affinitatem, probare autumat atque effectum, quod argentum, acido salis unitum, facile fluat et ex crucibulo in auras abeat, a vaporibus acidi elasticis, metallum secum in auras ducentibus, deriuare, nullus dubitat. Cinnabaris compositione descripta, monet, eandem puluerisatam saepe minio adulteratam, vendi, hinc ex medicina puluerisatam reijci, vel si ad medicamenta adhibeatur, prius cum aceto, siue cum acido nitri digeri et digestum edulcorari iubet. Tandem flores salis ammoniaci martiales parandos docet, et ferri volatilisationem mere mechanicam hic esse, neque ex hoc experimento solutionem radicalem metallorum expectari posse, arbitratur.

Calcinationem, recepto more, in siccam et p.218. fluidam Noster distinguit et ad eam, vt solent, vstionem, tostionem, vstulationem, incinerationem, calcinationem strictè sic dictam, detonationem, decrepitationem, fumigationem, caementationem, praeparationem philosophicam et extinctionem lapidum ignitorum refert. De calcinatione strictè sic dicta Noster notat, ei omnia corpora metallica, praeter aurum et argentum, obnoxia esse, hinc in his principii inflammabilis cum terra vitrescentè nexum firmiorem esse, quam in reliquis metallis, conijcit. Experimenta, quae ad illustrandam hanc doctrinam a Nostro adducuntur, ad salem alcali fixum, ad alcali causticum, tincturam tartari, nitrum fixum, fluxus ad docimasiam glebarum metallicarum, pyrophorum, salem polychrestum, argenti depurationem per nitrum, calces antimonii per nitrum, tincturam antimonii acrem et tincturam metallorum, calcinationem plumbi et calcem antimonii pertinent. Notamus ex his, Cl. Auctorem alcali caustici;

sticitatem non a principio inflammabili deriuare, sed in imminuta ratione aquae ad terram quaerere. Quo magis enim ratio aquae ad terram decrescat, eo magis salis aquae cupiditatem augeri, eo citius idem et aquam ex aere haurire et gluten fibris animalium eripere, eas in modum ignis destruere, sicque causticos effectus edere, Noster dicit. Argenti depurationem per nitrum describens optat, vt labor iste vltius perficiatur; quo perfecto taediosum cupellationis artificium ex docimasia proferibi forsan posse, autumat. Antimonio diaphoretico, quod non ex tribus, sed ex duabus partibus nitri et vna antimonii parat, ob substantiam drasticam cicuratam, resoluentes et diaphoreticas vires adscribit, licet BOERHAAVIUS calcem hanc inertem immo noxiam reputauerit. Calcinationem plumbi ostendens quaerit, cur hoc metallum aequae ac stannum et ferrum, dum coloris principio priuantur, colorata demum euadant? videtur hinc Cl. Auctor illius sententiae esse, ac si principium inflammabile ne fortissima quidem calcinatione a terra vitrescente abigeretur, sed igne motum alium situm acquireret. Carbones autem, cinnabarim, nitrum fixum, alcali calcinatum etc. tale quid suspicari facere, recte monet.

p. 240.

Ad declarandam praecipitationis rationem varia Noster communicat experimenta, quorum primum lactis sulphuris praeparationem tradit; alterum sulphur antimonii inscribitur, quod, ad MEUDERI modum paratum, prae reliquis Noster commendat. Decoquitur nimirum hepar antimonii cum aqua. Decocto, per filtrum traiecto et per aliquot septimanas reposito, fundum petit pulvis, a MEUDERO sulphur antimonii impurum dictus; liquori superstiti decantato affunditur acetum, quo facto pulvis secedit aurantius, qui sulphur auratum antimonii vocatur. Hoc sulphur, reliquis anteponendum, securum

curum esse remedium resoluens et ad prima contra morbos inflammatorios aliosque chronicos remedia pertinere, Noster automat, nec reliqua, cum per acidum vegetabile auctas vires vomitorias habeant, ad internos vsus commendanda esse, innuit. His experimenta de pulvere carthusianorum, mercurio vitae, extractione resinae ex vegetabilibus, magnesia nitri, auro fulminante, purpura minerali, argenti depuratione per acidum salis, aqua forti praecipitata, scala affinitatis acidi vitriolici, praecipitationibus mercurii, saturno cornuo, pigmentis ex coccionella et coeruleo Berolinensi adnectit, horumque productorum vsus multiplicem notat.

Praecipitationi, humida via peragenda, non p.264. sine ratione iungit reductionem, quippe quae non raro praecipitatio sicca appellatur. Cum ad hunc laborem non nisi corpora metallica recipiantur, et plerisque metallis sulphur adhaereat, ita, vt metallicam formam exuant, nunquam recuperandam, nisi istud separatum fuerit, Noster ideo scalam affinitatis sulphuris praemittit, antequam experimenta de reducendis metallis communicet. Quod ad experimenta attinet, primo glebae plumbi feracis et glebarum plumbi docimasiam tradit, dein de reductione ferri ex suis glebis et regulo antimonii agit, tum auri depurationem per antimonium aurique fulminantis reductionem docet, vbi notamus, Cl. Auctorem, cum acetum supra calcem auri destillaret, hanc fulminandi vim amittere, obseruasse, idemque de alcali volatili expertum esse. Porro lunae cornuae reductionem, ad methodum Cl. MARGGRAFII cum admixto sale ammoniaco et alcali fixo et mercurio instituendam, tradit et commendat, vltimoque calcis zinci reductionem, ab eodem Viro Cl. communicatam exhibet.

Ad

p.276. Ad vitrificationem progreditur Cl. Auctor, cuius producta in tres classes diuidit. Substantiae enim, hoc labore productae, si pellucidae sunt, vitra, si semipellucidae, porcellanae, sique a calce quadam metallica profundius tinctae apparent, scoriae appellantur. Doctrinam hanc exemplo vitri antimonii et vitri saturni, dein cupellatione, et gemmas artificiales parandi modo illustrat.

p.286. Ultimo loco de fermentatione Noster agit, et vinum, spiritus vini et alcohol eiusdem, quomodo obtineantur, docet: hisce experimentis alia, quae crystallorum tartari, tartari tartarificati, qui a Nostro tartarus solubilis vocatur, salis polychrestii SEIGNETTE, tartari chalybeati et tartari emetici praeparationem tradunt, adnectit, posthac vero acetificationem, denique putrefactionem exponit.

X.

Dissertatio inauguralis de fatis variolarum insitionis in Suecia, Auctore IOANNE ANDREA MURRAY. Stockholmiensi. Goettingae, 1763. 4to pl. 5½.

Cum scripta, quae in Suecia variolarum insitionis artem commendandi causa edita fuerunt, apud externos, ob linguae rariorem extra patriam notitiam, haud ita cognita sint: Cl. Auctor, ea quae ipsi de illo argumento vel ex scriptis publicis vel ex litteris, a celeberrimis medicis ad eum missis, innotuerunt, in hac dissertatione sedulo congeffit. Ipsa vero in tres diuisa est sectiones. Quarum prima de indole variolarum in Suecia grassantium agit, secunda successum insitionis in variis regni prouinciis ad finem circiter anni 1761 exponit, et tertia tandem scripta de variolarum insitione in Suecia edita recenset.

Tanta

Tanta vehementia variolae in Suecia faeuire solent, quae omnino ad earum infitionem tentandam impellere possit. In hoc probando, quamuis Cl. Auctor non ad antiquiora tempora regrediatur: testimonia tamen quaedam virorum, qui adhuc vita fruuntur, fide dignissimorum, collegit. Obseruat enim Ill. ROSENIUS, annis 1744 et 1750. Vpsaliae perniciosum nimis et malignum variolarum genus inualuisse. Eodem redit Epidemia variolarum Encopienfis, a Cl. BERGIO in historiis de morbis epidemiis descripta. Nec benignioris naturae fuerunt variolae, quum sub finem anni 1754 ad Fennos transmigrarent. Quae Stockholmae anno 1755. 1760 et 61 aegros vexabant variolae, pariter malignae indolis fuerunt. In ditione Calmariensi ferme quotannis variolae tanta cum vehementia faeuunt, vt plurimi exinde pereant. Et in Norrlandia anno 1760 tantam stragem fecerunt, vt quibusdam in locis tertius quilibet homo vel quartus interirët. Optimum vero vehementiae variolarum in Suecia testimonium peti poterit, ex Ill. WARGENTIN, Equitis et Secretarii Regiae Academiae scientiarum Suecicae, disquisitione, de commodis, quae ex annuis nascentium et morientium diptychis redundant. Ex hac enim constat, quintam fere hominum partem, quibusdam annis, variolis in Suecia iugulari. Cui adhuc accedit testimonium Cl. SCHULZII, qui numerum 9000 hominum, singulis annis variolis defunctorum, tanquam medium, iuxta observationes plurium annorum, ex diptychis erui dixit. Haec igitur variolarum vehementia Suecos monuit, quo infitione vitae et integritati ciuium consulerent. Idque eo magis, cum recentiorum in obseruando sollertia ne vnum quidem casum inuenire potuerit, qui documentum iterati verarum variolarum accessus praeberet. Ideoque sententia Cl. SIDORE, qui

qui in Tractatu de variolis et morbillis, non rarum esse inter septentrionales populos Suecos, Danos, etc. bis, ter, quaterue, variolas vnum eundemque hominem inuadere, asserit, per experientiam plane sit refutata.

His expositis, Cl. Auctor in sectione secunda tradit, quaenam variolarum insitionis artificium in Suecia habuerit initia, quae incrementa, et quis demum nouissimus eius sit status. Cl. HAARTMAN-
NUS, quantum scire licet, primus fuit, qui variolas in Suecia inseuit. Factum hoc est Aboae anni 1754 die 19 Nouembr. in Cl. LECHE Prof. Medici, filia, et felicissimo quidem cum successu. Nec minus fausto euentu vsus est Cl. AURIVILLIUS, Medicus regius et Professor, qui paullo post Vpsaliae experimentum instituit. Quemadmodum vero tenue esse solet rei nouae cuiusuis et insolitae initium, ita nec huic adeo felicem esse contigit, vt cuius statim probaretur. Reduce autem Cl. SCHULZIO ex-
itinere, quod Sacrae Regiae Maiestatis iussu, impensisque publicis, vt, quidquid ad variolarum inse-
rendarum artem spectaret, addisceret, in Angliam fe-
cerat, incrementa cepit haec variolas excitandi me-
thodus magis conspicua. Schediasma enim, quod anno 1759 de nosocomio, secundum Londinensis formam, in insitionis vsum Stockholmiae adornan-
do conscripsit, illustre illud collegium, cui regia auctoritate sanitatis cura commissa est, non solum probauit, sed et, vt typis statim vulgaretur, adiecta cohortatione, vt quisque ciuium quantum vellet pe-
cuniae ad hunc egregium finem erogaret, curauit. Quo facto, ordo ille, qui fabrorum murariorum libero-
rum nomen adsciuit, tam Gothoburgi, quam Chri-
stianstadii nosocomia in hunc finem adornauit. Or-
dinis vero, qui Stockholmiae est, eiusdem nominis iussu et impensis Cl. SCHULZIUS anno 1761 die
29 April,

29 April. in 37 infantibus infitionem perfecit. Aequalis apud omnes et singulos successus fuit, quamvis nonnulli vermibus et auris ulcere laborassent, alios vero paullo ante hydrops anasarca et tertiana tentauisset. Quinque horum fuerunt, quos ob cicatrices ex variolis iam semel superatis conspicuas, tentaminis tantum causa infitioni subiecit: in his tamen, filis etsi mutatis, nullus morbus excitari potuit. Eidem Cl. SCHULZIO intra quinquennium 123 infantibus, inter quos et de procerum regni et purpuratorum prole fuerunt, arte illa adiumento esse contigit. Inter hos 16 fuerunt, qui, renouata etsi infitione, a morbo immunes manserunt. Qui vero manu Cl. ACREL Stockholmiae variolas sibi inferi passi sunt, numerum 29 constituunt, et Cl. BERGIUS 19 numerauit. Sed nec ceteros, qui extra metropolim infitionem exercuerunt, spes frustrata est. Summa enim eorum, qui ab anno 1756 Wae Cl. HASTII curae demandati fuerunt, ad 89 adscendit. Idem Medicus nuperrime in bobus infitionem, pure ex bubonibus internis collecto, ad praecauendam luem iis communem instituit; de experimenti autem euentu nihil adhuc constat. Cl. VESTMANN 32 infantes, quibus variolas Gothoburgi iniecit, indicat. Cl. HAARTMANNUS ab anno 1754 Aboae 13 infantibus infitione prospexit. Hic ob florum recentium inopiam, in 4 infantibus crustis pustularum sibi Helsingforsia, ubi malignum variolarum genus vigeat, transmissis, ope vnguenti digestiui et cantharidum morbum excitare coactus fuit, exitu tamen faustissimo. Cl. GISLERUS 20 exhibet, in quibus Hernosandae infitionem suscepit, cui iungendus est Cl. D. et Math. Lector SCHULZ, qui Arosiae 6 infantes eidem operationi felici cum successu subiecit.

Hiscæ in sectione tertia Cl. Auctor recensitionem scriptorum, quæ hac de re in Suecia edita fuerunt, subnectit. Sunt vero præter exterorum quaedam scripta in linguam Suecicam translata, Cl. BERGERI et SCHULZII observationes, quæ in actis Academiae Regiæ Scientiarum Suecicæ reperiuntur: nec non libellus ille, res medicorum Prouincialium in Suecia superioribus annis et speciatim inde a comitiis anni 1756 gestas comprehendens, ex quo Cl. Auctor numerum et nomina eorum, qui inscriptione usi sunt, petiit. Praecipue vero notari meretur libellus, quem Ill. Eques ROSEN DE ROSENSTEIN anno 1756 in calendariis Suecicis concinnare coepit, cuiusque sectio nona seu vltima in calendario anni 1759 occurrit. Titulus est: *Vnderrättelse om lattaſte ſättet at genomgå kopperna*. Huic adhuc iungendum est Cl. SCHULZII opus, quod inscribitur: *Berättelse om koppers ympande, öfverlämnad til högloflige Kongl. Sundhets-Commissionen. Stockh. 1756* et quod in promptuarii Hamburgensis 1ma et 2da voluminis 26ti parte a Cl. Nostro Auctore germanice redditum reperitur.

XI.

IACOBI CHRISTIANI SCHAEFFER, Phil. Doct. et Ecclesiae Euangelicae Ratisbon. Ministri, Sereniss. ac Potentiss. Regis Daniae Norwegiae a Consiliis, Gymnasii academici Alton. Prof. Honorarii, Acad. Nat. Cur. Berolin. Roboret. et Monacens. Societ. Litter. Duisburg. Teuton. Goetting. et Lib. Art. Lips. Socii, Academiae Parisiensis ab epistolarum Commercio, Fungorum, qui in Bauaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur,

tur, icones natiuis coloribus expressae. Tomus I. Auspiciis Academiae Electoralis Bauaricae Monacensis. Ratisbon. typis Zunkenianis, 1762. pl. 4. tabb. C. c. effig. Auctoris. Tomus II. c. indice. ib. 1763. pl. 5½ tabb. C. 4to regal.

D. IACOB CHRISTIAN SCHAEFFERS *natürlich ausgemahlte Abbildungen Bayrischer und Pfälzischer Schwämme, welche um Regensburg wachsen. Erster und zweyter Band.*

Vt nullae plantae perscrutando atque inter-
noscendo varietates a suis speciebus sint diffi-
ciliores, quam eae, quae ad nudas seu cryptoga-
miam LINNAEI pertinent: sic laudatissimum
eorum semper fuit institutum, dum omnem operam
nauarent, expressis imaginibus accuratisque descri-
ptionibus tam intricatas plantarum species illustrare.
Quis erit, qui non admiraretur DILLENII de muscis
opus vtilissimum, MICHELI, GLEDITSCHII alio-
rumque de fungis descriptiones? Quare gaudio
quasi perfundimur, cum splendidissimum de fungis
librum a summe venerabili SCHAEFFERO condi-
tum peruoluimus. Delectant delineationes, dele-
ctant colorum pulchritudines, et accuratiores in
laude etiam sunt descriptiones, sed de his postea
dicemus.

Laudatum opus duobus constat tomis, quorum
prior primum fungorum genus sub nomine agarico-
rum numero 89 continet. Alteri tomo paulo am-
plior praefatio ea, quae in priori occurrit, prae-
missa est; ibi commemorat Cl. Auctor academiam
Electoraalem Bauaricam Monacensem non solum pri-

nam huius operis excudendi praebuisset occasionem, sed etiam primi tomi editionem perliberaliter adiuvisse; alterius vero tomi promulgationem rerum quarundam interuentu suis propriis sumptibus procurasse. Cum illud fungorum genus, Clathros dictum, in Bavaria et Palatinatu inueniri non potuerit, genus hoc nominatum in altero tomo desideratur. Quem ergo defectum in extrema tabula, aliis quibusdam fungis depictis, quodammodo expleuit. Sunt illi ex agaricorum genere, ligno quandoque insidentes; ex his idem colligit, quod iam a Cel. LINNAEO in Flora Lapponica pag. 353 est monitum; scilicet praesentiam et absentiam petioli, non magis quam figuram pilei aliarumque partium, in eodem etiam genere et specie fungorum praebere characteristicam essentialem. In fine praefationis isagoge in historiam fungorum, vberiorque fungorum historia proxima aestate promittitur. Nostrum est, ut Cl. Auctori vitam et vires ad finiendum hoc laudabile institutum sincere adprecemur.

Quae in altero tomo conspicienda sunt fungorum genera, haec sunt: Boleti numero 26; Hydnae 8; Elvelae 20; Clauariae 9; Pezizae 4; Lycoperda 10; Mucorea 4; Phalli 2.

Videamus nunc paucis descriptionum et imaginum modum et rationem. Quaelibet tabula praebet vel peculiarem speciem vel eius varietatem. Adspectabilis est superior pilei pars atque inferior; conspiciuntur fungi dissecti, euoluti, vix euoluti et magnitudine coloreque differentes. Delineata sunt fungorum semina, nudis et armatis oculis conspicua. Interdum monstrosus eorum habitus depictus est. Descriptio cuiuslibet tabulae a latere in opposita pagina adiecta est, quae num semper legibus botanices sit conformis, sententiam nostram suspendimus. Exemplo esto haec: *Agaricus quintus est fungus optime esculentus,*

tus, bicolor interdum tricolor, plerumque solitarius, carnosus totus lacteus, mutabilis; petiolo ad basin crassiusculo, velo et annulo carens. Bauaris dicitur Braedling.

Descriptioni semper subiecta est figurarum explicatio. Nihil magis dolemus, quam quod in tam splendido et admirando opere, nulla synonyma, nullae ab aliis praestantissimis viris constructae descriptiones allegatae reperiantur. Qui omni laude semper dignus est liber hic, ea longe dignior esset, si comparatio quaedam Cl. Auctoris descriptionum cum aliis a doctis viris iam datis esset facta. Absit, ut laudes tanti viri ullo modo diminuamus, ut potius optaremus, ut liber hic excellens omnibus, quoad fieri posset, numeris esset absolutus. Verum cum Cl. Auctor fungorum aliquam promiserit historiam, forsitan, quae nunc desiderantur, in optata historia speranda erunt. Nobis quoque videtur, quod quandoque fungorum species velut peculiare et diuersae traditae sint, quae, ut opinamur, melius pro varietatibus essent habendae, exemplo esse poterunt Tom. I. tab. 7 et 8 etc. porro lycoperda quaedam, clauariae etc. Sed haec omnia pace summe venerabilis Viri dixerimus.

XII.

De nonnullis plantis, quae pro venenatis habentur. Observationes et experimenta a PETRO ROSSI Florentiae instituta. Pisis 1762. 8. pag. 66.

Est epistola ad IOANNEM LAPI, in nosocomio regio sanctae mariae nouae botanics lectorem publicum data. Primum experimentum, cum to-

- p. 5. *xicodendro* institutum est, cuius externe applicatus cuti succus pruritus et inflammationes excitat. Interne itaque succum cum carne cani comedendum dedit, unde leui conuulsione affectus est, sed altero die reconualuit. Eidem itearum exhibitus succus expressus solus vel cum carne, vel cum radice nihil mali, nec minimum quidem fecit. Idem effectus, dum in venam cruralem succus infunderetur, vel dum in galli ingluuiem contusa radix detruderetur. Post haec tentamina facta sunt cum *solano* in canibus, quibus non solum ingestus fuit succus, sed etiam in abdomen infusus, leuissimis autem turbis exceptis, nulla periculosa excitauit symptomata, eadem repetita sunt in gallis, pullis, auibus,
- p. 10. simillimo effectu. *Cicutam* deinde, quae nostris temporibus adeo laudatur, experturus, duobusque exemplis in iuniori femina, in cancro aperto mammae, et in vetula in scrophulosis tumoribus, continuato etiam usu nullam sanationem videns, cani sano ceteroquin, porrexit succi uncias duas et ultra, sed sine omni mutatione; succus fermentatus, admodum foetens, digeritur ab eodem sine incommodo, immo radix deglutitur sine ullo inflammationis signo. Pullus unciam vnam et dimidiam succi expressi sine veneni nota accipit. Etsi vero multa dentur auctorum testimonia, quae *cicutam* et reliquas adductas plantas venenatas ostendant, quum acres succos contineant, non tamen obiici debere adferit Cl. Auctor, ac si hominibus magis, quam aliis noceant animalibus. Rusticorum est opinio, eruum gallinas et sues necare, boues saginare. Experimentum cum duobus gallis et pullo susceptum respondit dictis, sed in cadaueribus nullum veneni indicium, ingluuiies potius ab intumescantibus hisce seminibus, quae ob durum corticem digeri non poterant, facta reperiiebatur. Inde mortis causa.
- p. 39. Refel-

Refellitur quoque sententia BROGIANII, venena esse in proportionem inuersae magnitudinis et tenuitatis corporis viui, cui exhibetur, nisi forte in dosi data sit differentia. Valet contra venena aliquid morbi indoles et consuetudo, sana erant ad tentamina electa animalia, vt contra ea propter dici nil possit. Inde tamen neutiquam fluere arguit Noster, hominibus innoxie dari posse, etsi saepe vis plantarum a solo, quibus increscunt, et climate pendeat et varia reddatur. In efficaciam autem harum causarum se inquisiturum esse promittit Cl. Auctor, cuius libellum ea propter adducendum esse credidimus, quo in plantarum etiam virtutibus examinandis et celebrandis nullum studium atque attentionem praetermittendam esse pateat.

XIII.

Observations sur l'écorce des feuilles et pétalles A Geneve 1762. 12. pl. 4.

i. e.

Observationes de cortice foliorum et petalorum in plantis.

Auctor huius libelli, Cl. H. B. DE SAUSSURE, incitatus potissimum Ill. HALLERI, cui opusculum nuncupavit, approbatione, novas de cortice foliorum studiose institutas observationes publicas facere non dubitavit, quum in iis quaedam sint, quae ad meliorem functionum, a foliis peragendarum, explicationem pertineant. Ita vero ad quatuor momenta omnem suam reduxit tractationem, vt primo capite de foliorum petalorumque cortice, quatenus solis sensibus cognoscitur, secundo, quatenus

- tenus per microscopia intelligitur, *tertio* de rete, in cortice deprehendendo et *quarto* tandem de glandulis corticalibus differat. Folia plantarum, horizontaliter disrupta, ostendunt membranam gryscam, tenuem et fere pellucidam, alii epidermidem dicunt. Haec est cortex foliorum, color per morbos mutatur, quandoque maculas habet, quarum tamen sedes aliquando profundior et in parenchymate est. In cyclamine solum cortex coloratus deprehenditur. Adhaeret autem ille non in omnibus eadem tenacitate, nec simili modo in vtraque folii superficie. Petalorum cortex saepius coloratus existit. Idem ille pilos continet; singularis quoque est proprietas, corticem, si detrahatur, sese cito introrsum complicare. magis in foliis ac petalis, si exsiccatur, in contrariam se retorquet partem. Ex quo concludit Cl. Auctor, duo vasculorum systemata inesse.
- p. 13. Calor hanc conditionem accelerat, nisi sit humidus, qui actionem impedit, prius etiam fit, si folia aliquantulum marcescunt. Elegit autem, quo microscopio curatius rem detegeret, folia *digitalis*, *foliis calycis linearibus acutis*, *flore venoso*, *maculoso*. Microscopium adhibuit compositum, variasque lentes, vidit in membrana hac puncta obscura parua, quae oblonga conspiciebantur et corticem pertusum fistebant foraminibus inaequalibus, variae figurae, inerant his fila opaca, tortuosa, quae rete irregulare efficiunt; ad singulam aream sex fila accedebant, ipsa area, vero membrana semipellucida luteola occupatur: id est *rete corticis*, corpora oblonga sunt *glandulae* et membrana externa est foliorum epidermis. De his itaque partibus seorsim exponitur.
- p. 28. In rete corticis primo ad formam arearum respiciendum est, quae vel in foliis diuersis, vel in vnus eiusdemque partibus discrepat. Regulares magis sunt in superiore quam inferiore parte foliorum, angustiores

stiores et longiores sunt versus petiolum, quam versus mediam et anteriorem partem, rectis ex lineis constant eae, quae supra maiores nervos ponuntur. p. 34.
 Forma tamen arearum, etsi plerumque ex sex filis constant, non semper est hexagona, plerumque ex rectis lineis facta, sic, ut possis plantas distinguere in eas, quae habent areas longas, lateribus rectis, et eas quae habent tortuosas areas. Attamen difficillimum utique foret, ex hac conditione genera et species plantarum determinare. Filamenta porro, quae areas conficiunt, quoniam transparent et inter se anastomoses faciunt, apte pro vasculis habentur, ob pelluciditatem lymphatica dici merentur. In aliis p. 40.
 vero plantis inflexa, in aliis cylindrica apparent, et ad epidermidem magis, quam ad parenchyma vel alias partes adiunguntur. Sub hoc reticulo autem aliud constituitur, quod parenchymaticum vocat Noster, ex vasculis maioribus amplioribusque areis compositum. Cortex petalorum fere eadem omnia p. 46.
 similiter habet, nisi quod vasa, ut in borragine, magis spiralia appareant. In cortice *cataputiae*, numerosa invenit puncta lucida, obscuro circulo circumdata, deinde in aliis, vasa, ut vult Cl. DU HAMMEL, transpirationi destinata, certe non sunt, quid autem sint, per tentamina omni data opera cognosci non potuit. Glandulae corticales non tantum ad p. 60.
 rete descriptum adhaerent, sed etiam fibra vel vasculo circumambiuntur, ita tamen, ut intervallum supersit. Figura earum ovalis et oblonga est, et vasculi circumeuntis elliptica, cum quo etiam vasa retis communicant. Ex glandularum extremitate vidit etiam exire vasculum, subtile, rectum, quod ad vasculum circumeuns properabat. Adfunt autem in omnibus foliis et in solo eorum cortice, singulares ellipses in Cannacoro occurrunt. p. 71.
 Varios itaque in glandulis apparatus, vasorum, eorumque inflexus

decursus haud obscure significat, eandem esse ac in glandulis animalium vtilitatem, secretionem scilicet et praeparationem succorum. Etenim est inter sanitatem foliorum et glandularum pelluciditatem ac perfectionem relatio: in sano folio egregie pellucet, sed opaciores, immo obscurae, in adfecto euadunt. An transpirent succos, cum Cl. GUETTARDO non arbitratur Noster, quin potius eundem refutat, et glandulas corticales ad vascula absorbentia refert. Quod autem nec haec sine limitatione ponenda sint, ex varietate situs glandularum, in foliis etiam arborum, apparere videtur, quippe quibus in superficie foliorum inferiore tantum concessas esse voluit Cl. BONNETUS, sed etiam superiorem

p. 82. Iuniperi, et solam tales habere reperit Cl. Auctor. Hinc aliquando excretionis officium in se suscipiunt, probatur exemplo Nymphaeae; elaborationi sane

p. 91. succorum inseruiunt. Sed petala iisdem plane destituuntur, ut ea propter in hoc defectu evidens quaedam petala distinguendi nota sit: acceperunt autem illa in singula corticis area vesiculam, papillae conicae similem, pellucidam, coloratam: a quibus non tantum color petalorum dependet, sed etiam glandulas globulares GUETTARDI earumque pediculos insertos habent. Nos vero utique conuincimur, hanc etiam ad foliorum usum perspicendum non parum facturam esse disquisitionem.



XIV.

De hydropo articulorum, Dissert. inaugural.
Auctore GEORGIO HAFFNER Sueuo Fil-
lenbacensi. Nosocomii Pazmariani Chirurgo.
Vindobonae 1762. 4. pl. 5 $\frac{1}{2}$.

Morbi huius haud ita levis quidem accurata de-
scriptio, et naturae, sedis causerumque eius
docta peruestigatio, nec non curandi metho-
dus, propria experientia Cl. Auctoris firmata, te-
stantur omnino, quantum Auctoris in diiudicandis
morbis sit ingenium, quantusque in adplicandis re-
mediis attentus animus. Nos qui scriptum hoc
consideratione dignum iudicauimus, praecipua eius
momenta breuiter recitemus. Quidquid linimen-
tum illud in articulorum cauis contentum, liquo-
rem Hauerianum dictum, praeternaturali modo
accumulare, mutare, stagnantemque efficere potest,
illud causam proximam hydropis articulorum esse,
Cl. Auctor affirmat. Tales hydropicos tumores, in p. 7,
variis quidem articulationibus, nullibi tamen fre-
quentius, quam circa genu obseruauit. Suspi-
catur putat, ossa valde lata, et ligamentum capsu-
lare, quod hoc loco maximum est, minori sua resi-
stentia, faciliorem distentionem admittere posse.
Ipsam humorem, inciso tumore, varium, nunc
limpidum, nunc flauum, ichorosum, viridescen-
tem, et leni caloris gradu inspissandum Cl. Auctor
reperit. Omnes causas morbum hunc generantes,
in duas dispescitur classes, ad quarum primam omne
refert, quod liquorem Hauerianum maiori, quam
naturali, copia secernit; ad alteram, quod humore
mutato ad articulorum caua deponendo, tumorem
hydropicum efficit. Augeri humorem articulare,
aut si plus secernitur, quam resorbetur, aut, si iusta
quan;

quantitate secretus, parcius vel prorsus non resorbetur, Auctor putat. Multiplicationem secretionis huius, auctis vniuersae secretionis causis adscribit, impeditam vero resorptionem, dum in ipsis vasis, si laxa sunt, paralytica, callosa, et obstructa, dum in humore viscidiori reddito, haerere, iudicat. Altera causarum classis, quae scilicet praeternaturali humore articularum caua replendo, hydropicis tumoribus oriundis opportunitatem praebent, varios

p. 10. praegressos sistit morbos, vt sunt variolae, morbilli, scorbutus, venerea lues, rachitis, rheumatica et arthritica diathesis, quae mala, cum vniuersis corporis humoribus peruersam mutationem concilient, liquorem etiam articularum acrimonia obuoluant. Curiosum est, quod Cl. Auctor refert, articularum hydropem, in loco, quem semel occupauit, permanere, nec, vt aliae hydropis species, ex vna in alteram corporis partem transmigrare. Symptomata, hydropi genu accedentia, haec obseruauit. In motu sentitur dolor, partemque adfectam circumdat tumor, cuti plerumque concolor et mollis, et pressioni ita cedens, vt ipsi femoris condyli tactu possint percipi, qui ad tantam saepius magnitudinem increscit, vt duos tresue pollices supra patellam ascendat, et manuum ope leuiter concussus, manifestam, vt in ascite, aquarum fluctuationem praebeat. Quod si vero malum fuerit neglectum, longe peiora animaduertuntur symptomata. Semper enim, humore aucto, vera partis luxatio producit, stagnando humore, acrimonia oritur quae partes erodit, inflammatque, aut tandem resorptus humor reliquam liquidorum massam inficit, totumque corpus lenta febre emarcit.

p. 12.

p. 15.

Sunt nonnulli morbi, cum quibus genuum hydrops magnam affinitatem habere videtur, e. g.

fungus ad articulum ortus, nec non oedema, et suppu-

suppuratorius tumor, accurate vero disquirenti adparebit, morbos hos, ratione sedis, causarum, symptomatum, curandique methodi euidenter ab hydrope genium differre. Cura huius morbi, ad quam Cl. Auctor progreditur, alia est, in recenti, alia in p. 18.

inueterato malo. In recenti morbo aquarum stagnantium dissipationem, aquae frigidae affusione, aut adplicatis fomentis ex vino, sale, aceto, vrina, scordio, ruta compositis, aut ipsa tandem embroche ex aquis mineralibus calidis, tentauit. Cicutae usum externe in fomentis egregium expertus est. Interne purgantia hydragoga, diaphoretica, et diuretica non neglexit. Quod si vero malum his remediis non cedit, aperiendum esse tumorem Auctor suadet, hac tamen cautela adhibita, ut vulnus sibi relinquatur, nec turundis vel aliis corporibus nimis amplificetur, ne aeri aditus facilis concilietur. Multis enim Cl. Auctor edoctus fuit exemplis, quanta incommoda aer, ad vulnera penetrans, produxerit.

Et primo hydatidum exemplo demonstrat, has angusto foramine esse aperiendas, ne aeri ad vulnus aditus pateat. Eadem enchiresi hydropem sacca-

tum esse curandum, cuius tamen aperturam non instituendam esse Cl. Auctor putat, nisi tumor extra abdominis cauum inter integamenta et peritonaeum haereat. In empyemate et vomica ex pleuritide nata egregium quoque effectum ab apertura parua facta obseruauit.

Aliter res euenit in abscessibus profundioribus, hos maiori cum vulnere, et quidem longitudinali et transuersali simul, aperiendos esse Auctor suadet, cum contextus cellulosus a materia acri reddita, exesus saepius sit destructusque, immo sinus formentur, e quibus, parua incisione facta, humor non commode possit educi. In hydrope scroti et pedum dissipationem aquarum ope fomentorum calidiorum acqui-

fiuit.

- suit. Venaesectionis in rheumaticis doloribus adhibitaefunestum euentum in foemina obseruauit, quae
- P. 36. paucos post operationem dies exspirauit. Fistulam ani in foemina 60 circiter annorum, sola iniectione excicuta facta, perfecte et absolute curauit. Naeuos maternos felici cum successu ab Auctore fuisse extirpatos, variis adductis exemplis demonstratur. In reponendo luxato humero, vsus est Cl. Auctor polyspasto pro extensione facienda, pro contraextensione vero loro, quod circa pectus adplicatur, et duabus habenis, quibus praeditum est, ascendentibus supra scapulam et clauiculam flectitur, et descendendo loro iterum adnectitur. In pedis et manus luxatione, praecipue si ossa sunt fracta, repositionem leni semper modo esse tentandam, nec prius reiterandam, nisi dissipata fuerit inflammatio, Auctor suadet. Suturas vulnerum non semper necessarias esse, Noster fuit expertus, tandemque obseruationes addit, de herniis incarceratis, auena leniter tosta, sacculo inclusa, et hernioso loco adplicata, curatis. Hanc medendi methodum saepius proficuum inuenit, quamuis rationem, cur prodesset, detegere non potuerit.
- P. 40.

XV.

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Zürich, I. Band, Zürich 1761.
8. Alph. 1. pl. 12. tab. aen. 4.

h. e.

Acta societatis naturae indagatorum Tigurinae.
Tomus Imus.

Collectio haec libellorum a societate, quae Tiguri
florete, facta complectitur, excepta praefatione,
vbi

vbi de edendarum commentationum ratione dicitur, 13 disputationes, quarum summa, quoad fieri poterit, nunc paucis indicanda est.

1) Scenam aperit oratio *de societatum utilitate in augendis vitae humanae commodis ex perscrutandis rebus physicis oriunda*, habita a D. HIRZEL eo ipso die, quo laudata societas primum conuenit, scil. d. 10 Ian. 1757. In ea, praeter necessitatem, utilitatem et iucunditatem rerum naturae intelligentiae, de ipsa societatis ratione et constitutione exponitur. Sociorum duo sunt genera, alii ordinarii, honorarii alii appellantur, quibus semper e societate aliquis praeest, cui ad manus sunt duo librarii. Vniuersae elaborationes ad quinque classes rediguntur, prima continet eas res, quae ad physicam, proprio sensu sumptam, pertinent; altera res mathematicas; tertia historiam naturalem, quarta res medicas et vltima oeconomicas illustrat. Laudantur deinde egregiae collectiones librorum, instrumentorum, machinarum, auium, piscium, quas iam possidet societas. Inprimis admirationem mouet herbarium, ex 36 tomis constans, et a Praeside huius societatis summo studio collectum; ibi reperiuntur prope plantae omnes in Heluetia sponte crescentes, gramina cuncta a Cel. SCHEUCHZERO olim descripta, magnus muscorum numerus, multaeque aliae plantae exoticae.

p. 31

p. 57

p. 63

2) *De situ et magnitudine urbis, cui nomen Tigurum, physice considerata* Auct. D. GESNERO. In tres partes distributa est haec disputatio. Primum situs et regio urbis, deinde eius magnitudo definitur, ex quibus denique conclusiones quaedam deriuantur. Situs a determinatione latitudinis, longitudinis et altitudinis supra maris superficiem pendet. Latitudo prope $47\frac{1}{2}^{\circ}$, de longitudine res dubia est, accurate

p. 79

curatior tamen vtriusque rei determinatio promittitur. Naturalis situs ex aquarum terraeque indole atque montibus circumiacentibus diiudicatur. Area vrbis vna cum suburbiis 15. 458, 314 □' ponitur, numerusque incolarum circiter 12500. Tem-
p. 96. peries aeris et ipsum clima ex vrbis latitudine, altitudine supra maris superficiem, montibus, lacu et fluuiis ventisque intelligitur. Maxima altitudo mercurii in barometro reperta semper est 27'', atque minima 26''. Venti, qui per totum fere annum flare solent, sunt S. W. N. SW. NW. rarissime contra reliqui a nautis appellati venti spirant. Pluuiarum et niuium magna per annum copia delabatur; est scil. numerus dierum quando pluit, ad dierum reliquarum numerum vt 100 ad 365. Media aquae altitudo de coelo lapsae 32½'' est inuenta, quare copia aquae quotannis delapsae ratione totius vrbis est 352. 446, 643½ Cent. Ex his, quae diximus, quodammodo, qualis sit in corpora humana influxus, perspicui poterit. Mutationes enim omnes ex aere rariori et subtiliori, copiosis exhalationibus aquosis, caloris et frigoris frequente vicissitudine, multitudineque incolarum sunt explicandae.

3) *Descriptio agriculturae in agris Appenzell di-*
p. 115. *stis* Auct. LAUR. ZELLWEGER M. D. Quae de agris Appenzellenribus tradita est descriptio, continetur primum commemoratione terrae incultae, atque cultae, deinde adminiculis, quibus inculta terra adaptanda est, cum foenore ad acquirendam magnam foeni copiam. Tertio indicantur subsidia de conseruandis, qui fertiles sunt, agris. Denique quo modo varia fimi genera ad saturandos agros possint adhiberi, enarratur.

4) *De*

4) *De noua diu sine corruptione conseruandi frumenti methodo* Auct. HENR. SCHINZ. iun. Quo p.135.
 pacto frumentum sit conseruandum, docetur tribus capitibus, quorum primum refert rationem conseruandarum annonae apothecarum, quae haecenus in vsu fuerunt. Alterum Cl. INTIERI conseruandi frumenti modum explicat. Vltimo loco haec tractandi frumenti ratio commendatur.

5) *Observationes circa virtutem corticis chinae in variis morbis.* Collectae hae observationes non p.189.
 vnum auctorem, sed plures agnoscunt. Prima est a D. RAHN et D. SCHINZ, cuiusque summa haec est: vir quidam, 45 annorum temperamenti sanguineo cholericus febris catarrhali benigna laborabat, quae postea naturam febris intermittens irregularis induit, tandemque in quotidianam cum sopore coniunctam sese mutauit. Adhibebantur medicamenta antifebrilia, externe rubefacientia, sed sine effectu. Tandem vsus corticis chinae praecipiebatur. Sopor cessit, atque aegrotus post aliquot dies conualuit.

In altera observatione a Cl. RAHN narratur, p.193.
 quanti fuisse vsus corticem Peruvianum in febris variolarum secundaria, qua correptus fuerat puer 3 annorum, qui maxima cum voluptate variolas exsiccatas deuorauerat.

Eundem effectum a cortice quoque obseruauit p.195.
 Cl. HIRZEL, in cuius descriptione morbi obseruati id annotasse conuenit, quod ille sponte suppressam in variolis confluentibus nigrescentibusque saluationem repetita dosi mercurii dulcis reuocauerat.

Quarta obseruatio, a Cl. SCHINZ communi- p.200.
 cata, confirmat vsus chinae corticis in febris aliqua irregulari, post variolas bene superatas orta.

p.203. Quinta obseruatione Cl. RAHN duplicem casum de vsu eiusdem corticis in malo hysterico commemorat.

p.207. Vltima obseruatione vsum huius corticis in incipiente gangraena a causa interna commendat Cl. RAHN et FRIES.

6) *Obseruationes nonnullae de terra torfacea* Auſt. CONRAD HEIDEGGER, *in agris Rūti dictis effossa*. Reperitur illa iis inprimis locis, vbi crescunt plantae sequentes: sphagnum palustre, eriophorum vaginatum et polystachium, bryum cespititium, carex pulicaris et ramosa, schoenus nigricans et mariscus, iuncus glomeratus, effusus, filiformis, andromeda polifolia, equisetum limosum, erica vulgaris, vaccinium oxycoccos, mentha aquatica et drosera. Interdum abietis, quercus etc. fragmenta cum hac terra commixta effodiuntur. Fundamentum huius terrae plerumque est argilla caerulescens. Exinde liquere docetur: primarias terrae torfaceae partes esse plantas et radices ex parte putrescentes, atque hoc terrae genus ab initio non esse conditum, nec lignum putrescens huius terrae constituere partes essentielles.

p.231. 7) *De variis frumentum conseruandis modis eiusque delectu*, Auſt. IOH GESNERO. Lectu digna est haec commentatio *), atque constat tribus partibus; prima frumentorum genera eorumque naturam explicat; altera, quot sint modi, quibus frumentum corrumpatur, docet; tertia adminicula de fer-

*) Primum prodiit disputationis forma sub hac inscriptione: *Diff. physic. de variis annonae conseruandae methodis earumque delectu*. Praeside I. GESNERO Turici 1761. 4. pl. 5. c. tab. aen.

feruando frumento indicat. Duplex est corruptio-
nis frumenti causa, altera intrinseca v. c. fermenta-
tio, externa altera, inprimis in insectis quaerenda:
quorum pertinent phalaena granelle, et tritici, cur- p.252.
culio granarius, tenebria molitor, et acarus farinae.
Ad impedienda itaque haec corruptionum genera
ria remedia commendantur. Adhibendum est pri-
mum aduersus vehementem partium internum mo-
tum atque in eo consistit: remoueatur aeris externi
communicatio, dissipentur humores, condantur
fructus. Alterum requirit aptum et moderatum fer-
mentationis gradum; tertium est de modis repellendo-
rum insectorum, quae frumento damnum inferunt,
quorum optimum hunc esse existimat, si frumenti
rana in furno Intieriano exsiccentur.

8) *Confirmatio systematis Halleriani, quod non-
nullis partibus corporis humani, inprimis tendinibus,
insensibilitatem abrogat, observationibus quibusdam chi-
urgicis corroborata a IOAN. RUD. BURKHARD.*
In sex diuersis aegrotis opportunitatem habuit in-
quirere huius rei, a multis adhuc impugnatae, in-
quirendi, et reperit 1) in virgine aliqua, duram ma-
stem et pericranium nullum sentisse dolorem, licet
tri-que, frustulo antea ossis parietalis dextro post ex-
plicationem ablato, balsamum quendam applicue-
rit acrem, qui in labiis eiusdem vulneris acutum ex-
citabat dolorem. 2) In alio viro fauciatam arteriam
radiaeam ad tendinem musculi radiaei interni arcte
ligauit, nec ullus inde secutus est dolor, nec
alius effectus sinister. 3) Simili modo non solum ar-
teriam tibiaeam posticam cum tendine flexoris polli-
cis arcte constrinxit, sed etiam plures fibras a tendine
Achillis aliorumque vicinorum musculorum, quod
anagraena tangi coeperint, sine doloris sensu ali-
quoties resecauit. 4) Cl. HIRZEL et Auctor in
H 2 virgine

virgine quadam nudas tendines musculi sternomastoidei et splenii cultelli apice pupugerunt, fibrarum aliquot in iis transversim disciderunt, lapide infernali tetigerunt et quarto die eadem tentamina repetierunt, nec sentiit quicquam aegra, cum horum ne leuissimum in cute pati valeret. 5) In alia virgine Auctor per incisionem meliceridis, quae dorso manus infederat, dissecta simul vagina tendinum extensorum digitorum, denudauerat has tendines omnes, vulnus deinde purgatum fascia inuoluerat, sed statim ingens oriebatur dolor, qui quidem sensim sensimque sponte mitescebat, quinto vero die, cum ei, incepta suppuratione, vnguentum digestiui balsamicum Cl. Auctor imponeret, recrudescebat, itidemque sequenti repetiebat, licet priorem balsamum cum simplici et miti mutasset; atque hoc quotidie post quamlibet recentem vulneris deligationem accidebat, ita, vt Auctor de insensibilitate tendinum et ligamentorum, quam certam expeditamque crediderat, subdubitare nunc inciperet. Secum itaque constituit hanc rem tentaminibus expiscari. Quare tendines has nudas vossella comprimebat, acu perforabat, spiritu acri ungebat, nec horum quicquam sentiebat aeger, indubitato argumento, dolores a nudis nervis vaginam percurrentibus provenisse. 6) In operatione chirurgica herniae incarceratae, vnius lateris duplicatae, Auctor ligamentum FALLOPII nonnullis in locis incidit, praeterquam quod aegrotus vel minimum doloris habuisset sensum. Duplex haec erat hernia, quarum altera, inguinalis, alteri subtus latenti, femorali, incumbibat.

9) *De corrigendis pascuis vliginosis et de instituenda armentorum pecorumque sanitatis cura praecepta quaedam tradunt Praeses et membra collegii sanitatis Tigurini.*

P.349. *gurini. Quum pascua et prata vliginosa saepe noxam armentis*

mentis, pecoribusque inferant, omnis opera estnauanda vt quouis modo tam inculta loca corrigantur. Quare fossae ad quamlibet regionem, siue elatior siue depressior sit, accommodatae, sunt effodiendae. Nec spernendae sunt arborum plantationes eis locis laete crescentes v. c. salicis, alni, populi etc. extirpandae e contrario sedulo plantae ad impediendum, quo minus eiusmodi pascua corruptiora euadant, hic pertinent varia iuncorum, scirporum, carduorum et similia genera. Quibus rite obseruatis, cauendum est, ne iumenta pecoraque qualibet anni tempestate pascantur, nam delectus tempestatis in oeconomia animantium semper magni faciendus est. Cauendum est porro, ne nominata animantia nimis agantur. Purgandi sunt putei atque lex de introducendis animantibus ex alienis regionibus caute est sancienda.

10) *Oeconomicae praecepta* sub titulo: *Oeconomia* p.371.
rustici philosophici Auct. D. HIRZEL. Libellus de rustico philosopho tradit praecepta de instruenda oeconomia circa agriculturam et pecuariam. Quam ob causam exemplum aliquod tanquam fictum ponitur eo animo, vt paulo melius ista praecepta ad casum electum accommodari possint.

11) *De variis experientia probatis remediis contra* p.497.
frumenti vstilaginem Auct. IOAN HENR. SCHULTHEIS. Varia plerumque contra vstilaginem commendantur remedia, horum praecipua Cl. Auctor recenset, atque exinde colligit, semina cum quolibet lixiuio aquae coniuncta posse ab hoc frumentorum morbo liberari.

12) *Quidam circa plantas descripti inopinati habi-* p.507.
tus et variationes ab Auct. SALOM. SCHINZ M.D.

Antequam ipsa inopinata quarundam plantarum facies, monstrosique habitus exemplis declarantur, praemittuntur primo explicationes quaedam de interna plantarum structura, de naturali earum constitutione, de variis modis, unde earum varietates originem capiant; denique causae variationum traduntur, quae vel esse possunt internae, veluti pollen alterius diuersae plantae pistillo alterius adpersus, unde plantae hybridae oriuntur; porro aequilibrî defectus in viribus vegetationis, quo efficitur, ut quaedam plantarum partes magis nutriantur et explicentur quam reliquae. Vel externae sunt, ut locus et clima, ubi crescunt, atmosphaerae constitutio, nutritio, laesio ab insectis orta, pressio, cultura et ars hominum. His praemissis de anni 1760 fertilitate exponitur, denique monstrosi illi plantarum habitus ad societatem missi recensentur, quorum pertinent rosa centifolia prolifera frondosa, centaurea moschata floribus quatuor pedunculis concretis, tro-paeolum minus simili modo; pira prolifera frondosa, malum pedunculo fertili, cydonium triplex frondosum.

13) *Observationes meteorologicae anni 1760 collectae a CONRADO MEIER.*



XVI.

IOSEPHI QUARIN Sacrae Caesar. Reg. Apost.
Maiestatis Inf. Austr. Regim. Consil. Sanitat.
et in Nosocom. frat. misericord. Physici,
Tentamina de cicuta. Vindobonae, typis,
Ioannis Thomae Trattner, 1761. 8. pl. 2 $\frac{1}{2}$.

In duo capita totus hic libellus dispescitur, quorum
primum plantae descriptionem et analyfin che-
micam continet, secundum vsum cicutae declarat.
Magna inter botanicos circa plantam hanc nostram
hallucinatio, nec minor fere inter eosdem de certa p. 6.
nominis definitione fuit controuersia, siquidem
BAUHINUS cicutam maiorem, CLUSIUS cicuta-
riam maiorem vulgarem, ROYEN conium, cicu-
tam TOURNEFORTIUS nominauit, vt vel hō-
dientum adhuc non admodum forte facile foret, duo
haec plantarum genera nomine confusa accuratius
distinguere, nisi Cl. LINNAEUS proprios iisdem
characteres essentialis imposuisset, et alterum sub
cicutae nomine, vmbellis, folio oppositis, petiolis
marginatis, obtusis; fructu subouato sulcato; al-
terum vero sub nomine conii caule maculato, se-
mine subglobofo, quinque striato, vtrinque crenato,
descripisset. Chaerophyllum temulentum, cum
quo facile ob similitudinem confunditur, inuolu-
crum habet reflexum, concauum, conium autem
inuolucro polyphyllō ad horizontem posito instru-
ctum est. Porro chaerophyllum petalis gaudet cor-
datis, fructu oblongo leui, nec odore adeo tetro
atque conium displicet.

Libra vna plantae a Cl. IACOB WELL, phar p. 12.
macopaeo Viennensi, arenae balneo imposita, pri-
mum phlegmatis limpidi, insipidi, odoris paulisper

tantum fatui quinque drachmas cum semisse exhibuit. His remotis, phlegmatis parum colorati, odoris magis fatui, nauseosi, saporis exigui, non multum empyreumatici drachmae septem cum semisse insequiebantur. Ab utroque color coeruleus non mutabatur. Cum ipso hoc caloris gradu per tres horas sustentato nil amplius prodiret, gradatim eundem Cl. WELL intendit, et laticis fusci, graueolentis, acris, odore volatilis, linguam pungentis, tres uncias totidemque drachmas extricauit. Sub profectione huius spiritus manifeste alcalini, latera recipientis sale alcalino volatili undique obducebantur. Salis huius sicci drachma una cum scrupulo eximebatur, reliquum, aqua prius ponderata elotum duas drachmas viginti et quinque grana ponderabat, multumque cum spiritu adhuc effundebatur, in quo disparuit. Tandem olei tenacis, crassi, nigerrimi, foetidissimi uncia una cum semisse, et drachma dimidia proliciebantur. Carbo relictus ponderis trium unciarum uniusque drachmae, per duas horas in vase aperto calcinatus, salis alcalini post elixati tres drachmas praebuit, terrae indissolubilis uncia una, et drachma semisse remanentibus.

p. 16. Sequitur nunc caput secundum, in quo Cl. Auctor, decem et septem casibus egregiam cicutae virtutem declarat. Prius autem, quam ad hos ipsos se conuertit, feminas viris citius ut plurimum curari, tumores magnos ope remedii valde imminui, imminutos vero pertinacius quandoque resistere, atque tumores tandem scirrhosos plurimis fundi, paucis bona suppuratione consumi monet.

Casus I. II. III. usum cicutae in tumoribus scirrhorosis declarant.

Casus IV. V. insignem plantae virtutem in cancro ostendunt, quam Cl. Auctor in spina ventosa et phthisi scrophulosa non minus egregiam expertus

tus est, qui, vbi effectum non adeo magnum esse cognouit, sequens medicamentum cum successu exhibuit; Rec. Veron. Virg. aur. a. mj. cicutae dr. iij. bulliant per semiquadrantem horae colat. lib. iß. fortiter expressae add. syrup. diacod. vnc. iß. Sumat omni trihorio vnc. ij.

Casus VI. Vir quadraginta annorum, vlceribus multis tumoribusque scrophulosis, ipsaque phthisi laborans, cicutae ope perfectam ferme sanitatem recuperauerat, ast nosocomium reliquit et appetitui nimirum indulgit, vnde in dysenteriam incidit, qua mortuus est. p. 25.

Casus VII. Miles bibax, cui arthriticis doloribus diu vexato summa tandem macies, tussis primo sicca, dein purulenta, dolor pectoris acerbus, pulsus celer et sudores nocturni superuenerunt; solo cicutae extracto conualuit.

Casus VIII. Iuuenis viginti annorum, ob frequentem nimis scalarum adscensum tussi sicca, respiratione difficili et anhelosa correptus cicutam adsumpsit, qua quidem leuatum, ast plenarie tamen malum profligatum non est. Id, quod tamen factum Noster refert, postquam quinque lapillos duritiei osseae, gypsum referentes, tussi aeger reiecit, vsumque cicutae continuauit. Arthritidem, podagram et achores infantum idem remedium propellit. p. 27.

Casus IX. X. Tineam, scabiem, quin ipsius quasi elephantiasis etiam speciem sola cicutae lotionem fugatas sistunt.

Casus XI. Sartori viginti et quatuor annorum, qui a scabie retropulsa insignem pectoris oppressiorem, difficilemque respirationem contraxerat, cicuta interne sumpta perfectam sanitatem reddidit.

Casus XII. XIII. XIV. plantae virtutem in vlceribus antiquis et fluore albo ostendunt, eiusdemque

efficaciam in vlceribus venereis, gonorrhoeis inueteratis, fistulis, sinubus et haemorrhoidum doloribus declarant.

P. 37. Casus XV. Vir, cui saepius haemorrhoides coecae, raro fluentes fuerant molestae, nouissime autem acerbi abdominis et crassorum intestinorum dolores superuenerant, ope cicutae interne, et in clysmatibus datae, sex dierum spatio conualuit. Cataractae progressus eodem medicamento quidem impedita, at vero perfecte curata a Nostro non est.

Casus XVI. Adolescentem decem et septem annorum, diu iam non modo nil appetentem, sed plurima etiam vomitu reiicientem, tumoreque in regione scrobiculi cordis magno, duroque stipatum, duorum mensium spatio curatum sistit. Duo etiam ieterici, tumorem in dextro hypochondrio offerentes, eiusdem remedii vsu sanitatem recuperarunt.

Casus XVII. Vir consistentis aetatis, qui per longum iam tempus ventriculi et abdominis dolores, inapperentiam, anxietates et stranguriam passus est, durioribus tumidioribusque hypochondriis, cicuta adsumta breui conualuit. In colica pictonum, si nullum cetera attulerunt solatium, cicuta certe, vt Noster confitetur, profuit.

XVII.

Dissertatio inauguralis de cicuta Auctore PRO-
I E C T. IOSEPH. EHRHART Redersheim.
Alf. A. M. Argentorati, typis Ion. Lorenzii
1763. 4. pl. 9.

Postquam Cl. Auctor etymologiam conii, varias
variorum, de cicutae in veterum scriptis signi-
ficatas, opiniones, synonyma atque diuisionem in
maio-

maiores, minores et aquaticas protulit, de genere plantae loquitur, cuius tres species ab Ill. LINNAEO recensitas in paragrapho quinta describit, in simulque iconem conii ROYENII L. quod nulla adhuc prodest, adiicit. Chemice plantam examinans, destillationis ope phlegma paulisper fatuum spiritu vrinoso foetum, multum olei nigri empyreumatici, paucaeque grana salis alcali volatilis obtinuit. Duplici dein modo et aquosum et spirituosum paravit extractum, ex quo ultimo resinam praecipitavit, cuius scrupulum sine noxa insequente ieiunus adsumpsit. Succus expressus, et sanguine vena fluenti admixtus, nullam plane in hoc produxit mutationem. Extractum modo Cl. STÖERKII paratum et scatulae inclusum, chartaque tectum, per quinque menses aeri liberiore expositum, immutatum prorsus permansit, nisi, quod undique spiculis salinis, frigidum quid linguae imprimantibus, in igne crepitantibus obtegeretur. Succus e radicibus iunioribus pressus et degustatus, leuem ardorem, nequam vero dolorem, multo minus inflammationem excitavit. Ex huius succi ulterius chemice tractati uncias septendecim cum dimidia, salis alcali fixi unciam unam cum scrupuli semisse Cl. Auctor obtinuit, a seminibus degustatis et deglutitis, aequae ac ab oleo ex his presso, oleum amygdalarum mentiente, saepius per guttas adsumto, nullam utique noxam expertus est.

Radicem ut summe quoddam acre, rodendo et inflammando, reliquas autem plantae partes in narcoticorum modum agere, ut probabile Noster adsumit, qui, postquam symptomata, adsumptionem cicutae insequentia, ex variis auctoribus collecta protulit, eiusque antidota atque usum externum docuit, ipsum internum praeis temporibus notum iam fuisse ostendit, varias cicutae partes ac praeparata

- rata recenset, et sic ad extractum Cl. STOERKII descendit. Illud autem in variis morbis maxime rebellibus potentissimum esse remedium, non tantum variorum auctorum, nomine iam cognitorum observationes, verum etiam non pauca cum eodem, a viris doctis atque quidem satis in arte claris instituta experimenta, et cum Nostro communicata, comprobant. Cl. nimirum D. GUERING vlcus cacoethicum, per quadraginta annos acri ichore madens, viginti dierum spatio sola pilularum de cicuta propinatione integre non tantum sanauit, sed et febrim quartanam saepius recrudescentem cum scirrhuso lienis tumore molestant in viro, leucophlegmatiam atque lienis tumorem in puero, obstructions abdominales in matrona ascitica, et tumorem in regione hypogastrica, ex valida passione iliaca ortum in milite, adeo feliciter huius remedii ope profligauit, vt vel omnes integerrima adhuc sanitate gaudeant. Cl. D.
- P. 59. EHRMANN in femina quadraginta annorum plurima incommoda menstruum fluxum praecedentia, iisdem pilulis fugauit. Cl. D. PARIS virgini febris intermittente, enormibus viscerum abdominalium obstructionibus, et abhinc oriunda anasarca asciti iuncta laboranti, aquis per congrua remedia educatis, obstructa viscera reserauit, perfectamque pilularum ope sanitatem reddidit, itemque in viro decies intra octodecim menses apoplexia correpto, nouum insultum auertit, soloque hoc remedio surditatem a febre inconsulte suppressa, in milite fugauit. Cl. D.
- P. 62. ISAAC OTTMANN pessimum parotidis cancrum apertum cicuta intus extusque adhibita penitus extirpauit, idemque malum mammam feminae dextram obsidens ita iam immutauit, vt breui perfecte aegram sanatum iri laeta spes affulgeat. Cl. D. LAUTH feminam cicutae ope a fluore albo benigno vterique carcinomate, adolescentem vero ab vlceribus

bus sinuosis pectoris post febrem pleuriticam natis liberauit. Ophthalmia pertinacissima a Cl. ZIEGENHAGEN extracti cicutae adsumptione subacta est. Ulcera cancrofa venerea glandis penem, partemque praeputii internam infestantia, spiritu Suientiano aliisque mercurialibus frustra exhibitis, cicuta sanauit. Ipse Cl. Auctor in obstructionibus abdominalibus, vomitionibus, morbum acutum insequentibus, obstructionibusque ab hydropse remanentibus, non minus efficacem remedii virtutem atque potentiam expertus est. Non aequae tamen felicem semper cicutae effectum esse, variae variorum in vltima paragrapho nominatorum, quin Nostri etiam obseruationes comprobant. Confiteatur enim Cl. Auctor, se varios vidisse morbos, in quibus cicuta nullum plane effectum ederet. p. 68.

XVIII.

Diff. med. Dubia cicutae vexata Praesid. 10 H.
HENR. LANGE Resp. *Ioh. Gottwerth Müller*, Hamb. Helmstadii 1764. 4. pl. 4.

Cum plures hactenus libellos egregiam cicutae virtutem illustrantes recensuerimus, non possumus non, vel et talem adducere, in quo tantum abest, vt proficius ipsius vsus collaudetur, vt potius pluribus difficultatibus non modo pressus, verum etiam vt suspectus, incongruus atque noxius reiiciatur. Postquam enim Cl. Auctor de minus prompta remedii operatione conquestus est, tutum ipsius vsum nequaquam ex eo aestimandum iudicat, quod non illico semper lethalem effectum producat, cum et inter venena multa sint, quibus ita sensim corpus aduefieri possit, vt omnem veneni indolem exuisse p. 9.

- exuisse videantur, quae tamen post longum demum temporis interuallum, ex quo ingesta fuerunt, suam nocendi potentiam, machinae humanae detrimentum pariendo, commonstrant. Iucunditati, cui p. 11. medicus consulere, ex praecepto ASCLEPIADIS tenetur, in nostro medicamento, tam graueolentia et gustus malignitas, quam ipsa plerorumque aegrotantium a pilulis auersatio contrariantur.
- Generalibus his praemissis, ad decantatae, in plurimis debellandis aegritudinibus, plantae virtutis examen Noster descendit, et primum, quid in venereis morbis possit, disquirat. In his, ut ex casibus a Cl. Auctore prolatis patet, ter profuit, quin- p. 12. quies autem frustra non modo adhibita fuit, sed et in vno alteroue subiecto tot mala intulit, ut ab eius propinatione abstinere et ad alia confugere remedia, necessitas exigeret. In arthritide laudabiles p. 18. nunquam, damnosos saepe effectus exseruit. In scabie externus vsus profuit, qui in capitis tinea id effecit, ut pediculi enecarentur, vnde inter anti- p. 20. pedicularia plantam referendam esse Noster existimat. In vlceribus quam plurimis, feminam nondum menstruatam excruciantibus, iuuamen non attulit, quin potius maiorem pruritum, acerbioresque do- p. 21. lores excitauit. Scorbuticorum nemini sanitatem, nec coecorum cuiquam dulcissimum visus sensum p. 26. reddidit. In quatuor aegris, scirrhis laborantibus, pilulae ad deperditae recuperationem sanitatis nihil, ad variorum vero malorum genesin nonnihil, contulerunt. Id quod fatum etiam femina, cuius mam- mam cancer apertus occupabat, experta est. Finem prius quam scriptiunculae imponit Cl. Auctor, ope- falis vrinosi in partes vrinarias cicutam agere, atque exinde in harum affectibus aliquid posse existimat. At vero quum vel alia utique tutiora, quae id efficiant, prostant, ad haec potius, quam ad remedium dubium et anceps confugiendum esse.

XIX.

ANTONII DE HAEN, S. C. R. A. Maieſtatis
Conſiliarii et Archiatri, nec non Medicinæ
in hac alma et antiquiſſima Vniuerſitate Pro-
feſſoris Primarii, Pars quinta rationis me-
dendi in noſocomio practico, quod in gra-
tiam et emolumentum medicinæ ſtudioſo-
rum condidit MARIA THERESIA, Augu-
ſtiſſima Romanorum Imperatrix, Hung. Bo-
hem. etc. Regina etc. Editio ſecunda Vien-
næ Auſtriæ, ſumptibus Hermanni Joſephi
Krüchten. MDCCLXIII. 8 mai. pl. 14 $\frac{1}{2}$.
Pars ſexta, ib. eod. pl. 20 $\frac{1}{2}$.

Librorum, qui ad nos pertinent, huc uſque edito-
rum copia factum quidem fuit, ut operis huius,
ad octauam uſque partem ab Ill. Auctore iam con-
tinuati, paulo ſerius, ac debebamus, continuatam
quoque epitomen lectoribus noſtris nunc tradamus:
has tamen binas indicatas partes, ante tres annos
iam editas, in præſenti perluftrabimus, de reliquis
quam proxime expoſituri.

Fodem modo, quo olim coeperat Cl. Auctor *),
ſuas de morbis captas obſervationes exhibere per-
git, ideoque *primo quintæ partis capite de febribus
cum exanthematibus, quæ petechiæ et miliaria vocari
ſolent*, agit. Ex prioribus æque huius libri parti-
bus, ac ſingulari, quem *de febribus* edidit **): com-
mentario conſtat, ipſum de modo dictis exanthe-
matibus hanc alere ſententiam, quod vix non ſemper
prauam ſequantur medendi methodum, neque vix
vm-

*) Comment. noſtr. Vol. IX. P. I. p. 85.

**) ibid. P. III. p. 463.

- vmquam critica haberi queant. Eundem igitur in finem septendecim historias aegrorum, exanthematibus istis correptorum, hic loci enarrat, interspersis, vt semper solet, de quolibet morbo iudiciis, indeque euincere conatur, exanthemata haec vel certe tantum symptomatica fuisse; licet per experientiam ipse nunc concedere coactus sit, interdum obuenisse, quae aut sponte, aut contagio, nata fuerint, principem tamen morbum haud leuarint, eo potius
- p. 3. simul acerbior factus. Itaque cum febris grauior esset, in quadam aegra quinto iam morbi die, petechiis cutem occupantibus, venam secare non reformidauit. Sanguis etiam missus crustam exhibuit rubra ipsius parte densiorem, et aegra nono morbi die per vrinam atque transpirationem prorsus iudicata visa fuit, petechiis haecenus persistentibus. Eadem vero aegra post octiduum, tenera carne vitulina vesci coepta, in eandem febrim relabente, alteroque noui huius morbi die miliaribus albis erumpentibus, sanguinem tamen bis Noster misit, densissimo corio tectum, exanthematibus inde non mutatis. Integra denuo morbi crisis sequi visa fuit, die a primo sui initio vicesimo septimo; biduo tamen elapso, tertia vice febris adorta fuit aegram, sanguine autem et nunc coriaceo bis iterum misso, die quarto et quinto prorsus tandem iudicata fuit, aluo, vrina, sudore, exanthematibus hac vice non
- p. 5. accedentibus. Ista vero, quae antea adfuerant, sponte fuerant oborta, misera nimirum aegra, in loco frigido frigidaque tempestate iacente, neque calidioribus remediis vsa. Morbi interim breuibus iam repetitam historiam cautos facere debere medicos Cl. Auctor recte monet in certitudine de morbo vere superato habendo, Contagio quidem suscipi et propagari posse petechias et miliaria, vidit,
- p. 11. aegros tamen non nisi praedispositos inde affici putat,

putat, simili modo, quo variolarum morbillorumque se habet contagium. In morbis malignis largiorem corticis peruuiani vsum in superioribus huius libri partibus iam commendauerat. Ex variis, quibus illum dedit, aegris vnam hic loci commemoremus, in qua purpura rubra nono morbi die retrogressa fuerat cum intermittente pulsu, quem aluus quidem crebrior cum morbi leuamine exceperat, insolita tamen permanente debilitate, quam vero cortex ille statim propinatus sustulit, paucis modo post reuultibus maculis. Virium hanc quidem prostrationem ab euanescente isto exanthemate ortam fuisse argitur Noster, istud tamen plane symptomaticum fuisse inde colligit, quoniam, vti in omnibus reliquis aegris similibus, crescente morbo ortum fuit, ipsumque deinde post quartum a retrocessione diem demum redierit, aliqua iam crisi per aluum facta, viribusque iam corticis ope prorsus redintegratis. Sub finem huius capitis aliquam horum aegrorum nit rationem asseritque, spatio sex cum dimidio annorum illos septendecim tantum in nosocomio pratico dicto petechiis aut miliaribus affectos fuisse, ex quibusque vnam partem antea iam, quam in illud delati fuerint, exanthematibus istis laborasse, ex omni- bus illis autem in duobus modo sponte natum fuisse exanthema, in reliquis autem vel contagium, vel reuersam medendi rationem, in causa fuisse.

Secundum caput observationes de hydrope et tympanitide continet. Iam olim in quarta huius operis parte contra Cl. MORAND aliosque chirurgos Galenos disputauerat, sententias eorum de hydrope cyclico dicto per latum abdominis vulnus sacculique consumptionem curando, impugnans. Variis nunc observationibus denuo comprobatur, illam medendi rationem vel difficilem et periculosam esse, vel quoque vix vquam locum habere posse. In quodam

- aegro totum omentum, in ingentem molem degenerans, omnem fere abdominis cauitatem impleuerat. A nimio per diem calidissimum continuato motu, subitoque vesperi ad ventrem admissio frigore potu-
que gelido hausto, omenti ventrisque pinguedinem antea fusam, deinde in talem massam irresolubilem abiisse, ex similitudine cum *Ruyschiana* quadam ob-
- p. 66. seruatione, suspicatur. Ipsam vero naturam interdum commemorata iam methodo monstrare viam, satis notabili casu probat feminae grauidae, in qua tumor ab umbilici dextro latere haerens neque adeo magnus visus, pus manifesto fluctuans exhibens, incidebatur, vulnere postea aliquoties dilatato, donec, omni tumore eiusque duritie euanescentibus, ipsum, post quatuor a partu edito menses sponte coiret. Paulo post aegra, denuo grauida facta, sequenti anno feliciter peperit.
- p. 70. In sequenti, quod *tertium* est, *capite* nonnulla de *hydrope pectoris* proponit, eumque morbum et cognitu et curatu difficillimum indagat. Postquam igitur HIPPOCRATIS aliorumque ex recentioribus medicorum opiniones de hoc morbo eiusque
- p. 88. curatione recensuit, de paracentesi tandem asserit experientia duce, plures aegros inde magis leuatos, quam integre curatos fuisse, illam tamen operationem cum imi ventris tum thoracis, reliquis auxiliis saepius praestantiorum esse; siue morbi causa prorsus tolli queat, siue ipsius tantum symptomata inde mitigentur; cum medicamenta non raro nihil vel parum agant viresque corporis infringant.
- p. 94. Quando autem per scarificationem morbum mitiorem reddere suscepit, ad auertendam gangraenam saturato corticis peruiani fotu usus fuit; quin et aliquando tam felici esse ipsi contigit, ut cancrum feminam hydrope, et ascite et intercute, simul laborantem, ab utroque hoc malo liberaret corticis peru-

peruiani vfu, quem tamen contra cancrum modo
 ipfi dederat. Egregie poſtea de ſignis hydropis pe- **p. 97.**
 toris diſputat morbique ideam atque decurſum ex
 obſeruatiombus delineat, quas in aegris eorumque
 deinde cadaueribus fecit, inter ſe collectis, licet de-
 nique concedat, ſubdolum omnino eſſe morbum, ab
 initio, dum curam admittere poſſet, difficillime co-
 gnoſcendum, ſique mature ſatis detegatur, paracen-
 ſi optime iuuandum, ſub ambiguo autem ipſius iu-
 dicio, diureticis, diaphoreticis purgantibusque re-
 mediis debellandum, cum ex eorum effectibus in-
 telligere breui poſſimus, morbus ille, an alius,
 abſit?

In quarto poſtea capite de epilepſia et conuulſioni- **p. 117.**
 bus diſſerit. Attentum eſſe iubet medicum ad ſym-
 tomata, quae vel aliquandiu, vel mox ante paro-
 xyſmum aggrediantur aegrum, vt, niſi cauſa proegu-
 mena tolli queat, vel certe procatareſtica auferatur,
 illa interim veluti ſopita permanente. Hoc modo
 miſeram talem aegram ſimul grauidam adeo iuuat
 dato repetitoque emetico, vt morbus per integrum
 ſaecennium ſileret. Ante paroxyſmum nauſeae, et
 illo vomitus, obſeruati fuerunt. Imminentes qui-
 em poſtea inſultus aegra interdum praefentiens, il-
 lis tamen miſturae ope ex tinctura ſalis ammoniaci,
 ſtorei, ſuccini et aſae foetidae paratae et cum vino
 ſumptae, penitus compeſcuit. Puerum ſexennem, **p. 121.**
 terrore in diriffimum huius morbi genus inciden-
 tem, poſt multa incaſſum data remedia, opio multa
 circumſpectione ante paroxyſmum dato, felici-
 ter ſanitati Noſter reſtituit. Aegrum ſomni potius,
 quam vigiliarum tempore morbo capi, ſomnumque
 terroſum ſoporem magis, quam ſomnum naturalem
 ſe animaduertens, opium dederat vt, neruos redderet
 ſenſiles, ne a cauſa morbi, licet ignota, irritarentur. **p. 127.**
 Poſt aliquod autem tempus alio morbo, dyſenteria, pe-

riit, in eiusque cadauere nodus durus neruo diaphragmatico in medio suo itinere arcte circumcretus aliisque similis illi, eius loco, vbi in diaphragma abiturus erat, cum thalamis opticorum emarcidis, inuentus fuit. Sub figem huius capitis valde dignos memoratu casus refert Ill. Auctor, de vafis scelestisque hominibus morbum istum simulantibus.

- p. 142. In capite quinto, quas de calculo, vna vrſi, lithontripticis diſtis, collegit obſeruaciones, tradere vltoriusque exponere nunc pergit. Herbae illius ſingulares contra calculi incommoda vires, olim iam, vti conſtat, plus ſimplici vice commendauerat, easque nunc continuato vſu comprobatas ſe vidiffe narrat perque recensita exempla aſſerit ita, vt morbus, vna vrſi non ſopitus, ſaepius quoque per lithotomiam curari non poſſit, vel veſica nimirum, vel vreteribus, vel ipsis renibus, ab indole naturali nimium iam recedentibus, quippe quod vitium, nec per calculi ſectionem, tolli
- p. 147. queat. Inter alia exemplum, ad hanc claſſem pertinens, adducit viri, iſto morbo extincti, in cuius cadauere magnos renes pure plenos, ampliſſimos vretes, adeo vt ſiniſter inteſtinum colon amplitudine ſuperaret, veſicam contractam et vlceroſam, cum calculo fere quatuor vnciarum, inuenit. Interim tamen accidere obſeruauit, vt vel nimis tarde agat vna vrſi, vel non ſatis, ita vt ſectio tum ſuadenda ſit, ne a calculo vrinofi ſyſtematis partes nimium degenerent laedanturque.
- p. 160. Aliquando etiam, poſt ſectum calculum, vulnere iam clauſo, illius remedii vſus et neceſſarius et proficuus fuit. Cum foetente vrina enim glutinis illius, quod calculum comitari ſolet, quin et puris copia inſignis exierat. De ramentis illis calculoſis ſaepius a talibus aegris cum vrina excretis monet, ne ſoluti calculi ramenta habeantur, quum nihil aliud videantur eſſe, quam corpora, a terreſtri glutinoſaque materie, quae calculoſorum
maſſa

massa sanguinea in genere inquinata sit, in vesica tantum orta et in hanc formam mutata; quum talia etiam sponte in matula concrefcere constet. Examinat deinde famosum illud remedium anglicum, Stephenianum dictum, quod nec satis efficax neque semper tutum esse putat. Aquam calcis etiam, cum p.181. aequali lactis copia, interdum contra calculum feliciter se adhibuisse perhibet; in genere tamen fateatur, remedia vere lithontriptica dari nulla; calcem tamen et potissimum vnam vrsi egregia nihilominus esse remedia, quum aeger inde a doloribus spasmisque aequè liber esse soleat, ac si nullum calculum gerat. Num eo forsan id, quod calculo applicatum dolores gignat, in humoribus, aut viis vrinariis obuium, dematur, absorbeatur? quaerit.

De aneurysmate olim quidem iam egerat Cl. Au- p.185.
tor, nunc autem *in sexto capite*, quod huius partis est vltimum, de eodem pergit exponere. In binis ante annum tum simplici compressione, tum operatione, curatis aegris constans permanfit curatio, praeter id, quod, tempestate mutata, de ingrata quadam, arteriam illam afficiente, titillatione conquerantur. Quam facile vel exercitatissimum chirurgum fallere possit aneurysma immo vero externum, binis casibus quam maxime memorabilibus confirmat Noster. In vno aneurysma ad poplitem ortum simulauerat abscessum, qui pure plenus et apertus purulentam materiem cum pauco sanguine eudit, post sextum vero diem, improuisa orta haemorrhagia lethali, aegro funestus fuit. In altero tu- p.193.
mor in sinistro thoracis latere, vbi cartilagine infimarum costarum prope sternum vniuntur, ortus fuerat durus non pulsans, in verum transiens abscessum, quo aperto et pure emisso, ingens subesse aneurysma, nunc demum eius signa docuerant. Clauso vulnere, tumor imminutus quidem, tamen vehementi pulsatione,

- p. 201. tione, quid subesset, satis docuit. Aliud arteriae popliteae aneurysma legimus, quod cruris super genu postulabat amputationem, exitiosum tamen sanguinis profluuium exceptam. Interna aneurysmata saepius in Austria obueniunt medicis, iterata venae sectione, copioso feri lactis usu cum nitro tartarique cremore combinato inprimis mitigata ab Ill. Auctore.

- Sexta huius operis pars septem absoluitur capitibus, quorum *primum de cardialgia chronica* inscribitur. Grauem hunc morbum diuidit Noster in *protopathicum et deuteropathicum*; illum, in quo ventriculus ipse cum pyloro in cauitate sua substantiaque afficitur, hunc vero, cuius causa aliis in locis haeret; ideoque longum variarum sedum causarumque catalogum recenset. Diuturnitas morbi eiusque pertinacia illum saepius quidem eam in sententiam adegerunt, ac si scirrhus aliqua in parte, igiturque morbus curationis expers esset, plures tamen eo affectos aegros sanitati restituit, BOERHAAVII consilium sequutus, secundum quod ventriculi regioni emplastrum de ladano vel diabotonon cum camphora, opio, balsomoque peruuiano diu imposuit; misturam porro ex aqua, spiritu, oleo atque syrupo menthae cum lapidibus cancerorum laudanoque liquido SYDENHAM-I paratam exhibuit, interpositis, si necessum visum fuerit, lenioribus purgantibus, aut si acidum redundaret, pilulis RUFFI, cum gummi ammoniaco copiosoque sapone veneto simul datis; tandemque electuarium ex cortice peruuiano, camphora, myrrha cum syrupo diacodii et menthae propinauit, exulantibus per curationis tempus lacte, caseo aceto vinisque acidis, obseruataque diaeta alcalescente. Quamuis autem multos aegros iam dicta methodo, per aliquod tempus continuata, ab hoc morbo liberauerit, alios tamen frequentes ipsi quo-

quoque obuénisse candide fatetur, quos curare non potuit, scirrhusa nimirum aliqua labe in ventriculo, pyloro, oesophago vicinaque aliqua parte praeexistente, nisi forte sub primum ipsius initium aduocatus fuerit, in quo lenissimis resoluentibus, longo potissimum mellis usu, nascens hoc malum posset tollere. Varias deinde eiusmodi enarrat obseruationes, ex quibus inter alia notatu digna id apparet, quod in eo casu, ubi causa vel in pyloro, vel pone illum haesit, ingestorum vix mutatorum vomitus crebrior in aliis adfuerit, in aliis autem minime; prius tamen phaenomenon frequentius occurrerit altero; et quod plurimis in cadaueribus ventriculus maxime distentus saepiusque e naturali situ dimotus, inuentus fuerit. Variant autem de amplitudine ventriculi aucta obseruationes: is enim illa modo sola, modo etiam crassitie, immutatus obuénit secantibus. Qua nunc argumenti similitudine commotus in illud doctrinae obstetriciae caput digreditur Cl. Auctor, num vterus grauidus crassior fiat, nec ne? singula-
rique enarrata obseruatione probat, suam illum crescendo haud amittere crassitiem. p. 13.

Secundum porro caput de vario hydrope ac tu- p. 36.
more abdominis recentiores Ill. Auctoris exhibet obseruationes, quarum prima refert de virgine triginta annorum, post febrim quartanam male curatam, tumore in sinistro hypochondrio, deinceps hydrope ascite affecta et praeter opinionem, magna puris copia ex pectore prorumpente, suffocata. In cadauere deinceps aperto tubam Fallopianam sinistram in tantum abiisse tumorem constitit, qui adhuc dum, postquam paulo ante mortem viginti quatuor librae liquoris non aquosi, sed gelatinosi, per paracentesin eductae fuerant, duodeviginti libras albi purulenti liquoris, et alius minor saccus in illo maiore inclusus quatuor libras fusci, tenuioris ac turbidi liquoris

- continebat, ipsa tubae substantia crassiore facta in-
- p. 40. tusque a pure erosa. Quum vero nulla praecessisset inflammatio, puris tamen tanta copia non in hac tuba solum, sed pulmonibus quoque ad efficiendam vsque suffocationem adfuerit, suam olim in secunda huius operis parte prolatam sententiam de naturali quadam humorum diathesi inflammatoria, ideoque spontanea puris generatione, inde confirmari, Ill.
- p. 43. Auctor existimat. In alio huic simili exemplo vtraque tuba tumefacta erat, omnibus generationi inferuientibus partibus ab indole naturali valde alienis factis. Cuius aegrae atretae occasione aliud talis virginis exemplum additur valde memorabile, ex quo illud tantum notamus, quod FABRICII AB AQUAPENDENTE consilium, hymenem recta ea-
- p. 60. que vnica sectione aperiendi, recte taxetur. Quam incerta saepe sint morborum signa diagnostica, aliis exemplis Noster probat, in quibus hepatis et lienis viscera, quoad molem suam nimium aucta, hydropes cysticos interdum simulauerint, interdum quoque asciten effecerint. Sub finem huius tandem capitis casum omnino memoria dignum tumoris cystici, in abdomine orti et in suppurationem transeuntis, fuse describit suamque de puris ortu opinionem eo ulterius firmare annititur.
- p. 75. Aliud nonum, quod huius partis *tertium* est, *caput de hydrope pectoris* exponit. Ex nimio haemorrhoidum fluere vir triginta annorum, olim melancholicus, in tussim siccam et molestam, asciten pectorisque hydropem inciderat, tympanitide simul laborare visus, quum abdomen expansum, si percuteretur, sonum ederet, id, quod tamen ab omento in oblonga et inaequalia tubera degenerante ideoque peritonaeo ad intestina satis se applicare impedito, intestinisque in vacua ibi facta spatia intransibibus, prouenire visum fuit. Prae aliis notari meretur, quod

quod totum corpus sanguine vacuum deprehensum fuerit, corde tantum sanguine grumoso pleno paucoque sanguine ad principia maiorum vasorum reperto. Pulmones quoque, licet duris et quasi cartilagineis tuberculis atque pure intra illa pleni, tamen nullibi pleurae accreti erant. Alius aeger, olim calculosus, ab illo tempore, quo remedio quodam usus, a calculi cruciatibus liber fuerat, nunc de pectoris anxietate, tussi molesta, cum aliquo cruoris sputo et tumore pedum, coepit conqueri. Ea autem, quod ex praecipuis hydropis pectoris signis esse iudicatur, anxietas nimirum, a primo capto somno iam aegros aggredi solita, ita ut lectum euitaturi in sedili sese collocent, in hoc quidem aegro etiam ab initio morbi praesens, in ultimis tamen quatuordecim vitae diebus eum deseruerat, ut placido somno frui posset, iisdem vero anxietatibus nocturnis nunc in diurnas immutatis, aegrumque vel in sedili positum inuadentibus. In alius etiam aegri, phthisi pulmonali extincti, cadauere insignis quoque hydrops pectoris inuentus fuit, qui antea, ab isto quasi inuolutus et absconditus, non detectus fuerat; ita, ut quam fallacia saepe sint morborum signa, ex utraque hac historia appareat.

Quartum, quod sequitur, *caput problemata et difficultates* exhibet. Quum mirabilia omnisque ad cognititas humanae vitae leges explicationis expertia Ill. Auctor referat, recte ab initio monet, quam necesse sit, ut cognitionis nostrae arctis limitibus circumscriptae memores, praepotentem vitae auctorem demissime veneremur. Aliqua tantum breuibus inde repetere, recensiois limites iubent. Feminae quinque et sexaginta annorum infeliciter, loco venae, inciditur arteria humeralis, ortum autem inde aneurysma prudenti tollitur operatione. Exiguum sequitur sanguinis profluuium et febris al-

tero die insurgens modica venae sectione compescitur, aegra tamen, horis quadraginta una ab operatione elapsis, subito expirat, ab vncis duabus sanguinis in basi cranii effusis inque cadauere inuentis, nulla alia mortis causa reperiunda. Quamuis autem fortis atque durus pulsus paulo adhuc ante mortem in utroque brachio deprehensus fuisset, omnia tamen corporis vasa, et arteriae et venae, omni
p.111. prorsus sanguine vacua erant. Simile porro, sed longe mirabilius exemplum legimus hominis arthritici, pulsus semper fortem durumque tangenti digito offerentis, nullas euacuationes passi, naturalium potius, ut sudoris, urinae, alui, ultimis vitae diebus, plenarium experti defectum, in cuius tamen cadauere omnia vasa quin et maiora ampla quidem, sed flaccida, *nihil, quam filum, siue chordam tenuem, albam, polyposam, crassitudine inaequalem et in maxima sua diametro vix sesqui lineae, gerentia, immo vero cor ipsum crassum, pallidum, vacuum, habens tantummodo dextra in auricula sinuque quid polyposi et in sinu sinistro pauculum grum si cruoris, inuenta fuerunt.* Vtraque pectoris cauitas nullum quoque sanguinem, sed multam aquam continuit.
p.161. Vnicam adhuc modo ex hoc capite adducamus observationem, quae, nisi de Ill. Auctoris fide atque candore satis constaret, vix ac ne vix quidem credi posse videretur. Iuuenis nimirum vnde viginti annorum in nosocomium delatus, debilis, dolorem lateris dextri, respirationem difficilem, tussim frequentem, sitim, aluique obstructionem cum pulsu celeri debilique passus, post quinque septimanas anxietate ingenti correptus eiusque hora duodecima extinguebatur. Cadauere aperto, omentum vel nullum, vel dubia eius vestigia aderant; intestinorum autem omnium externam tunicam in toto ipsorum ambitu a reliquis ita secessisse videbant secantes, vt,

vt, vno in loco percissa hac tunica extima, digito sub illa possent perambulare circum totum intestinum, ipsiusque intestini ex hac vagina educti portionem attrahentes, euaginare omnino intestina ex sua tunica externa, sine vel minima laceratione. In eandem quoque tunicam mesenterium et mesocolon abierat, vt vnā referret membranā. Ea sententia anatomicorum confirmari inde visa, quod externam intestini tunicam largiatur mesenterium et mesocolon; et quod ab hac tunica nascantur coli ligamenta: haec enim manserant in illa euaginata.

Quum calculosus morbus in Austria endemius p.171. esse soleat, crebrior etiam inde Nostro datur occasio et symptomata eius, et optimum ei medendi modum, obseruandi, quare *quintum caput* denuo de calculo vesicae urinae et lithotomia agit. Quamuis vuae vrsi et aquae calcis cum sapone vires saepius egregias expertus fuisset Cl. Auctor, calculum tamen semper remanere intelligens, varios aegros isto malo laborantes dexterrimo Regiae Principis Lotharingiae chirurgus, Cl. CAMBON, qui per aliquod tempus Viennae commorabatur, tradidit, vt iis calculum secaret ad methodum *fratris COSMI*, sub cuius auspiciis iam olim Parisiis hanc operationem ipse frequentius praestiterat, Feliciter is quoque secuit sex aegros, et alios quinque Cl. LEBER, Professor Chirurgiae Viennensis admodum clarus, ex quibus vnus tantum, puer quinquennis, nec ab operationis vi, sed, vti videtur, a scirrhusa glandularum viscerumque imi ventris labe, post sexaginta dies periit; reliqui autem omnes perfectae sanitati restituti fuerunt. Fusius itaque et operationis modum cum cautelis necessariis, et historias illorum aegrorum, recenset, illamque methodum eximiis laudibus extollens, omnibus reliquis praefert. Licet autem felicem, quem is enarrat, curationis exitum negare noli-

nolimus, chirurgorum potius illorum dexteritatem miremur, nostram tamen adhucdum mittere non possumus sententiam, quod cultri lithotomi occulti seu absconditi dicti vsus non ideo nobis tutus et certus esse, videatur, ac alius communis, chirurgi tantum manu in specillo fulcato dirigendi. Vtilia tandem addit Noster corollaria, nostris tamen limitibus, quae repetantur, ampliora.

- p.239. *Sextum caput de cranii vstione in pertinacioribus capitis vitiis* Cl. Auctoris et cogitata et obseruata continet. Plurimum ab initio tum veterum, cum recentiorum, auctorum de hac medendi ratione sententias is recenset, binosque addit casus aegrorum, in quibus ista fuit adhibita, sed infausto euentu. Quum enim a tot tantaeque famae viris ferri candentis vsum non innoxium solum, sed egregii etiam effectus esse legisset, in adolescente duodecim annorum rustico, robusto, amaurosi affecto, illud tentabat, cranio antea denudato, sed aeger non solum inde non leuabatur, sed quarto etiam die, sine vllis praegressis malis symptomatibus, inopinata morte exstinguebatur. Instituta anatome docebat, cranium leuiter modo tactum fuisse igne; internum istud tamen leuiter fissum, meninges inflammatae, et dura mater ea parte, qua vsum locum respiciebat, suppurari iam incipiens, cerebrum autem integerrimum, nec vllae in ipso aut oculorum neruis amauroseos causae, apparebant. Ventriculus insuper, praeter pylori regionem, valde inflammatus et duobus in locis gangraenosus, pulmones autem vndique vehementer accreti erant; neque in pulsu tamen, nec in respiratione, dum viueret aeger, vel minimum morbi signum obseruatum antea fuerat, sesqui hora ante mortem tantum excepta, qua is in vomitum olim iam ipsi familiarem inciderat, superueniente roncho subitaque
- p.264. morte. Funestus iste, vti alius quoque similis in vir-

virgine viginti annorum obseruatus, illius operationis effectus, vti et experimenta in multis aliis cadauerum craniis cum cauterio facta, tentamen hoc periculosissimum, neque vix vniquam admittendum esse, Nostrum docuerunt.

Septimum denique, quod huius partis vltimum p.287. est, *caput de peculiari quorundam medicamentorum virtute* agit. Aegro cuidam calculoso, plures minores calculos per vrethram interdum excernenti, illud datur consilium, vt per longius aliquod tempus, deinde, solamine inde percepto, quater per annum quatuordecim dierum spatio, infusum herbae ononidis, ex ipsius pugillo cum semilibra aquae pauxillum cocto, quouis mane bibat. Consilio huic parens prorsus liberatur a calculi cruciatibus, nec in eius alio postea morbo extincti corpore diathesis calculosae signa reperiuntur, praeter renem dextrum quadruplo maiorem atque sinistram quadruplo minorem. Alium aegrum iuuit quidem, sed non curauit, raphani hortensis rasi et cum oleo oliuarum misti, semicochleare quotidie assumtum. Verbenae p.292. communis flore coeruleo herba collo appensa et eiusdem aqua stillatitia ad vncias quatuor cum spiritus vitrioli guttulis quatuor per diem data, cephalaeam idiopathicam visam valde pertinacem, et contra alia adhibita remedia rebellem, ab initio leuiorem reddidit deinceps, ipsius spiritui mixtura ex spiritu frumenti cum mercurio sublimato substituta, continuato vsu sustulit. De foliis aurantiorum tandem differit p.305. Cl. Auctor. Ab amico quodam, Cl. WESTERHOFF, Poliatro Hagano, remedium acceperat ab inuentore primo arcanum habitum, vt experiretur, num conuulsiones tolleretur? Quum eo tempore eximias illius vires testaretur experientia, Viennam venit Cl. WINCEL, chirurgus in curandis oculorum morbis famigeratissimus, qui, huius tentaminis famam percipiens,

cipiens, Nostro persuasit, arcanum illud non nisi
 folia aurantiorum continere, cum decocti sub forma
 cum potu chocoladae dicto, tum in puluere simili
 potui admiscendum, vtiliter exhibenda. Alius quo-
 p.310. que medicus et poliater Hagenus, Cl. VELSE, hanc
 decocti illius formam cum Cl. Auctore communica-
 uit. Rec. *Fol. aurantiorum numero centum et viginti*
(id est circiter unciam unam et drachmas sex) in aquae
pluvialis unciis viginti decoque spatio duarum vel trium
horarum, vase clauso; colato adde vini rubri uncias de-
cem, sacchari quantum sufficit ad gratiam. Sumat
aeger bis, ter, quater, prout necessitas iubet, uncias tres,
quatuor quotidie, aut solas aut mistas cum levi chocolada.
 Decocti huius quidem vires egregias Noster exper-
 tus, certas tamen illas in primis contra epilepsiam
 aequae, ac verbenae, paulo antea commemoratas, non-
 dum adhuc determinare audent, sed prudenti alio-
 rum medicorum observationi atque examini hanc et
 alias nuperrime factas observationes multo cum can-
 p.314. dore et honestatis ac veritatis sensu relinquit.

XX.

Flora Virginica, exhibens plantas, quas D. D.
 IOHANNES CLAYTONUS in Virginia cre-
 scentes observavit, collegit et obtulit D.
 IOH. FRED. GRONOVIO cuius studio et
 opera descriptae et in ordinem sexualem sy-
 stematicum redactae sistuntur. Lugd. Bat.
 1762. 4 mai. Alph. I. pl. 1½. c. mappa
 geograph.

Plantarum, a Cl. CLAYTONO in Virginia lecta-
 rum, sicca specimina accepisse IOH. FRED.
 GRONOVIIUM, eosdemque examinasse, rariorum
 chara-

characteres indagasse, et methodo sexuali disposuisse, ex Flora Virginica duabus in partibus an. 1743 edita, compertum habemus. Cum vero in iisdem non omnes Virginiae stirpes notatae essent, atque CLAYTONUS indefesso studio in colligendis hisce continuauerit, ex eius donis tertiam quidem partem parauerit, eidemque appendicem, aliorum botanicorum, vt COLDENII, MITCHELII, in plantas Virginicas obseruata, continentem, addiderat GRONOVIVS, attamen desiderio botanicorum incitatus, vt defectu exemplarium priorum partium permotus, nouam potius editionem edendam curauit, aliis autem negotiis nimis occupatus, huius in lucem mittendae curam filio, LAURENTIO THEODORO, commisit. Eadem itaque methodo, quae in priore editione habita fuit, recensentur omnes, a CLAYTONO transmissae plantae, atque nouiter obseruatae suis locis inseruntur prioribus, eaedemque non solum nominantur, ac, si necesse visum fuit, describuntur, sed etiam in prima editione enarratae plantae saepius illustrantur magis atque curatius determinantur; vt hinc botanicis grata omnino ac vtilissima existat altera huius Florae editio. Comparauimus hanc ac priorem, et plurimas, in priori non recensitas, inuenimus stirpes; verum nimis prolixum foret, eas nunc omnes annotare, earumque nomina transcribere, patebit disquirenti circiter centum nouas accessisse; neque commode eas repetere possumus emendationes, quibus species verius constituuntur ac ad alia genera amandantur; e. gr. dum *Ruellia* edit. prior. p. 73 et *Lyfimachia* p. 5 ad *Gratiolam* edit. nou. p. 3. *Vniola* p. 136 ad *Brizam* p. 13. *Mollugo* p. 14 ad *Queriam* p. 16. *Capraria* p. 75 ad *Lecheam* p. 16. *Arum* p. 113 ad *Orontium* p. 53. *Paris* p. 44 et 157 ad *Trillium* p. 56. *Thymelaea* p. 155 ad *Dircam* p. 60 *Azalea* et An-

et *Andromeda* p. 21 et 160, ad *Kalmiam* p. 65. *Verbena* p. 7 ad *Phrynam* p. 92 et f. p. reducuntur. Minus quoque vtile esset, annotare plantas, quarum synonyma et accuratiora et plura nunc proponuntur, vel quarum descriptiones, in priori editione datae, nunc omittuntur, vt de *Chionantho* p. 130. *Dianthera* p. 6 *Cortusa* p. 74 edit. prim. aliisque cognoscimus. Sufficiat nobis, cum in compendio reliqua recenseri non possint, aliquas obseruationes botanicas legere, medicamque subnectere.

- p. 52. *Ornithogalum*, a LINNAEO Spec. edit. I. p. 306 *hirsutum* *) dictum, in edit. II. p. 439. ad nouum genus, *Hypaxis* scil. relatum, simillimum esse *Ornithogalo luteo* C. B. atque differre tantum hirsutiae et pilis in foliis, caule, umbella, florumque basi, quae externe tomentosa est, monuit Cl. Auctor. *Ranunculi bulbosi*, in Virginia nati, folia quidem minora sunt et magis hirsuta, ast calices vt in Europaeo, re-
p. 86. flexi, et pedunculi sulcati. *Nepeta Virginica*, facie et habitu *Clinopodium* refert, hinc etiam in H. Cliff. et prima edit. huc relata, labio autem inferiore crenato, et staminibus flore longioribus magis ad *Nepetam* accedit. *Lupinus perennis* a *sylvestri flore coeruleo* C. B. differt constanter calice, destituitur enim appendiculis seu foliolis minimis lateralibus;
p. 105. quibus hic instruitur. Ex *Aristolochia serpentaria* tres species finxisse PLUKNETIUM legimus, *Aristolochia* namque *violae fruticosae foliis* nouella planta est, opacis et umbrosis succrescens, foliis acutioribus vix auriculatis praedita, eadem, apricorum collium incola, folia gerit latiora, perfecte auriculata, *Aristolochia polyrhizos auriculatis foliis* ab Eodem dicta,

*) Breuitatis causa triuiale nomen in enumeratione plantarum ex LINNAEO citauimus, licet in ipsa Flora eiusmodi non fuerint adposita.

dicta, et *Pistochia caule nodoso* ab his differt vt culta planta ab inculta, caulis namque semper est tortuosus et geniculatus, in solo autem laetiore minus tortuosus existit, atque genicula in maiores nodulos transeunt, talis est icon CATESBEII, sylvestrem parum exprimens plantam. *Morus rubra* ab aliis speciebus differt, iulis siue amentis cylindraceis crassitie pennae anserinae, duos transversos digitos longis, foliaque sunt cordata, acuminata, ferrata, subtus tomentosa, prima integra, reliqua valde diuisa. *Iu glandis* noua species amenta rancida, et sub singulo flosculo bracteam subulatam, flosculo multoties longiorem, gerit. *Napaeae* nominis deriuationem hic quoque legimus, dicitur scilicet a *Νάπη*, saltu vel valli, quia in alpium vallibus, vbi primo inuenta fuit, insigniter viget; namque et nymphae poetarum, quae talibus lucis praeerant, *Napaeae* dictae fuerunt.

Notent tandem medici, *Symphoricarpi* DILL. p. 30. haud bene, vt examen florentis plantae nos docuit, ad *Loniceram* relati, radicem, in puluerem comminutam, mediocri dosi, aduersus omnes febres intermittentes tutum, certum, et minime fallax esse ex obseruatione CLAYTONI remedium; et cum fruticosa haec planta facile in aere liberiori, vt experti scimus, apud nos crescat perduretque, tentandum, an culta eandem virtutem possideat.

XXI.

Gli Atti dell' Accademia delle scienze di Siena detta de Fisiocritici dell' anno 1760. Tom. I. in Siena. Appresso il Bonetti nella stamperia del' pubblico 1761. 4 mai. Alph. I. pl. 4.

Tom. XII. Pars I.

K

h. e.

Acta Academiae scientiarum Senensis Physico-
criticorum, ad an. 1760. Tom. I.

Academia scientiarum Senensis iam anno nonagesimo primo superioris seculi instituta, et ab eo tempore variis praestantissimis sociis ornata et aucta fuit, nullis tamen inuentis et editis scriptis adhuc inclaruit, cum, si sola gloria remuneratio laborum est, optimi saepe conatus frigescent. Anno demum sexagesimo huius seculi, quo et ex sua parte aliquid ad communem vtilitatem conferret, de edendis observationibus, tentaminibus et inuentis cogitauit. Cum vero varia hunc in finem collecta scripta a nonnullis sociis seligenda et ordinanda essent, eorundem editionem differre, et interea historiam insitionis variolarum eiusque successum in vrbe senensi, in hoc primo tomo tradere constituit Academia, quo ea, de quibus hic exponitur, cum observationibus ab aliis collectis conferri possint. Cum vero et ratione et experientia res physico-medicae confirmentur, et experientia primum nos instruat, indeque ad rationem ducat, hanc quoque methodum in disquirenda inoculationis vtilitate academia elegit, inprimis cum haud pauca instituta fuerint experimenta.

Primam occasionem tentaminibus instituendis 1755 mense octobri exhibuit Ill. HIERONYMUS PANNILINI, Rector nosodochii S. Mariae de scala, vbi tres tantum infantes insitione ad morbum variolosum ducti fuerunt, quem cum feliciter superassent, sequenti anno quatuordecim pueri et puellae, aetatis inter quintum et decimum quartum mediae, simili ratione insitionem variolarum subierunt, ex quibus tantum puer septem annorum, qui post eruptionem vario-

variolarum bonae notae, febre erisypelacea tentatus, inflammatione pulmonum succedente, die quarto obiit. Eo ipso vero tempore naturalibus variolis septem infantes affecti fuerunt, ex quibus duo perierunt, puer scilicet sex annorum ante eruptionem variolarum inflammatione superueniente, et puella octo annorum quadragesimo morbi die hydrope percussite et superueniente dysenteria.

In hoc tomo itaque traduntur observationes Cl. CALURI, qui inter Senenses medicinam cum laude exercet, ideoque inoculationem saepius suscepit, et successus rationem cum academia communicavit; exhibentur porro duae Cl. BASTIANI et una Cl. PEROTTI inoculationis historiae; has excipit relatio inoculationis variolarum in septendecim pueris et octo puellis in regio nosodochio S. Mariae de scala anno 1760 susceptae, a Cl. CASTELLUCCI tradita; tandem subnectitur sermo Cl. TABARRANI de morbo quodam varioloso die 25 Julii 1761 in academia propositus, in quo nonnulla de insitione variolarum adduntur.

Nos vero rationem insitionis eiusque successum, quae in quadraginta septem morborum historiis declaratur, in compendio tradere annitemur. Elegerunt vero ad inoculationem pueros et puellas variae aetatis, ultra decimum septimum annum nullum invenimus, in iis tamen fuit infans trium mensium, lacte nutricis adhuc nutritus. Praeparatio saepe nulla instituta fuit, in nonnullis venaesectio, in multis blanda alui ductione praemissa, in paucis balneis et usu feri lactis caprilli, corpora ad febrem variolosam melius subeundam disposita fuerunt. Vino et diaeta carnea omnes interdicebantur, victusque vegetabilis modice adhibebatur. Incisiones parvae minus profundae saepe in brachio utroque paulo supra flexum subiti, in nonnullis in femore supra genua admini-

stratae fuerunt. His fila gossypina pure varioloso infecta, interdum pulvis variolarum siccus, interdum crustae integrae variolosae applicabantur, interdum acu punctura tantum, cuspide acus simili modo infecta, insitio absoluebatur, quo in casu tamen hanc iterato institui debuisse apparuit. Pus quidem ex variolis discretis bonae notae naturalibus praecipue eligebatur, nonnunquam tamen ex variolis per insitionem excitatis.

Leuiores quidem morbi symptomata die iam quarto, quinto et sexto oriebantur, et pustulae parvae circa locum insitionis frequentius et citius exsurgebant, rarissime nullae. Symptomatibus febrilibus auctis, nono potissimum die, sparsim in corpore pustulae obseruabantur, rarius iam quinto die, nonnunquam etiam tardius, decimo et vndecimo. Vidimus vero in viginti obseruationibus Cl. CALURI hanc varietatem, maiorem vero tarditatem in obseruationibus viginti quinque Cl. CASTELLUCCI, in nosodochio institutis. Symptomata febrilia vel in principio oborta, vel paulo post aucta, varia erant: Dolores vagi lancinantes sub alis in humeris ad lumbos etc. oriebantur lucem non ferre poterant aegri, rarius oculi lacrymosi, rarissime inflammati; aegri saepius somnolenti erant, nonnunquam vertiginosi; rarius fauces siccae et grauiora symptomata, vt deliria, accedebant; sudor interdum exiguus, interdum nullus, vrina saepe cruda aut naturali simillima, saepe tamen cum sedimento albo, interdum pallida, interdum lactescens; pulsus tandem, fitis et cephalalgia pro ratione febris vel aucta vel mitiora erant, febris vero secundaria rarissime accessit. Ex locis incisis et contagio varioloso affectis, indeque inflammatis tandem materia saniosa vel purulenta effluebat, foetore saepe molesta, nonnunquam vlcera profunda oriebantur, quae diu durabant, post morbum tamen superatum vix foeti-

foetidam materiem exhibebant, exorta etiam fuit rarissimo exemplo inflammatio brachii vniuersi cum pustulis serosis, sanatio nihilo tamen minus tandem successit. Finis morbi raro ultra vigesimum, in lentiori vero variolarum eruptione ultra trigesimum interdum diem producebatur. Ex omnibus vnus tantum aeger mortuus est, cuius rei rationem infra explicabimus, reliqui, paucis variolis affecti, sine cicatricibus aliisque vitae incommodis, morbum artificialem superarunt.

Generali hac relatione praemissa, nunc nonnulla sparsim selecta adducamus. Anno quinquagesimo octauo huius seculi epidemia variolosa in vrbe et agro Senensi grassabatur, incipiebat illa in solstitio hyberno, discretis variolis, quae tamen aestate subsequente malignae et confluentes erant, et successive per varias vrbis partes progrediebantur. Inter vndecimum et decimum quartum diem multi moriebantur, pauci tempore eruptionis, nonnulli vicesimo et vicesimo quarto demum die. Et ii, qui euaserant aegri, vitiis oculorum, vlceribus et tumoribus in variis corporis partibus excruciabantur, nonnulli demum, lenta tabe consumti, perierunt. Hieme sequenti variolosa epidemia prorsus cessauit, et ex vrbe in vicinas terras translata fuit.

Ex variolis spuriiis veras et persistentes cicatrices p. 13.
relictas fuisse, obseruauit Cl. CALURI in puella novem annorum, haec postea, insitione facta, progressum febris variolosae optime sustinuit, et quindecim circiter variolas in tota corporis superficie ostendit.

Puella quintum annum agens, post insitionem p. 62.
multas pustulas albas in variis corporis partibus ostendit, quae breui iterum disparuerunt, vna sola magna variola, ad nates oborta, consuetas variolarum mutationes referebat.

Traditur obseruatio de insitione variolarum a p. 72.
rustica gente iam anno quinquagesimo sexto per acu-

puncturam facta, in villa quadam Casenovole dicta, quae ex voto successit, et paucas discretas variolas sine symptomatibus malignis excitavit.

p. 85. Inter eos, qui in nosodochio inoculati fuerunt, puer erat, quatuor annorum et sex mensium scabie affectus, qui scabie apta medendi ratione vix dissipata, incisionem et applicationem materiae variolosae sine omni incommodo tulit, et variolis discretis dissipatis, etiam a scabie liber redditus fuit.

p. 92. In alio autem puero sex annorum scabie simili modo infecto, insitio quoque tentata fuit, variolae erumpentes nullum incommodum reliquerunt, scabies vero iterum accessit.

p. 94. In puero duodecim annorum post insitionem apte administratam febris quidem commota fuit, sed non nisi vna variola incisioni proxima die decimo exorta, veram speciem retulit, et licet aliae pustulae parvae in facie praecipue orirentur, hae tamen paulo

p. 101. post sine maturatione euanuerunt. Simile quid accidit in puero undecim annorum, qui licet a sexto ad decimum diem symptomatibus febrilibus ageretur, veras tamen variolas non monstravit, sed non

p. 111. nisi serosae quaedam pustulae apparuerunt. In puero quoque, sex circiter annorum, febris accessit, quam multae pustulae subsequiebantur. Febris vero duplex erat: prima nempe a septimo ad decimum diem non adeo malignis stipata erat symptomatibus, altera vero, quae decimo septimo die accedebat, longe vehementiora symptomata coniuncta habebat, oleo tamen amygdalarum dulcium cum iulapio violarum dato, deiectiones aluinae biliosae sequebantur, ex quibus apparet, eandem non tantum a variolosa materia, sed a saburra intestinali mota obortam fuisse.

p. 109. Puer, septem annorum, post insitionem dextre administratam variolas bis expertus est. Decimo enim die post applicationem materiae variolosae, febris

bris consuetis symptomatibus stipata oboriebatur, variolae paucae surgebant, usque ad diem decimum septimum consueta ratione mutatae, ita ut die vicesimo quinto bene se haberet aeger. Non tamen dimitti poterat, cum eodem die noua febris accederet, et interea vermes vomitu reiicerentur, dato oleo amygdalarum dulcium deiectiones aluinae succedebant. Tertio die a noua febris accessione nouae iterum pustulae variolosae oriebantur, quibus consueta ratione mutatis, puer iterum conualuit, ita ut decimo septimo die dimitti posset. In alio puero p. 118. quatuor annorum variolis artificialibus excitatis, et die vigesimo octauo plenarie superatis, noua oriebatur febris, cuius impetu tandem trigesimo primo die roseolae efflorescebant. Sed et hae sine vltiori noxa transierunt, ita ut trigesimo septimo die cum sanitate in gratiam rediret aeger.

Duplex quoque insitio necessaria fuit in puero, p. 120. octo annorum, qui in brachiis incisionem et filum gossypinum exceperat, nulla tamen febre nec alio symptomate usque ad diem decimum septimum subsequente, quamobrem noua insitione super genua facta, quarto demum die pulsus frequentior, et paulo post alia symptomata, immo deliria ipsa, obseruabantur, quae venaesectione, die septimo instituta, temperanda erant, quo facto et febre nunc mitius progrediente, non tantum circa incisionem, quae suppuratione conspicua erat, sed et in aliis corporis partibus, variolae efflorescebant, quarum mutatio ex voto succedebat. Die tamen decimo tertio, post noctem minus tranquillam, febris cum dolore ventris intendebatur, tragea vero ex femine santonici exhibita et clysteribus applicatis, quinque lumbrici excernebantur, quo facto morbus ex voto finiebatur. Simili ratione p. 126. puer, quartum annum agens, morbo superato, die vicesimo quinto iam ex nosodochio dimissus eo post

aliquot dies reuertebatur, symptomata tamen febrilia denuo mota, vermibus expulsis, cessabant.

p.150. Puella, octo annorum et sex mensium, post insitionem febrim exiguam, incisionis inflammationes moderatas, et paucas pustulas serosas circa easdem habebat. Die vicesimo quinto demum parua variola in labio superiori efflorescebat, quae tamen die sequenti iterum euauuit, hinc die decimo septimo noua incisione facta filum gossypinum, pure ex infitis variolis recens collecto, imbutum, sed sine

p.153. omni effectu applicatum fuit. Similiratione puella, decem annorum, post insitionem non nisi moderata febre commouebatur, nec pustulae oriebantur praeter paucas serosas circa incisionem, die decimo igitur acupunctura noua materia applicabatur, sed sine omni effectu.

p.160. Puella, nouem circiter annorum, quae ex prima insitione exigua febre commota fuerat, incisionibus inflammatis et suppuratis, paucisque vesiculis circa illas enatis, die decimo septimo iterum acupunctura variolosa affecta, vicesimo quinto et sexto demum die septendecim circiter pustulis sparsim abortis progressum morbi ex voto superauit.

p.126. Subiiciamus nunc vnicam morbi historiam, quae minus prospere successit. Puer, nimirum septimum annum agens, incisionibus consuetis, in brachio applicatis pus excipiebat, parum tamen commouebatur, et licet die septimo parua pustula in mento effloresceret, illa tamen die sequenti disparuit. Die nono et decimo aeger minus quietus erat et die vndecimo cutis rubicunda et facies quasi incensa apparebat, febris tamen exigua et leuissimis symptomatibus stipata obseruabatur. Interea tamen a decimo quarto ad decimum sextum diem non quidem confluentes, attamen copiosae et maxime depressae variolae oriebantur. Nausea et dolores ventris maxime

ime excruciant aegrum, qui ideo vix non semper et alimenta et medicamenta respuebat, et licet interdum per vomitum, interdum per deiectiones alvinas lumbrici et ascarides euacuarentur, licet melendi methodus, huic indicationi respondens, eligeretur, licet tandem et variolae tardissime ad maturationem et exsiccationem ducerentur, maxime tamen debilitatus aeger die quadragesimo quinto morbi vitam cum morte permutabat. Sectione cadaueris p.135. facta, abdomen sero foetente repletum erat, in ventriculo materia flaua et foetens, in canali intestinorum vero lumbrici copiosissimi reperiiebantur; ilei pars contracta, et ad sex digitorum longitudinem imaginata, superius vero maxime extensa erat; pulmo inflammatus et ex parte iam suppuratus conspiciatur, praeterea etiam inferiori mediastini parte abcessus iuueniebatur.

Experimenta chemica cum sedimento albo urinae et inspissata vrina eorum instituta, qui variolarum infectionem subierant, hic quidem proponuntur, et oleum tartari per deliquium, spiritus vitrioli et syrus violarum his affusa fuerunt, nos vero ex observatis nullam conclusionem eruere potuimus. p.161.

In appendice traditur sermo *) Cl. TABARRANI, qui de historia quadam morbi variolosi naturalis exponit, passim ad Cl. SYDENHAMI doctrinam provocat, et conclusiones varias pro inoculatione variolarum inde deducit. p.164.

K 5

Foe-

*) Separatim etiam prodiit: Discorso concernente una Storia di Vaiuolo con alcune riflessioni intorno all' innestarlo, letto nell' Accademia delle scienze di Siena o' fia de Fifico-Critici il di 25 Giugno MDCCLXI. dal Dottore PIETRO TABARRANI Professore pubblico di Notomia nell' Università Senese. In Siena 1761. 4to pl. 3 $\frac{1}{2}$.

Foemina iuuenicula, duodeviginti annorum, duorum iam filiorum mater, anno quinquagesimo secundo die 18 septembris febre corripiebatur, quae usque ad diem tertium augebatur, cum etiam suspicio graviditatis adesset, maritus, qui ipse medicam artem exercebat, venaesectione succurrebat. Versus vespere tamen variolae efflorescebant, sequenti die copiosius, imprimis in facie, erumpentes, quarto die deiectiones aluinae copiosae, et sexto sanguis ex utero, abortum denuntians, profluebat. Hanc sanguinis effusionem convulsiones et deliria phrenitica excipiebant, venaesectione autem non immutabat deliria, laudanum itaque liquidum SYDENHAMI eiusque octo guttae aliquam quietem reddebant, hinc repetito usu prospero cum successu exhibebatur. Fluxus quidem sanguinis continuabat, depressae variolae et deglutitio molesta diu observabantur, aegra tamen mentis magis compos erat, et febris ita persistebat, ut variolae usque ad duodecimum diem ad aptam suppurationem disponerentur, et decimo quarto demum maxima morbi vis superata esset. Salva itaque redita fuit foemina, sed facie cicatricibus foeda.

p.172. Optat igitur Noster, cum multis aliis medicis, remedium specificum, quod morbo opponi posset, qui in confluentibus pessimum semper malum est, in quo tamen praeter symptomatum moderamen medicus nullum exhibere potest auxilium. Quod si vero quis venaesectionem ut inflammationem cohibens et copiosam eruptionem impediens remedium adducere vellet, ex adducta morbi historia facile percipiet, illam effusiones sanguinis variolarum mutationes non impediuisse.

p.176. Cum vero et adultis et foeminis, praecipue graviditatis tempore, molestissimus et exitiosus saepe sit morbus, foeminas ante accessum variolarum matrimonium inire haud debere, Noster monet, et ideo ad

ad inoculationem variolarum tanquam praestantissimum in variolis moderandis auxilium prouocat, in iis vero inprimis, qui lauto victu nutriuntur, fuscipiendam esse neget, cum, nisi iusta praeparatio praecedat, in his potissimum graua et lethalia saepe symptomata oboriantur. Repetit igitur multas rationes, ob quas variolarum insitio suscipitur, ex quibus non vltima videtur ea, quam et Cl. TARGIONI adduxit, quod locus insitionis multam et foetidam saepe materiam variolosam in reliquum corpus non deriuandam ex vlcere diuturno emittit.

In fine summatim proponit rationem et prospectum p.186. successum inoculationis variolarum in septem pueris et puellis susceptae, quae cum nihil noui contineant, hic non tangimus.

XXII.

H. G. N. TROSCHEL, bey dem Töplitzer Gesundheitswasser ordentlichen Arztes nothwendige Nachricht von dem wahrhaften Böhmischen Bitterwasser, Saydschützer Ursprungs aus dem Hochbetscher Berge. Gedruckt zu Leitmeritz, 1761.8. pl. 3¹/₂.

i. e.

H. G. N. TROSCHEL Thermarum Toeplicensium Medici Ordinarii Renunciatio de veris aquis amaris Bohemicis, quae ex monte, Hochbetsch dicto, in agro Saydschutzenfi propullulant.

A quae amarae medicatae Bohemicae multos per annos iam cognitae atque in vsu fuere. Paucissimi

ciffimi autem verum earum fontem, unde haustae fuerunt, nouerunt. Plures enim fontes, qui eiusmodi aquas amaras promunt, in tractu *Leitomeriensi* profiliunt, quae omnes a fontium possessoribus sub aquarum amararum nomine venduntur. Quum vero *Sedlitz* et *Saydschütz* duo diuersi, sed parum distantes, vicus primas praebuerunt aquas, etiam sub horum vicuum nomine illae aquae celebres fuere. Verum enim vero, venditae deinde quoque fuere aquae factitiae, quae, ex sale purgante amaro in aqua communi soluto, paratae atque effictae sunt. Quid mirum, si aquae hae medicatae tam diuersos ediderunt effectus!

Gratias igitur meretur Cl. TROSCHER, quod in omne id inquirere, et quod detexit, pagellis his nobiscum communicare voluerit.

FR. HOFFMANNUS, celebris ille aquarum mineralium scrutator, primus fuit, qui aquas has amaras notas fecit, atque in vsum vocauit. Aquae *Sedlitzenses* sine dubio primae fuere, quae innotuerunt. Post ea, quum animaduersum fuerit, fontem prope *Saydschütz* scatentem, saporem habere, vt HOFFMANNUS *) ait, intensum amaricantem, magisque falsum, eius aqua principatum obtinuit, licet ex vna officina, monte scilicet *Hochbetsch* dicto, ambae prouenire videantur. Differentiam, si qua est, Cl. Auctor in eo quaerit, quod fontes *Saydschützenses* altiore situm habeant: *Seydlitzenses* vero in valle huius montis prorumpant, vbi aquis peregrinis facilius accessus pateat, quare etiam illos fontes principem seu originem vocant, hos vero, vt venam descendentem considerant. Nouam hinc denominationem aquis his imposuit, vltimasque, *Sedlitz-*

*) *Examine chemico-medico fontis amari Sedlitzensis in Bohemia detecti Hal. §. VII.*

tzenses scilicet, in posterum inferiores: *Saydschützen-*
ses autem superiores nominabit, quemadmodum et
 curauit, vt lagenis, quae diuersas has aquas conti-
 nent, diuersae etiam litterae, distinctionis gratia, inu-
 rantur. Partes harum aquarum constitutiuas, quas
 ingredientibus vulgo vocant, non determinat, sed
 sibi ad aliud reseruatur tempus. De contenti autem
 salis, qui amarus dicitur, natura quaedam propo-
 nit, eumque ad mentem Cl. CARTHEUSER in *sy-*
stematē hydrologico, ad *natrum*, ab aliis sal fontium
 medicamentorum dictum, numerat. Sali huic amaro
 praeter aliis salibus ex aquis medicatis paratis, e. g.
Sedlitzensi, *Egrano*, *Anglicano*, *Epsom* dicto etc.
 praerogatiuam quidem dare contendit Cl. Auctor. Sed
 multipli experientia certi sumus, omnes hos sales, si
 scilicet veri et non factitii sunt, similique methodo
 parati, parum vel nihil differre: si quidem omnibus,
 sine omni additione singulari tantum quadam, quam
 vocant, encheiresi similem crystallorum formam
 dari posse, certum est; sicuti hoc Cl. SEIP, et ex
 Anglis Cl. LUCAS iam docuere, et ex comparatione
 salis thermarum Carolinarum cum Teplensi *) ap-
 paret, quorum alter ex thermis, alter ex fonte quo-
 dam medicato frigido, circa sex lapides a thermis
 Carolinis distante, coquitur, vterque pari modo ac
 artificio paratur, quare etiam, vt Cl. Auctor ipse
 fatetur, alter ab altero a peritissimo quoque distin-
 gui nequit.

Quando autem tres species huius salis amari Cl.
 Auctor adducit, sciendum est, primum, quem vi-
 lissimum nominat, terreas adhuc partes continere;
 alterum vero ab his partibus esse purgatum; ter-
 tium denique, quem, quia crystallos suas seruat, et
 ab

*) Confer. Commentar. nostr. Vol. X. Part. II. p. 329.
 et seq.

ab aere non mutatur, optimum salutat, quodam artificio esse paratum *). Quibus praemissis, ex HOFFMANNO, GOERITZ, DEBRA et Cl. CARTHEUSER-catalogum adfert morborum, quibus aquae hae amarae medentur. Hunc catalogum sequitur tabula, quae methodum et ordinem praescribit, ad quem curatio cum his aquis instituenda est.

In fine libelli inueniuntur pretia tam aquarum, quam salis, vna cum sumtibus lagenarum et cistae, quibus adseruandae sunt, quando ad externos mitti debent.

Tandem monendum, numerum foliorum in toto libello deesse: hinc illa in margine notare nequimus.

XXIII.

Noua physico - medica.

Facere non possumus, quin praeter alia felicitatis genera, quibus Saxonia nostra iam fruitur, illius quoque mentionem faciamus, quod *Dresdae* iam constitutum sit collegium supremum, quod mercaturae, agrorum culturae, artium vtilium et officinarum, in quibus variae res manuum opera parantur, summam in Saxonia curam habeat. Ex illo enim tempore, quo optimus noster Princeps Elector, FRIDERICUS CHRISTIANUS, cuius memoria nunquam in animis nostris deleri debet neque poterit, imperium proh dolor! nimis breue, suscepit, et post
ipsum

*) Ab amico, nuper ad hos fontes, eorum scaturiginem propius contemplandi ergo peregrinatus fuerat et hac occasione officinas ad salem hunc rite coquendum a domino huius terrae, Principe de Lobkowitz, partim prope fontes, partim Bilini exstructas viderat, accepimus, hoc artificium in eo consistere, ut sal, iam excoctus et in crystallos coactus, in aqua purissima iterum solvatur, coletur, et, nullâ addita re, lentae modo crystallisationi exponatur, idemque labor bis vel ter repetatur.

ipsius obitum semper nobis acerbum, tanto nec unquam satis laudando Principe dignissimus frater, serenissimus Princeps, XAVERIUS, per impuberes ser. Electoris, FRIDERICI AUGUSTI, annos illud egregie administrat, omni studio omnibusque viribus externae rationis felicitati augendae prospicitur. Itaque etiam certi quidam redditus publici, aerario alias Principis dicati, huic vsui destinati sunt, ut admodum insignia multaue quotannis ab illo commorato collegio exhibeantur praemia, vtilibus variis inuestigationibus atque tentaminibus quaesitis proposita, quibus ciuium labor, studium atque industria ita excitatur, ut eorum alter alterum cito nanciscatur aemulum. Quaestionum tamen nunc propositarum copia limites nostros iam superat; quare de illis alio forsan tempore aut loco referre constituimus.

Insuper, annuentibus optimis illis Principibus, permulti nationis nostrae procures in *societatem* quandam, *oeconomicam Lipsiensem*, dictam sponte abierunt, similem praefigentes sibi finem, ut mercaturam in genere, agrorum culturam, artium officinas, omnemque rem Saxoniae oeconomicam adiuuent. Director, octoque membrorum delectus, post singulum biennium ex reliquis sociis eligendi, cum Secretario perpetuo, cuius munere iam fungitur Vir Cl. IOANNES CHRISTIANUS DANIEL SCHREBER, Med. D. DANIELIS GODOFREDI, Professoris nostri Oeconomiae filius, post singulas sex hebdomades hic *Lipsiae* conueniunt, generalis autem conuentus omnium membrorum in solemnibus nostris nundinis publicis, post festum paschatos atque Michaelis, habetur. Quaestiones etiam et praemia iis dicata per singulos annos exhibet, resque oeconomici vsus in primis in Saxoniae prouinciis

ciis reperiundas indagare satagit, neque suorum laborum fructus suo tempore publici usus reddere intermitteret.

Neque hac data occasione temperare nobis possumus, quin aliud commemoremus institutum laude dignissimum, quod nimirum ex anni spatio et quod excurrit, hic quoque *Lipsiae* ortum suum habuit, ex quo nimirum singulis hebdomadibus plagula typis excusa traditur sub titulo *Indicis Lipsiensis* rerum ad usus vitae, cum in vrbe, tum ruri habitantibus necessariarum, cuius vna pars hanc modo urbem vel certe prouinciam respicit, altera vero commentationes super rebus oeconomicis omnis generis valde utiles lectuque dignissimas continet. Qui hunc sibi librum comparare velint, quatuor florenos imperiales pro quolibet anno solvunt. Multa quoque per singulos annos maioris minorisque pretii exhibentur praemia, totidem solutis quaestionibus oeconomicis a perillustri huius instituti auctore vel direttore *Libero Barone DE HOHENTHAL*, supremi sacrorum senatus *Dresdensis* Praeside secundo, propositis.

Nouum insignis suae in litteras propensionis, dudum iam a viris doctis depraedicatae, documentum superiore anno edidit *CAROLUS THEODORUS* serenissimus Dux et Elector Palatinatus, nouam condens *Manhemii* scientiarum Academiam, quae die decimo quinto mensis octobris 1763 publice inaugurata fuit. Quum leges ipsi praescriptae ad manus nostras peruenerint, facere non possumus, quin communicemus illas cum lectoribus nostris, ut ipsius rationem eo facilius intelligant.

Academia Electoralis Theodoro - Palatina de rerum gestarum atque naturalium Palatinatus praecipue, Domusque in eo regnantis, historia artibusque eo spectantibus sollicita esto.

In omnibus veritas suprema lex esto.

Academici vniuersi doctrina, studiis, moribus suis commendabiles et a partium studio alieni sunt. Quae priuatim tractantur, ne propalanto. In duas illi Classes, Historicam et Physicam, diuisi sunt. Altera alteram in rebus ad alterutram solam spectantibus ne turbato.

Legum ac dignitatis custodes, Praeses atque Director, dein Secretarius actorum perpetuus, et Quaestor aerarii sunt. Secretario Vicarius adiunctor. Praeter hos numerus Academicorum ne denarium excedito.

Noui focii electio penes Academiam, confirmatio penes Principem esto. Non alius nisi secularis, vel ecclesiastico-secularis eligitor.

Praeses et Director a laboribus consuetis immunes, reliqui Academici in legendis audiundisque commentationibus assidui sunt. Quicquid scripserint gerintue, placido fociorum examini et iudicio repetita lectione subiiciunt. Digna et suo et Academiae nomine singuli commentantur; praesentium in contentibus praemium, nummus argenteus, in usum hunc usus, esto.

Lingua in scribendis commentariis ac dissertationibus princeps latina; germanica et gallica subsidiariae sunt.

In rebus, quae vel ab vniuerso conuentu, vel a singulis classibus decidi possunt ac debent, plurimum suffragiorum habetor ratio. Sententiae, scripta aut viva voce, prout aptius visum fuerit, explorantur. Praeses eas rogato pronunciatoque; Secretarius his inscribit.

Academiae apud exteros, horumque apud Academiae interpretes Secretarius esto. Commentarios et quicquid Academia probauerit iusseritque, idem in lucem publicam edito. Tabulas, priuilegia, litteras, dissertationes praelectas et sigillum seruato. Academicorum fatis functorum elogia scribito.

Conuentus aestiui in bibliotheca Electorali, hie- males in vicino conclauis singulis diebus iouis ab hora tertia pomeridiana ad quintam habentor. Bis quotannis feriae sex hebdomadam sunt, vernaes et autumnales.

Primus post vtrasque ferias conuentus publicus atque solemnis esto. In vernali sociorum defunctorum elogia leguntor. In autumnali praemium numismatis aurei 50 ducatorum meliori, quae aliunde ad propositam quaestionem academicam missa fuerit, commentationi rite examinatae tribuitor, nouumque alternis classium vicibus problema in annum sequentem publicator.

Certantes de praemio ante calendas quintilis opuscula sua Secretario reddi curanto. Nomen suum in schedula obsignata, adiiciunto. Si nullus palmam meruisse videbitur, praemium in sequentem annum seruatur. Academici iudices praemii, non participes sunt.

Proximo inde conuentu priuato acceptorum et expensorum rationes annuas Quaestor reddito.

His, quas iam enarrauimus, legibus aliam deinde additam esse accipimus de aliis membris, et honorariis. et extraordinariis dictis, Academiae illi adiungendis.

Insuper praemiorum numerum auxit Serenissimus Elector, duplicis quasi ordinis. Loco enim unius nummi aurei quinquaginta ducatorum, bini nunc illius pretii quotannis distribuuntur, ideoque etiam

etiam binae quaestiones ad vtramque Academiae classem spectantes proponuntur. Praeter hos alii duo, quinque et viginti ducatorum singuli, destinati sunt explicandis quaestionibus, rem physicam et oeconomiam Palatinatus in primis attinentibus; ex quibus tamen omnibus ideo expectandis quaestionibus earum modo faciemus mentionem, quae instituti nostri fines attingunt.

Physica igitur quaestio prioris quasi ordinis, praemio ad annum 1765 exhibendo destinata, cupri excoquendi rationem concernit, ut facilius nimirum consueto minusque tum ratione temporis, cum ligni, pretiosus et experientia confirmatus doceatur modus, ex minera cupri purum ipsius regulum excoquendi.

Altera quaestio, ad annum 1766 referenda, lithanthracum usum cupit determinandum; num illae ad mineras vstulandas et coquendas, vel certe ad ferri mineras coquendas, adhiberi queant? Ut illarum, eum in finem conquisitarum, aliqua simul copia ad Academiam mittatur, locusque, quo effodiuntur, indicetur, ab ipsa rogatur.

Praemius porro secundi ordinis quatuor sequentes quaestiones praefixae sunt, quarum binae priores ad annum 1765, posteriores autem ad annum 1766 pertinent:

Vbinam scilicet in Palatinatu illa oeconomorum marga inuenitur, quae ab aliis ad certos quosdam agros fertiliores reddendos adhibetur? Et quibusnam potissimum agris illa conuenit?

Num apium cultura copiosius, ac huc usque factum fuit, locum habere potest in Palatinatu? Quidnam in primis illam augendam iuuat? Et quidnam ipsi nocivum atque impedimento est.

Quaenam in Palatinatu inueniuntur insecta, cum noxia, tum vtilia? Quaenam ab illis noxa, et ab his expectanda utilitas? Et quomodo illa auerenda, haec autem amplificanda erit?

Quaenam denique istorum insectorum est natura, quae vernali tempore vitium gemmas pungendo laedunt? Ab ovo ad interitum vsque explicentur ipsorum indoles, externus habitus atque mutationes. Annotetur porro, quam potissimum in terra et in quibus palmitibus frequentiora sint, et quibusnam auxiliis facillime extinguantur, vel certe vitis ipsa ab illis tuta reddi possit?

Commentarii super omnibus illis quaestionibus conscribendi ad perpetuum Illustris Academiae Secretarium, Cl. LAMEY, qui Electorali simul curandae bibliothecae praefectus est, mitti debent ita, ut illos primi quasi ordinis ante calendas mensis iulii, hos autem secundi ordinis ante finem singuli anni, cui destinati sunt, accipiat.

Regia *Parisiensis*, quae ab agri cultura nomen habet, Societas, postquam in aliarum academiarum exemplum, quouis anno praemium exhibendi consilium cepit, tale sexcentorum pondo gallicorum mense aprili 1765 adiudicabit illi, qui descriptionem, causas, effectus atque curationem morborum epidemicorum et contagiosorum armenta infestantium, atque remedia illis praeuertendi istorumque progressus cohibendi, omnium optime explicauerit.

Aliud argumentum praemio, ad annum quidem 1765 pertinenti, sed 1766 demum exhibendo, octingentorum pondo gallicorum *eadem* obtulit, ut qualitas vsusque stercoreationis agris, iisque cerealium in primis culturae destinatis, eorumque indoli conuenientis,

tis, optime inuestigentur ideoque captis experimentis demonstrantur, siue noua stercoreationis genera huc vsque vel incognita, vel certe neglecta, commendantur, vel in fimi locum, eius nisi satis adsit, adhibenda, vel ad illius similisue stercoreationis qualitates perfectiores reddendas apta. Commentationes, vel Cl. DE SAUVIGNY, Consiliario status dicto, vel Cl. DE PALERNE, perpetuo societatis secretario, ante primum diem ianuarii cuiuslibet anni, quo de exhibendo praemio iudicabitur, tradi debent.

Regia scientiarum Academia *Burdigalensis* quaestionem ad annum 1765 proposuit de indaganda causa originis montium, (*quelle est la cause de la formation des montagnes*)?

Insuper eodem anno alia duo praemia, e superioribus annis relictis, se exhibituram esse merentibus, *eadem* promisit, quorum vnum aliquam praeparationem lanae ab insectorum morfu tutam reddendam, alterum plantarum nutrimento aptarum inuestigationem concernit *).

Anno 1766 duo quoque praemia obtulit *eadem* Ill. Academia. Optat nimirum, vt genus atque essentialis morborum epidemicorum indoles inuestigentur, qui ex ficcatis paludibus in vicinis locis saepius oriri solent, vtque doceatur simul, quam cautione et diligentia ad istos auertendos opus sit et qua methodo, per experientiam confirmata, isti curari possint.

Alterius tandem modo dicti praemii argumentum inuestigandis diuersarum coagulationum causis

L 3

dica-

*) vid. Comment. nostr. Vol. IX. P. IV. p. 697.

dicatum est; (*quelles les causes des différentes coagulations?*) Scire licet, ante primum diem mensis maii cuiuslibet anni, quo de singulis praemia publice decernet Academia, ad ipsius Secretarium Cl. DE LA MONTAGNE aut bibliopolam BRUN, mitti debere commentarios, gallice vel latine conscribendos.

Lugdunensis Gallorum Academia quaestionem, hoc anno 1764 dirimendam, olim obtulerat de aere in nosocomiis carceribusque noxio eumque corrigendi optimo remedio *). Quamvis autem quatuordecim super hoc argumento scriptos accepisset illa commentarios, eorum tamen nullus ipsius expectationi prorsus satis fecit, praesertim quum auxilia in aeris corrigendi usum inuenta iamque nota, neque tamen adhuc perfecta, ab auctoribus commendata fuerint. Rei igitur grauitate et utilitate insigni Ill. Academia permota, idem argumentum distulit ad annum 1767, duplicato praemio, optans in primis, ut adminiculum aliquod certum et per experientiam usu comprobatum inueniatur, quo aer in carceribus atque nosocomiis purior reddi queat.

Divionensis Regia scientiarum Academia praemio huius anni 1764 sequentis argumenti quaestiones proposuerat: ut remediorum antispasmodicorum stricte sic dictorum determinaretur natura, agendi eorum modus explicaretur, varia eorum genera distinguerentur eorumque usus in morbis indicaretur. Praemium illud reportauit Cl. GODAR, Med. D. Veruiae medicinam cum laude faciens.

Parisis a munere perpetui Regiae Chirurgiae Academiae Secretarii sese abdicauit Cl. MORAND, ideo-

*) vid. Comment. hor. Vol. X. P. IV. p. 718.

ideoque in ipsius locum a primo Ser. Regis chirurgo
DE LA MARTINIERE nominatus Regiaque aucto-
ritate confirmatus fuit Cl. LOUIS, variis vtilibus
scriptis inter eruditos clarus factus.

Ab eadem Regia Chirurgiae Academia *Parisiensi*
praemio iam duplicato ad annum 1766 referendo
sequens oblatum fuit argumentum: vt contrasiffura-
rum, in laesionibus capitis accidentium, tradatur theo-
ria, practicis, quae inde fluant, additis animaduer-
sionibus; (*établir la théorie des contrecoups dans les lé-
sions de la tête; et les conséquences pratiques qu' on
peut en tirer*). Ante finem anni 1765 ad Academiae
Secretarium, Cl. LOUIS, mitti debent commenta-
rii, gallice vel latine conscripti, conditionibus iam
satis notis vna obseruatis.

Harlemensis scientiarum Societas in conuentu nu-
per habito ex medicis in sociorum numerum rece-
pit Viros Clarissimos, ALBERTUM DE HALLER,
Gottingensis scientiarum societatis Praesidem, IO-
ANNEM OOSTERDYK SCHACHT, M. D. et Prof.
Ultraiectinum, A. PELERIN, Med. D. et Prof.
Traiectinum ad Mosam, IOANNEM TACK, Med.
D. Batauorum Lugdunensem, tandemque SAMUE-
LEM GOTTLIEB GMELIN, Med. D. Tubin-
gensis.

In *Groningensi Omlandica* Academia Medicinae,
Theoriae, Anatomes, Chirurgiae et Botanices Pro-
fessor Publicus Ordinarius constitutus fuit Vir Cl. PE-
TRUS CAMPER, Med. D. Londinensis et Harle-
mensis scientiarum societatum socius, Franequera-
nus olim deinceps Amstelodamensis Professor Medi-
cinae dignissimus, variis huc vsque editis scriptis, de
quorum vno ante aliquod tempus ad lectores nostros

retulimus *), inter viros doctos egregie clarus. Nouum is hoc suum munus adiit hoc anno 1764 die nono maii, oratione publice habita *de analogia inter animalia et stirpes*.

Mediolani Professor Medicinæ nuper nominatus fuit Vir Cl. PAULUS VALCARENGHI, Med. D. olimque iam Professor Medicinæ in Academia Ticinensi Primarius, et adhucdum Bononiensis Academiae Socius, variis editis scriptis, *medicina* in primis, quam edidit, *rationali, ad recentiorum mentem, observationibus adaucta et epidemicis Cremonensibus constitutionibus* arabicisque commentariis, laudem atque famam inter eruditos diu iam consecutus. Vnicum iam Mediolani Professore illum esse legimus, cui datum sit, vt omnem et theoreticæ et practicæ medicinæ ambitum intra binos annos docendo emetiatur, insigni ideo stipendio coonestatus.

In Academiam *Gieffensem* Erfordia euocatus fuit Vir Cl. IOANNES GUILLIELMUS RAUMER, Med. D. vt Professoris Medicinæ Primarii Physicque sic dicti prouincialis munus ibidem suscipiat.

Petropoli abiit ibique a munere Professoris Mechanices sese abdicauit Vir Cl. IOANNES ERNESTUS ZEINER, Phil. ac Med. D. Academia tamen scientiarum Imperialis Petropolitanae Membri honores retinens. *Wittebergam* deinde secessit ibique Mathematicum Inferiorum Professor Publicus Ordinarius nominatus fuit, quod nouum quoque munus auspicatus est nuperrime die trigesimo octobris habita oratione *de machinarum principiis*, editaque eum
in

*) vid. Comment. nostr. Vol. X. P. III. p. 503.

in finem programmate, quo *miffionum metallicarum examen hydroftaticum exponit.*

Ab Academia *Gryphiswaldenfi* in Sueciam rediit Vir Cl. IONAS BOECKMAN, Med. D. et Prof. Reg. et fuccefforem in hoc munere naftus fuit Virum Cl. CAROLUM FRIDERICUM REHFELD, Med. D. ordinisque Medicorum Gryphienfium iam huc vs-que Adiunftum.

Lubeccae fub exitum fuperioris anni 1763, die decimo tertio decembris, praematura nimis morte extinctus fuit HENRICUS BALEMANN, Med. D. trigefimum modo quintum aetatis annum agens. Translationem germanicam cum hiftoriae auium KLEINII, tum LEVRETI obferuationum de partu difficili, ab illo accepimus, pluresque alios ab ipfo laborum vtiles fructus fine dubio expectare potuiffemus.

Hoc autem anno 1764 die decimo feptimo iunii academia *Aboenfis* morte amisit Virum Cl. IOANNEM LECHE Med. D. et Profefforem et Academiae fcientiarum Sueciae focium.

Florentiae porro nuper die quinto iulii obiit quadragefimo fecundo aetatis anno CAROLUS STENDARTI, Patricius Florentinus et collegii fanitatis Praefes. Antiquitatum et amantiffimus et ftudiofiffimus, infignem et gemmarum et infcriptionum reliquit collectionem. Imperatoris Romani negotiorum procurator olim fuit Algeriae, cum peftis ibi graffaretur per biennium, quam igitur quoque descripfit.

Baruthi rebus humanis exemptus fuit die feptembris duodeuicesimo CHRISTIANUS SAMUEL

GERAUER, Med. D. Comes Palatinus, Ser. Marchionis Culmbacensis Consiliarius aulae et Archiater et in Academia Erlangensi Professor Medicinae Primarius, quadraginta septem annorum aetatem consecutus. A munere illo academico per plures iam annos auocatus fuerat in aulam Byruthinam, ut Ser. Principi a sanitate tuenda adesset.

Bononiae sub initium octobris grauissima apoplexia extinctus fuit PETRUS PAULUS MOLINELLI, Med. D. apud Institutum, quod dicitur, Litterarium Bononienſe Chirurgiae Professor, cuius iacturam eo grauius fert iam dicta Academia, quo maiori sibi hunc socium honori habuit ex merito.

Tandem, dum haec scribimus, triste hoc in relationibus publicis relatum legimus nuncium, quod CHRISTIANUS CAROLUS CRAMER, Med. D. cum societate virorum doctorum Danica, cuius facta nuperrime commemorauimus *), Arabiam per ultimos hosce annos peragrans, die februarii decimo huius anni 1764 sociorum quoque sortem expertus, Bombaci (*Bombay*) diem suum obierit supremum.

Praeter haec, quorum iam mentionem fecimus, supersunt adhuc alia, breuibus commemoranda.

Aboae nimirum et theatrum anatomicum et laboratorium sic dictum chemicum, quo utroque Academia, ante centum et viginti annos iam condita, hactenus caruit, hoc anno exstructa sunt.

Holmiae,

*) Comment. nostr. Vol. XI. P. IV. p. 719.

Holmias, ex Illustrum regni ordinum instituto, septem assessoribus collegii medicorum ibidem constituti, annum salarium decretum esse accipimus, ita ut quisque summam quadringentorum circiter thalerorum imperialium (500 *platar*) accipiat.

A suprema Curia *Parisiensi* medicorum ordini in mandatis fuisse datum, ut suum de utilitate vel noxa insitionis variolarum ferat iudicium, suo tempore retulimus *). Ab uniuerso deinde illo ordine clarissimorum virorum delectum fuisse constitutum accipiebamus, qui singulari studio atque diligentia in graue hoc argumentum inquirerent. Illos quoque plus simplici vice ea de re iniisse consilia, et ex illis Cl. Viros, ASTRUC, COCHU, BARON aetate minorem, VERDELHAM, MACQUART et LE-PINE contra illam methodum, alios autem, Cl. GEOFFROY, LORRY, THIERRY et MALOUE, pro illa admittenda, suas tulisse sententias, tandem vero tota hac quaestione ad uniuersum ordinem delata, eoque in suffragium vocato, ex illis quinquaginta duos pro toleranda ista methodo stetisse, quinque autem et viginti contra illam disputasse legimus. Sine dubio nunc ad Curiam Supremam delatum esse illud iudicium, sententiamque igitur theologorum ordinis breui forsan expectari posse coniecimus, tuncque usum illius operationis, huc vsque interdictum, denuo ab illa Curia suprema admissum iri, speramus.

Quum nostris temporibus non uniuersum plantarum studium tantum, sed etiam agricultura potissimum assidua peruestigatione naturae scrutatorum

*) vid. Comment. nostr. Vol. XI. P. III. p. 558.

rum magis magisque perficiatur, tot tamque varii in explicandis rebus, ad has scientias pertinentibus, characteres observati sunt, illique singularibus et determinatis vocabulis designati, ut nouam quasi linguam addiscere necesse sit, eas cognoscendi cupientibus. Optima instruendi vis inest dictionariis seu lexicis, sic dictis, ex quibus repeti queat, iubente necessitate, vocabulorum vis. Hinc laudabili aequae ac utilissimo consilio in animum induxerunt, conficere huic scopo conuenienter Dictionarium generale, ut vocant, Cl. Viri, Abbas UBALDUS MONTELATI, Florentinus, qui Academiam Agriculturae, aut *Georgophilorum* Florentiae condidit, nec non XAVERIUS MANETTI, Prof. Botanices in Societate Physico-botanica Florentina. Prodibit illud tribus aut quatuor tomis comprehensum, in forma, quae folii est, chartae ac characterum, quantum fieri potest, nitore conspicuum. Primus etiam tomus anno iam huius seculi edetur sexagesimo quarto. Addentur delineationes variae, inuentionem diuersarum machinarum, plantarum cet. siue alibi eae non extent, siue ad cognitionem meliorem requirantur. Edita iam est ad tomum primum pertinens praefatio, in qua tum de necessitate, tum de utilitate talis laboris differitur, duabus plagulis in folio. Multum facessit negotii vocabulorum, ad agriculturam pertinentium, collectio, quorum aliqua ex *Vocabulario della Crusca*, alia ex codicibus manuscriptis IO. VETTORII SODERINI, qui in bibliotheca CAROLI THOMASII STROZZI, occurrebant, desumpta fuerunt. Latinae voces, quae cum Italicis conspirant, ex scriptoribus rei rusticae selectae, nec latino barbarae praetermissae sunt, gallicae cum rusticis Italorum plerumque conueniunt. Partem porro huius lexici, fibi

sibi vindicat botanica, quippe sine cuius cognitione nec felicem agricolam fore existimant Cl. Auctores. Hinc de singula planta denominatio, praecedente ill. LINNAEO, distributio systematica, usus oeconomicus, patria cet referentur, non neglectis tamen aliis etiam celebribus botanicis. Vocabula aliorum idiomatum fideliter adducta et in linguam italicam translata, quaedam etiam triuialia sunt addita. Praecipua cura in definitionibus fuit adhibita, ut sint clarae atque distinctae, eaque propter loca auctorum, illustrandi causa, ubi opus erat, adiecta, reperiuntur. Primo tomo praemittentur generales regulae agriculturae, explicatio prouerbiorum utilissimorum, nec non elementa agriculturae, et in ultimo tandem sequetur index omnium auctorum. Praeter alia tandem in ipso opere occurrunt animalium, insectorumque, quatenus huc spectant, descriptiones. Ex his autem ipsius operis dignitatem diiudicare licet, de qua plura suo dicenda erunt loco. Qui vero hoc opus desiderant, sua nomina profiteri poterunt penes *Iacobum Carlieri*, bibliopolam Florentinum, vel penes alios, quorum nomina in singulari schedula, in bibliopoliis celebrium locorum inuenienda, recensentur.

Non minori cum animi voluptate nouum iam indicamus in incrementum scientiae naturalis directum, institutum, quod ab anonymo quidem Auctore, in edito quodam *de iconibus, animalia ex museo academiae Lugduno-Batauae desumpta, picta exprimentibus*, monito significatur, quem vero eundem Cl. ALLEMAND esse suspicamur, cui addita-menta ad BRISSONEI Ornithologiam tribuenda esse autumauimus *). Icones illae sistent non nisi
rara

*) Vid. Comment. nostr. Vol. XI. Part. IV. p. 611.

rara et quae a paucis videntur, quod eo vtilius esse iudicamus, quo frequentior est sese in vulgaribus disquirendis exercendi occasio, et quo magis inde scientiae augentur. Deinde feliget Cl. Editor, attentione dignissima, quae vel nondum, vel imperfecte descripta habentur, omnia accuratissime delineabuntur, et aeri incisa natiuis coloribus ornabuntur. Ordo seruabitur nullus, rara singula locum inuenient, siue sint aues, quadrupeda, pisces, insectaque. Nulla tamen, nisi brevis subnectetur iconi descriptio characterum. In quadrupedibus et auiibus characteres ex BRISSONIO mutuabuntur, latina et gallica lingua. Speciminis loco exhibetur *Hydrocorax indicus*, cuius descriptionem additam inuenimus BRISSONII Ornithologiae. Tom. II. p. 205 edit. Lugd. Batau. de quo in hoc monito, aequae ac in opere Brissoniano caput et rostrum tantum cognitum fuisse adseritur. Est autem icon nitida et eleganter picta.

Quicquid vero sensus nostri satis ob imbecillitatem in corporibus naturalibus dignoscere nequeunt, illud curatius oculus armatus explicare valet. Quem iam alibi in eiusmodi disquisitionibus feliciter versatum fuisse docuimus, Cl. LEDERMÜLLERUM, nondum a perferuatione naturae penetralium destitisse iam indicamus. Nouum enim molitur opus, quod plantarum aequae ac aliorum corporum naturalium specimina continebit, delineationes autem aeri incidendas committet *Adamo Ludwig Wirsingio*, celebri Norimbergensium chalcographo, qui etiam ex collectione vernali, *der Frühlings-Sammlung* tres iconismos cum explicatione iam edidit. Sunt illi elegantes, viuis, naturam imitantibus, coloribus elegantissime picti.

Pro-

Proponuntur in his, ramus pyri cum floribus, re-
feda odorata, et lilii-cruenti flos, vbi simul florum
fructuumque partes omnes distinctae sistuntur. Ne
amicis nimis pretiosa euadat collectio, singula sectio,
tribus tabulis cum textu constans, sua subscribenti-
bus nomina vendetur duobus florenis. Explicatio
autem germanica aequae ac gallica addetur. Nec
sine causa speramus, omnibus hoc institutum gra-
tum fore atque acceptum. Collectio singula duo-
decim complectitur tabulas, et pro anni tempore
vernalis, aestiua et sic porro nuncupabitur.



Memoria IOANNIS GODOFREDI ZINNII,
Medicinae Doctoris, eiusdem et Botanices
P. P. O. Regiae Societ. Scient. Gottingensis
et Berolinensis, Instituti Bononiensis Socii,

Vt despectus ex edito loco camporum valliumque
varietate, riuorum meatu et herbarum colore
eum necessario delectat; qui improuiso et vno ocu-
lorum adspectu illud spatium ambit: sic descensus
ad loca singula et diuturnior contemplatio non ma-
gis oblectamentum, quam admirationem habet, ne-
que solum ad naturae cognitionem utilior est, ve-
rum etiam ad reminiscendum efficacior. Non mu-
tatur hic mentis humanae sensus cum rebus, quae
si modo amplae sint et variae, coniunctim oblectant,
separatim utiles et mirabiles videntur: ipsa adeo do-
ctrina, quem semel incredibili varietate ad adspici-
endum allexit, eum certe exhilarat; non autem
prodest, nisi partibus quibusque sigillatim confide-
ratis. Sed cum nulla pars in se utilis sit, omnes au-
tem necessario vinculo sic contineantur, vt altera
sine altera vel esse non possit, vel ne vim quidem
exferere; tamen in fine ad vniuersam summam re-
deundum est, vt tandem cognoscatur, vnde quidque
profectum sit, quoue debeat praeferrri. Quidam
enim, etsi res singulares accurate intelligunt, ta-
men, quia nec cum reliquisnectere ac comparare,
nec subtiliter explicare, aut in vsum aliorum con-
vertere didicerunt, docti non appellantur. His de
causis non potuisset ZINNIVS sine totius doctrinae
medicae intelligentia tam utiliter quaedam singula-
ria tractare, nec tam illustris fieri laude diligentiae
in singularibus, nisi ab vniuersorum oblectatione
ad singulorum tenuitatem descendere sustinuisset.

Quare

Quare volumus ab iis, qui hanc vitae descriptionem legent, intelligi, nos propterea de vniuersa eius doctrina parcius dixisse, de quarundam rerum admirabili scientia pluribus, quod hanc vel signum vel effectum omnis doctrinae esse statuimus. Quod signum cum tam illustre sit et admirandum, facile de magnitudine reliquae doctrinae iudicari poterit. Patriam habuit Suabacum, parentes CONRADUM STEPHANUM, agri Suabacensis et redituum ducalium praefectum, matrem SOPHIAM CATHARINAM KOEHLERIAM, a quibus 1727 natus est. Post quindecennalem institutionem domesticam quadriennium exegit in gymnasio Onolzbacensi, in scholis GERETI et STREBELII: inde cum multa spe Gottingensi academiae a. 1742 traditus est. Ibi vero, non omissa audiendi GESNERI occasione, tractatis item duce SEGNERO disciplinis physicis et mathematicis, multo paratior medicinam adgressus est, quam tunc quidem RICHTERUS, HALLERUS et BRENDELIUS profitebantur. Studium seuerius, quod medicae arti impendit, relaxauit quodammodo adeundis lectionibus ACHENWALLI, in quibus de Europae regnis exposuit. Tandem a. 1749 summis medicinae honoribus condecoratus est, edita disputatione *de experimentis circa corpus callosum, cerebellum et duram meningem in viuvis animalibus institutis*. Fuit ergo hoc tempus simile illorum oblectationi, qui vno intuitu plenam naturae bonis planiciem animaduertunt: hanc suauitatem si seruandam et augendam putauit, si incensus pulcritudine etiam singula mirari et propius nosse voluit, quid aliud nisi intelligentis et attenti spectatoris officium fecit? Huc pertinet, quod Berolinum inprimis studio anatomiae petiit, vbi, siue cadauera secare, siue nosocomia adire, siue plantas et-

iam colligere et examinare vellet, duces habuit ac comites fidissimos SPROEGELIUM, LIEBERKUHNIUM, GLEDITSCHIUM. Praeterea in disciplinam et amicitiam ELLERI et EULERI receptus, eoque magis iis omnibus probatus, quo doctiorem atque studiosiorem viderant, dignus tandem habitus est, qui Societati Scientiarum Berolinensi a. 1752 adnumeraretur. Detulit autem Berolino tam iucundam temporis ibi vtilissime transmissi memoriam, vt hanc commorationem semper in praecipuis vitae commodis poneret. Quid quod, postquam a. 1751 reuersus Onolzbacum admiratione et amore multo ab omnibus exceptus erat, et insuper valde commendatus medicorum collegio, speciminibus anatomicae et medicae doctrinae, tamen anno sequenti Berolinum denuo se contulit, et vrbis et literarum amore, perpetuamque sedem eligere decreuit. Sed interuenit his consiliis coniunctio cum academia Gottingensi, quoniam ab instituta illo fere tempore Scientiarum societate ZINNIO potestas facta est per epistolas cum Sociis agendi: cui alia necessitudinis causa accessit, cum ad botanicen ibi docendam vocatus, et Societati, accepto Socii Extraordinarii honore, arctius deuinctus est. Ab hoc botanico munere, quod a. 1753 d. 13 Ian. adiit, mortuo BRENDelio, adscendit Professoris Medicinae Ordinarii gradum, quod vltimum fuit honoris praemium. His autem, quae hucusque sine vlla vel admonitione vel laude de vita ZINNII deinceps enarrauimus, antequam ad laudationem pergamus, vnum addi debet, quod a. 1757. inter Socios Instituti Bononiensis relatus est. Iam ipsa laudatio non de omni eius doctrina exponet, nec orationis ornatu commendabitur; sed in singularibus reique ipsius documentis versabitur, quae quo

quo praestantiora sunt, eo paucioribus verbis praedicanda putamus, ut sua magnitudine emineant. Scripsit ZINNIVS peculiarem librum de oculo, a nemine, id quod iam permagnum est, magnopere reprehensum, ab omnibus laude diligentiae, laboris, utilitatis et doctrinae sic ornatum, ut, quidquid diceretur, a vulgari laudantium consuetudine differret, nec nisi meritum praemium scientiae anatomicae subtilioris contineret. Nec profecto male iudicabit, qui ornamentum hoc anatomicorum librorum non aetati vni aut scholae, sed seculis et doctis hominibus traditum dicet. Non minorem laudem meruit botanica doctrina, cuius collectio in se difficilis et operosa est, sed ad amplificandam disciplinam multo utilior videtur eorum opera, qui ipsi ad systematis leges aliquid elaborant, et in hoc quoque genere singula cum vniuersis examinant. Hoc quomodo ZINNIVS praestiterit, melius e descriptione horti Gottingensis, quam nostro hoc indicio, elucebit. Iam quid utilitatis potuerit expectari, si quaedam inchoata, ut libellus *de saluiis*, cui ornando iam ad naturam pictae imagines institutae erant, item *de generibus plantarum et de ossibus corporis humani*, perfecta essent, iudicare poterit is, qui cognouit ea Zinniana scripta, quae in manibus omnium versantur. Sunt etiam ab eo multa sine nominis indicio ephemeridibus Gottingensibus, collectionibus utilibus Hanoueranis, Promptuario Hambourgenfi et bibliothecae Britannicae inserta, quorum mentio fieri hoc loco debuit, quoniam praeter doctrinae significationem perspicuum industriae pro vitae spatio perquam admirabilis argumentum dederunt. Nos ergo, qui saepe iam ZINNIANAM doctrinam mirati essemus, simulac de morte meritissimi Viri, nimis matura et propemodum inuida, cer-

tiores facti sumus, Gottingae et literarum iacturam dolumus, et quoties eius recordabimur, eum doctum, diligentem ac posteris etiam utilem iudicabimus, nec unquam eius nomen sine multa laude et gratiarum actione commendabimus. Nam profecto largi et utilissimi fructus exquisitae doctrinae intercepti sunt, quasi hoc in fatis eorum sit, qui celeriter inclarescunt, ut ostensi potius his terris, quam dati, videantur.

Adponamus et indicem scriptorum, quorum editione b. Nostri ZINNII nomen inclaruit:

Diff. inaug. sistens experimenta quaedam circa corpus callosum, cerebellum, duram meningem, in vivis animalibus instituta. Praeside ALB. HALLER Gott. 1749. 4.

Progr. de ligamentis ciliaribus. ib. 1753. 4.

Observationes quaedam botanicae et anatomicae de vasis subtilioribus oculi et cochlea auris internae, ad Virum Ill. PAUL GOTTL. WERLHOF. ib. 1753. 4.

Descriptio oculi humani iconibus illustrata. ib. 1755. 4.

Catalogus plantarum horti academici et agri Gottingensis ib. 1757. c. f. aen. 8.

Exstant porro in Commentariis Societatis Reg. Scient. Gotting. ab ipso conscriptae.

Observationes V ex corporibus morbosis Tom. II. p. 364. 431.

Observationes de tunicis et musculis oculorum. Tom. II. p. 115.

Obser-

Obferuationes botanicae. Tom eod. p. 425.

Comment. de differentia fabricae oculi humani et
brutorum. Tom. IV. p. 191.

Alia adhuc ex latina in gallicam linguam translata
commentatio:

De l' Envelope des Nerfs exstat dans les Memoires
de l' Acad. de Berlin. Ann. 1753. p. 130.

Commentationes in Soc. Reg. Scient. praelectae, ty-
pis nondum excusae:

Obferuationes botanicae. a. 1755.

Comm. de naturalibus et maioribus generibus
plantarum. a. eod.

De analogia fabricae monstrosae animalium et ve-
getabilium. a. 1756.

Obferuationes continuatae de differentia fabricae
oculi humani et brutorum, a. 1757.

Anatome Salamandrae, a. eod.

De fibris nerueis, a. 1758.



Supplementum alterum scriptorum physico-
medicorum, quae anno 1760 prodierunt.

Opusculi di Autori Siciliani etc. Tom. III. in
Panormo. 4.

*Der Koeniglichen Academie der Wissenschaften in
Paris Anatomisch chymisch und botanische Ab-
handlungen. Aus dem Franzoesischen übersetzt
von WOLFG. BALTH. ADOLPH V. STEIN-
WEHR. 9ter Theil. Breslau. 8 m. K.*

L' Art de faire des Garçons par M** Doct. en
Med. de l' Univ. de Montpell. Nouvelle edi-
tion. à Montpellier. 12.

Catalogus remediorum, quae ad vsus pauperum
in nosocomio prostant. Viennae 8.

SAM. AURIVILLIUS, Diss. de expectoratione pe-
ripneumonicorum. Resp. *Georg. Rothman.*
Vpsal. 4.

Dell' uso e dell' abuso del Coffe: Dissertazione di
I. DELLA BONA. in Verona. 4. (*editio altera au-
cta et emendata*).

CHRISTOPHOR. CRAMER, Diss. inaug. de para-
lysi et setaceorum aduersus eam eximio vsu.
Goett. 4.

HENR. IOAN. NEP. CRANTZ, Quaest. acad. an
plantarum officinalium, etiam aliarum, recepta no-
mina recte mutantur? Neg. Resp. *Bernard Brei-
finger.* Viennae, 4.

Eiusd. Quaest. quid veri in sententia Stahlianæ ratione
animæ. Resp. *Philip Marherr.* ibid. 4.

Amin-

Aminnelse-Tal öfwer Framledne Directeuren och Kongl. Vetensk. Acad. Ledamot, Välborne Herr HENRIC. THEOPH. SCHEFFER, på Kongl. Vetensk. Ac. Vågnar, hållit i Stora Riddarhus-Salen af dess Medlem AXEL. FRED. CRONSTEDT. Bårg Måstare. Stockholm. 8.

Gleanings of Natural History — — — by GEORG EDWARD. F. S. S. Part. II. London. 4. c. tab aen. viu. color. pict.

Plantae selectae, quarum imagines ad exemplaria naturalia Londini in hortis curiosorum nutrita manu artificiosa doctaque pinxit GEORG. DIONYS. EHRET, Germanus, occasione haud vulgari collegit, nominibus propriis notisque subinde illustravit et publico vsui dicavit D. CHRISTOPHOR. IAC. TREW, in aes incidit et viuis color. repraesentavit IO. IAC. HAID, Decuria VI. Norimberg. fol.

Die hohe Würde wahrer Aerzte, deren Kunst eine der alleredelsten, wichtigsten, nöthigsten und einträglichsten vor Könige und Fürsten ist — — beschrieben von C. E. ENDTERO. Frankf. u. Leipz. 8.

Memoires historiques, politiques et militaires sur les principaux événemens arrivés dans l'Isle de Corse des l'année 1738 jusques à 1741 avec l'Histoire naturelle de cette Isle et diverses Remarques curieuses sur les Peuples qui l'habitent; par M. JAUSSIN avec une Carte de la Corse de M. ROBERT de VAUGONDI. T. I. II. a Laufann. 12. Voll. 2.

CAR. LINNAEI Diss. Prolepsis plantarum. Resp. *Henr. Ultmark*. Vpsaliae 4.

PETR LUCHTMANS Or. de anatomicis seculi XVIII. incrementis. Traj. ad Rh. 4.

Intra des - Tal om Astronomien uti dess närvarande tillstånd af FREDRIC MALLET. Stockh. 8.

Tal om de i Landet befintliga Byggnings-ämnen af GABRIEL POLHELM. *ibid.* 8.

IO. GEORG. ROEDERER, Progr. de febre ex intermittente continua. Goetting. 4.

Eiusd. Progr. sistens observationes de infantibus in partu suffocatis *ibid.* 4.

Eiusd. Progr. sistens observationes de submersis aqua *ibid.* 4.

Dictionnaire universel de Commerce, d'Histoire Naturelle et des Arts et Metiers, contenant tout ce, qui concerne le Commerce, qui se fait dans les quatre parties du Monde — — par JACQUES SAVARY DES BRUSLONS. Nouvelle Edition exactement revue, corrigée et considérablement augmentée. Tome II. a Copenhague fol.

IOAN. THOM. SIEGERT, Diss. de flatibus. Pragae, 8.

A Sermon preached before his Grace CHARLES, Duke of Marlborough — — of the Hospitals for the Small-pox, on thursday, March 27, 1760 by SAMUEL SQUIRE, *Cui adiungitur* An Account of the Rise, Progress and State of the Hospital, for relieving poor People afflicted with the Small pox, and for Inoculation: from its first Institution (26 Sept. 1746 to 24 March 1760.) London, 4. c. f.

PUBL. VIRGILII MARONIS opera. Editio nouissima perpolitata. Patau. 12.

Eiusd. opera cum notis THOM. FARNABIT. *ibid.* 12.

Tal om Methoden uti Naturkunnigheten af 10-
HANN CARL WILKE. Stockholm. 8.

10. GOTTSCH. WALLERIUS, Diff. om Limstens
nytta vid Ienmalms Smältningar. Resp. *Ioh. Dan.
Christiernin*. Vpsal. 4.

Eiusd. Diff. an vis aeris prius, quam ferri inno-
tuerit? Resp. *Mart. Wahlberg*. Holm. 4.

Eiusd. Diff. de argilla ad fertilitatem contribuyente.
Resp. *Paul. Ol. Naesman*. Vpsal. 4.

Eiusd. Diff. Prober-Konsten. Resp. *Matth. Krapp*.
ibid. 4.

Eiusd. Diff. de lapide tonitruali. Resp. *Andr. Nic.
Grönbergh*. ibid. 4.

Eiusd. Diff. de origine geocosmi ab aqua. Resp.
Iesper Lundborg. ibid. 4.

Eiusd. Diff. de montibus igniuomis. Resp. *Ioh. Ges-
dik*. ibid. 4.

Eiusd. Diff. de decrementis aquarum. Resp. *Ioh.
Lundborg*. ibid. 4.

Eiusd. Diff. de vestigiis diluuii vniuersalis. Resp. *Dan.
Ioh. Lagerlöf*. ibid. 4.

Eiusd. Diff. de terra adamica. Resp. *Peter Åhrborg*.
Strognesiae. 4.

Eiusd. Diff. de prima vinorum origine casuali. Resp.
Ol. Nordenh. Westman. Holm. 4.



Supplementum scriptorum physico-medicorum,
quae anno 1761 prodierunt.

Actorum Academiae Electoralis Moguntinae scientiarum vtilium, quae Erfordiae est. Tomus II. Erfordiae 8. c. f.

Der Arzt; eine medicinische Wochenschrift. 6ter Theil. Hamburg, 8.

Analyse des qualités et des vertus de la Fontaine minerale de Neuweger, a Nancy.

Ragionamento istorico intorno a nuovi Vulcani comparfi nella fine dell'anno scorso 1760 nell territorio della Torre del Greco dal GAETANO DE BOTTIS. in Napoli. 4.

Observations pratiques sur les maladies veneriennes par M. LE COSTE a Berlin, 8.

HENR. IO. NEP. CRANTZ, Quaest. physiol. de systemate irritabilitatis cordis. Resp. *Franc. Petr. Leop. Gennzinger*. Viennae, 4.

Eiusd. Quaest. acad. quae sint causae musculorum motrices, actiones horum, actionum effectus: cordis, auricularum, arteriarum, diaphragmatis, musculorum abdominalium, vesicae. Resp. *Philip. Marherr*. ibid.. 4.

IOH. DAN. DENSO *physicalische Bibliothek. 2ten Bandes 2tes Stück. Butzo u. Wismar*. 8.

DAN. MICH. GROS, Diss. inaug. de acrimoniis. Vindobonae. 4.

Recettes pour les Maladies des Chevaux, recueillies de plus habiles Ecuyers et Marechaux ferrans d'Italie par M. HARPUR, Gentil-homme Anglois. a Lausanne. 8.

HENR. LUBENTIUS HOFFMANN, Diff. inaug. de cholera morbo. Vindob. 4.

LAURENT. HOFFMANN, Diff. inaug. sistens formulas in materiam medicam et chirurgicam celeberrimi CRANTZ. ibid. 8.

Tal om lustens beskaffenhet i A^obo, samt hura Politien, i Samråd med Medicin, bör tördömma sjukdomar af I. LECHE. A^obo. 8.

Binae ex non nullis rariores morborum historiae, quas ex aduersariis suis depromsit iurisque publici, sortem suam experturas, fecit ANTON. LIZZARI, Phil. et Med. D. Venetiis. 8.

Dissertazione epistolare di ANTONIO LIZZARI, Med. ad un amico, relativa a due osservazioni in istampa recentemente pubblicate, in cui coll' autorità di alcune antiche e moderne dottrine e osservazioni, si accredita l'operazione cerusica, detta paracentesi, nell'idropisie ascitiche, cistiche, e del peritoneo. Si tocca ancora di passaggio l'altra operazione cerusica detta Nefrotomia. ibid. 8 mai.

De venis lymphaticis valuulosis et de earum in primis origine Auctore ALEX. MONRO. Lausannae. 8.

Las Obras de HIPPOCRATE mas selectas con las observaciones praticas de los antiguos y modernos por ANDR. PIQUER. Tom. II. en Madrid. 4.

Dictionnaire universel de Commerce, d'Histoire naturelle et des Arts et Metiers, contenant tout ce, qui concerne le Commerce, qui se fait dans les quatre parties du monde — par M. JACQUES SAVARY DES BRUSLONS: Nouvelle edition exacte.

actement revue, corrigée et considérablement augmentée. Tome III. a Copenhague fol.

EUS. SQUARIO, Dissertazione intorno al rawivar i Sommerfi, in Venezia. 8.

I. L. STEINHART *Anweisung, wie der Seidenbau auf die leichteste Art zu treiben.* Züllichau. 8.

ANT. STOERKS *Abhandlung vom Schierling, aus dem Lateinischen übersetzt von LUDW. IAC. HEYDEN.* Zwey Theile nebst Zugabe. Wien. 8.

Discorso concernente una Storia di Vajuolo con alcune Riflessioni intorno all' innestarle, letto nell' Accademia delle Scienze di Siena o' sia de' Fisio-critici il di 25 Giugno 1761 dal Dott. PIETRO TABARRANI, Prof. P. di Notomia nell' Università Senese, Soc. della medesima Accadem. etc. in Siena. 4 mai.

CAROLI WITHOFF tractatus physicus et curiosus de castratis. Laufannae. 8.



Contenta in hac parte.

1. Histoire & Memoires de l' Academie Royale des Sciences de Paris an. 1757.	pag. 3
2. DU HAMEL DU MONCEAU et TILLET Histoire d' un Insecte, qui devore les grains de l'Angoumois cer.	14
3. LAUTTER Historia medica biennalis morbo- rum ruralium, qui a verno tempore anni 1759 vsque ad finem hyemis anni 1761 Laxemburgi et in vicinia dominati sunt	20
4. TISSOT de variolis, apoplexia et hydrope	23
5. LOCHER Obseruationes practicae circa luem veneream, epilepsiam et maniam	31
6. BAUME Elemens de Pharmacie theorique et practique	35
7. DE SAUVAGES Nosologia methodica	37
8. Kongl Wetenskaps Academiens Handlingar för År 1761. Vol. XXII.	58
9. SPIELMANN Institutiones chemiae.	82
10. MURRAY Diff. de fatis variolarum insitionis in Suecia	94
1. SCHAEFFER Fungorum, qui in Bauaria et Pa- latinatu circa Ratisbonam nascuntur Icones na- tius coloribus expressae	99
2. ROSSI Obseruationes de nonnullis plantis, quae pro venenatis habentur	101
3. Observations sur l' ecorce de feuilles & petales.	103
4. HAFFNER de hydrope articulorum.	107
5. <i>Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich. 1 Band.</i>	110
6. QUARIN. Tentamina de Cicuta.	119

17	EHRHART Diff. de cicuta	p. 122
18.	LANGE Diff. sistens dubia cicutae vexata	125
19.	DE HAEN. Ratio medendi. Pars V et VI	127
20.	GRONOVII Flora Virginica	142
21.	Gli Atti dell' Accademia delle Scienze di Siena detta de Fisiocritici dell' ann 1760 Tom. I	145
22.	TROSCHERL <i>Nachricht von dem wahrhaften Böhmischen Bitterwasser</i> cet.	155
23.	Noua physico-medica	158
24.	Supplementum alterum scriptorum physico-me- dicorum, quae anno 1760 prodierunt	182
25.	Supplementum scriptorum physico-medicorum, quae 1761 prodierunt	186



